ЛП-№(014425)-(РГ-RU) от 13.04.2026

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 08.04.2026 № 7226
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

# ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

## 1. НАИМЕНОВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

АРТРАКАМ, 1,5 г, порошок для приготовления раствора для приема внутрь.

## 2. КАЧЕСТВЕННЫЙ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ

Действующее вещество: глюкозамин.

Каждый пакетик содержит 1,884 г. глюкозамина сульфат натрия хлорид в пересчете на 100% вещество, в том числе глюкозамина сульфата – 1,5 г.

Вещества, наличие которых надо учитывать в составе лекарственного препарата: сорбитол, лимонная кислота (см. раздел 4.4)

Полный перечень вспомогательных веществ приведен в разделе 6.1.

## 3. ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА

Порошок для приготовления раствора для приема внутрь.

Порошок или смесь порошка и гранул белого или почти белого цвета.

## 4. КЛИНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### 4.1. Показания к применению

Лекарственный препарат АРТРАКАМ показан к применению у взрослых и детей старше 12 лет при:

- Остеоартрозе периферических суставов и суставов позвоночника
- Остеохондрозе
- Спондилоартрозе

Препарат показан к применению у взрослых для облегчения симптомов остеоартрита коленного сустава легкой и средней тяжести.

### 4.2. Режим дозирования и способ применения

Режим дозирования

*Взрослые*

1 пакетик 1 раз в сутки в течение 6 недель. По назначению врача курс можно повторять с интервалом 2 месяца.

Особые группы пациентов

Дети

*Дети старше 12 лет*

Режим дозирования для детей от 12 до 18 лет не отличается от режима дозирования для

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 08.04.2026 № 7226
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

взрослых.

Продолжительность лечения определяет лечащий врач.

*Дети от 0 до 12 лет*

Безопасность и эффективность препарата АРТРАКАМ у детей в возрасте до 12 лет на данный момент не установлены.

Способ применения

Внутрь. Содержимое одного пакетика растворяют в 200 мл воды.

**4.3. Противопоказания**

- Гиперчувствительность к глюкозамину сульфату или к любому из вспомогательных веществ, перечисленных в разделе 6.1.
- Тяжелая ХПН (хроническая почечная недостаточность)
- Беременность и период грудного вскармливания.
- Дети до 12 лет

**4.4. Особые указания и меры предосторожности при применении**

С осторожностью

При непереносимости морепродуктов (креветки, моллюски) вероятность развития аллергических реакций на препарат возрастает.

С осторожностью принимают при бронхиальной астме и сахарном диабете.

Особые указания

Не рекомендуется принимать детям до 12 лет из-за отсутствия научных данных для этой категории пациентов. Разовая доза препарата содержит натрий, что нужно учитывать пациентам, которым показана бессолевая диета. Риск аллергических реакций возрастает при непереносимости морепродуктов.

Вспомогательные вещества

Лекарственный препарат содержит сорбитол. Пациентам с нарушенной толерантностью к глюкозе необходимо обратиться к врачу перед применением данного препарата.

**4.5. Взаимодействие с другими лекарственными препаратами и другие виды взаимодействия**

Препарат совместим с НПВС (нестероидными противовоспалительными средствами), парацетамолом и глюкокортикостероидами.

Увеличивает абсорбцию тетрациклинов, уменьшает – полусинтетических пенициллинов, хлорамфеникола.

Усиливает эффект кумариновых антикоагулянтов.

**4.6. Фертильность, беременность и лактация**

Лекарственный препарат АРТРАКАМ противопоказан при беременности и в период грудного вскармливания (см. раздел 4.3).

**4.7. Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с**

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 08.04.2026 № 7226
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

**механизмами**

Данные об отрицательном влиянии препарата на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций, отсутствуют.

### 4.8. Нежелательные реакции

Резюме нежелательных реакций

Частота нежелательных реакций была определена в соответствии с классификацией Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ): очень часто (≥1/10), часто (≥1/100 и <1/10), нечасто (≥1/1000 и <1/100), редко (≥1/10000 и <1/1000), очень редко, включая отдельные сообщения (<1/10000), частота неизвестна (на основании имеющихся данных оценить невозможно).

Нежелательные реакции представлены в соответствии с системно-органной классификацией в порядке уменьшения значимости.

*Нарушения со стороны кожи и подкожных тканей:* частота неизвестна (на основании имеющихся данных оценить невозможно) – крапивница, зуд, эритема.

*Нарушения со стороны нервной системы:* частота неизвестна (на основании имеющихся данных оценить невозможно) – головная боль, сонливость.

*Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта:* частота неизвестна (на основании имеющихся данных оценить невозможно) – боль в эпигастрии, метеоризм, диарея, запор, тошнота.

Сообщение о подозреваемых нежелательных реакциях

Важно сообщать о подозреваемых нежелательных реакциях после регистрации лекарственного препарата с целью обеспечения непрерывного мониторинга соотношения

«польза – риск» лекарственного препарата. Медицинским работникам рекомендуется сообщать о любых подозреваемых нежелательных реакциях лекарственного препарата через национальные системы сообщения о нежелательных реакциях государств – членов Евразийского экономического союза.

Российская Федерация

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)

109012, г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1

Телефон: +7 (800) 550-99-03

Электронная почта: pharm@roszdravnadzor.gov.ru или npr@roszdravnadzor.gov.ru

Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
https://www.roszdravnadzor.gov.ru

### 4.9. Передозировка

Случаи передозировки неизвестны.

Лечение

Промывание желудка, симптоматическая терапия.

## 5. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 08.04.2026 № 7226
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

### 5.1. Фармакодинамические свойства

Фармакотерапевтическая группа: противовоспалительные и противоревматические препараты; нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты; другие нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты.

Код АТХ: M01AX05

Механизм действия и фармакодинамические эффекты

Препарат обладает противовоспалительным и обезболивающим действием, восполняет эндогенный дефицит глюкозамина, стимулирует синтез протеогликанов и гиалуроновой кислоты синовиальной жидкости; увеличивает проницаемость суставной капсулы, восстанавливает ферментативные процессы в клетках синовиальной мембраны и суставного хряща. Способствует фиксации серы в процессе синтеза хондроитинсерной кислоты, тормозит развитие дегенеративных процессов в суставах, восстанавливает их функцию, уменьшая суставные боли.

### 5.2. Фармакокинетические свойства

Абсорбция

Всасывание в желудочно-кишечном тракте 90%

Распределение

Биодоступность 26%

Элиминация

Период полувыведения 70 часов.

## 6. ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

### 6.1. Перечень вспомогательных веществ

Сорбитол

Лимонная кислота

### 6.2. Несовместимость

В связи с отсутствием исследований совместимости, данный лекарственный препарат не следует смешивать с другими лекарственными препаратами.

### 6.3. Срок годности (срок хранения)

4 года.

### 6.4. Особые меры предосторожности при хранении

Хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 25 ºС.

### 6.5. Характер и содержание упаковки

По 2,2 г препарата в пакетики из многослойного комбинированного материала или Алюламинат (Буфлен).

Пакетики могут быть размещены индивидуально или скреплены попарно через перфорацию.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 08.04.2026 № 7226
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

7, 14, 20, 21, 28, 35 или 42 пакетика вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

**6.6. Особые меры предосторожности при утилизации использованного лекарственного препарата или отходов, полученных после применения препарата, и другие манипуляции с препаратом**

Особые требования отсутствуют.

## 7. ДЕРЖАТЕЛЬ РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ

Российская Федерация

ООО «Инкамфарм»

115088, г. Москва, ул. Новоостаповская, д. 6, пом. 4

Тел.: +7 (495) 287-45-02

E-mail: info@incomepharm.ru

https://artracam.com/

**7.1. Представитель держателя регистрационного удостоверения**

Претензии потребителей направлять по адресу

Российская Федерация

ООО «Инкамфарм»

115088, г. Москва, ул. Новоостаповская, д. 6, пом. 4

Тел.: +7 (495) 287-45-02

E-mail: info@incomepharm.ru

## 8. НОМЕР (НОМЕРА) РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ

## 9. КАТЕГОРИЯ ОТПУСКА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Лекарственный препарат относится к категории отпуска без рецепта.

Общая характеристика лекарственного препарата АРТРАКАМ доступна в едином реестре зарегистрированных лекарственных средств Евразийского экономического союза и на официальном сайте уполномоченного органа (экспертной организации) https://lk.regmed.ru/Register/EAEU_SmPC