Internal
ЛП-№(013340)-(РГ-RU) от 23.01.2026
СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 25.12.2025 № 32328
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

1. НАИМЕНОВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Бронхикум ТП, эликсир.

2. КАЧЕСТВЕННЫЙ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ

Действующие вещества: первоцвета весеннего корневищ с корнями экстракт и тимьяна обыкновенного травы экстракт.

Каждые 100 г эликсира содержат: 2,5 г первоцвета весеннего корневищ с корнями экстракт жидкий*, 5,0 г тимьяна обыкновенного травы экстракт жидкий*.

*Первоцвета весеннего корневищ с корнями экстракт жидкий получен из Первоцвета весеннего корневищ с корнями (Primula veris L., или Primula eliator (L) Hill, семейства Первоцветных — Primulaceae).

Соотношение лекарственного растительного сырья к экстрагенту: 1:2–2,5.

Экстрагент: спирт этиловый 70 % (об/об).

*Тимьяна обыкновенного травы экстракт жидкий получен из Тимьяна обыкновенного травы (Thymus vulgaris L., семейства Яснотковых — Lamiaceae).

Соотношение лекарственного растительного сырья к экстрагенту: 1:2–2,5.

Экстрагент: раствор аммиака 10 %, глицерин 85 %, спирт этиловый 90 % (об/об), вода; в соотношении 1:20:70:109.

Вещества, наличие которых следует учитывать в составе лекарственного препарата: сахарный сироп инвертный (сахароза), спирт этиловый (см. раздел 4.4).

Полный перечень вспомогательных веществ приведен в разделе 6.1.

3. ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА

Эликсир.

Прозрачный до слегка мутного раствор, от красновато-коричневого до темно-коричневого цвета.

4. КЛИНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

4.1. Показания к применению

Бронхикум ТП показан к применению у взрослых и детей в возрасте от 6 месяцев до 18 лет.

В качестве симптоматического средства в составе комплексной терапии инфекционно-воспалительных заболеваний дыхательных путей, сопровождающихся кашлем с трудноотделяемой мокротой (в том числе бронхит, трахеит, трахеобронхит).

4.2. Режим дозирования и способ применения

Режим дозирования

Взрослые принимают по 1 чайной ложке (5 мл) 6 раз в сутки.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 25.12.2025 № 32328
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

Эликсир следует принимать через равные промежутки времени в течение суток.

Средний курс лечения составляет 10–14 дней. Увеличение продолжительности и проведение повторных курсов лечения возможно после консультации врача.

Дети

Режим дозирования для детей в возрасте от 12 лет до 18 лет не отличается от режима дозирования для взрослых.

Детям в возрасте от 5 до 12 лет — по 1 чайной ложке эликсира (5 мл) до 4 раз в сутки.

Детям в возрасте от 1 года до 4 лет — по 1/2 чайной ложки (2,5 мл) до 3 раз в сутки.

Детям в возрасте от 6 месяцев до 1 года — по 1 мл до 6 раз в сутки.

Эликсир следует принимать через равные промежутки времени в течение суток.

Средний курс лечения составляет 10–14 дней. Увеличение продолжительности и проведение повторных курсов лечения возможно после консультации врача.

Безопасность применения препарата у детей от 0 до 6 месяцев не установлены. Данные отсутствуют.

Способ применения

Внутрь, после еды, препарат рекомендуется принимать, запивая достаточным количеством теплой воды. Перед применением взбалтывать. Для точного дозирования препарата используют мерный стаканчик-дозатор.

4.3. Противопоказания

- Гиперчувствительность к действующим веществам и/или любому из вспомогательных веществ, перечисленных в разделе 6.1., а также к растениям семейства Яснотковые (Lamiaceae) и Первоцветные (Primulaceae);
- хроническая сердечная недостаточность (в стадии декомпенсации);
- тяжелые нарушения функции печени и почек.

4.4. Особые указания и меры предосторожности при применении

С осторожностью следует принимать препарат при заболевании печени, алкоголизме, черепно-мозговой травме, заболеваниях головного мозга, эпилепсии, при гастрите, язвенной болезни желудка, сахарном диабете.

Вследствие содержания этанола детям до 12 лет следует принимать препарат по рекомендации и под наблюдением врача.

Необходимо проинформировать пациента, что при отсутствии улучшения состояния в течение 5 дней, а также при возникновении одышки, лихорадки или гнойной мокроты необходимо обратиться к врачу.

Вспомогательные вещества

Препарат Бронхикум ТП содержит сахарный сироп инвертный (сахароза).

Информация для пациентов с сахарным диабетом: 1 мл соответствует 0,07 ХЕ (хлебных единиц) (разовая доза препарата); максимальная суточная доза препарата соответствует 2,28 ХЕ (хлебных единиц), что необходимо учитывать лицам с сахарным диабетом, а также находящимся на гипокалорийной диете.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 25.12.2025 № 32328
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

Пациентам с редко встречающейся наследственной непереносимостью фруктозы, глюкозо-галактозной мальабсорбцией или дефицитом сахаразы-изомальтазы не следует принимать этот препарат.

Препарат Бронхикум ТП содержит этиловый спирт 4,9 % (об/об) или 0,19 г абсолютного этилового спирта в 1 чайной ложке (5 мл).

Следующее количество абсолютного этилового спирта содержится в максимальной разовой дозе препарата/максимальной суточной дозе препарата соответственно в зависимости от режима дозирования для каждой возрастной категории:

- в дозировке для взрослых и детей в возрасте от 12 лет: 0,19 г/1,14 г;
- в дозировке для детей в возрасте от 5 до 12 лет: 0,19 г/0, 76 г;
- в дозировке для детей в возрасте от 1 года до 4 лет: 0,095 г/0,285 г;
- в дозировке для детей в возрасте от 6 месяцев до 1 года: 0,038 г/0,228 г.

Небольшое количество спирта в данном лекарственном препарате не будет оказывать заметного действия.

4.5. Взаимодействие с другими лекарственными препаратами и другие виды взаимодействия

Не рекомендуется одновременный прием препарата Бронхикум ТП с противокашлевыми препаратами, а также с лекарственными средствами, уменьшающими образование мокроты, так как это затрудняет откашливание разжиженной мокроты.

4.6. Фертильность, беременность и лактация

Беременность

Препарат Бронхикум ТП не рекомендуется при беременности.

Лактация

Препарат Бронхикум ТП не рекомендуется в период грудного вскармливания.

4.7. Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами

При применении препарата Бронхикум ТП следует соблюдать осторожность при выполнении потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора).

4.8. Нежелательные реакции

Резюме нежелательных реакций

Ниже представлены нежелательные реакции, разделенные по системно-органным классам с указанием частоты их возникновения в соответствии со следующими градациями, рекомендованными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ):

- очень часто (≥ 1/10);
- часто (≥ 1/100, < 1/10);
- нечасто (≥ 1/1000, < 1/100);
- редко (≥ 1 / 10 000, < 1/1000);

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 25.12.2025 № 32328
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

- очень редко (< 1 / 10 000);
- частота неизвестна (на основании имеющихся данных оценить невозможно).

Необходимо проинформировать пациента о том, что при появлении первых аллергических реакций следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу.

При соблюдении рекомендованного режима дозирования препарата Бронхикум ТП нежелательные реакции незначительны.

Нарушения со стороны иммунной системы:

Частота неизвестна – реакции гиперчувствительности (в том числе анафилактический шок, кожная сыпь, крапивница).

Желудочно-кишечные нарушения:

Очень редко – расстройства пищеварения, диарея, тошнота, рвота.

Нарушения со стороны кожи и подкожных тканей:

Частота неизвестна – ангионевротический отек.

Сообщения о подозреваемых нежелательных реакциях

Важно сообщать о подозреваемых нежелательных реакциях после регистрации лекарственного препарата с целью обеспечения непрерывного мониторинга соотношения «польза — риск» лекарственного препарата. Медицинским работникам рекомендуется сообщать о любых подозреваемых нежелательных реакциях лекарственного препарата через национальные системы сообщения о нежелательных реакциях государств — членов Евразийского экономического союза.

Российская Федерация

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения

Российская Федерация, 109012, г. Москва, Славянская пл., д. 4, стр. 1

Тел.: +7 800 550 99 03

Электронная почта: pharm@roszdravnadzor.gov.ru

Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://roszdravnadzor.gov.ru

4.9. Передозировка

При приеме препарата Бронхикум ТП в дозах, превышающих рекомендуемые, возможно усиление дозозависимых побочных эффектов.

Лечение: симптоматическое.

5. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

5.1. Фармакодинамические свойства

Фармакотерапевтическая группа: препараты, применяемые при кашле и простудных заболеваниях; отхаркивающие средства, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами; отхаркивающие средства.

Код АТХ: R05CA10

Механизм действия и фармакодинамические эффекты

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 25.12.2025 № 32328
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

Препарат оказывает отхаркивающее, противовоспалительное, бронхолитическое, противомикробное действие, способствует снижению вязкости мокроты и ускорению ее эвакуации.

5.2. Фармакокинетические свойства

В качестве действующих веществ препарат содержит смесь экстрактов травы тимьяна обыкновенного и корня первоцвета весеннего, представляющих собой сложный комплекс биологически активных веществ, в связи с чем проведение фармакокинетических исследований не представляется возможным.

6. ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

6.1. Перечень вспомогательных веществ

Натрия бензоат;

сахарный сироп инвертный;

карамельный сироп;

вода очищенная.

6.2. Несовместимость

Неприменимо.

6.3. Срок годности (срок хранения)

3 года.

6.4. Особые меры предосторожности при хранении

Хранить при температуре не выше 25 °С.

6.5. Характер и содержание первичной упаковки

По 130 г препарата в стеклянный флакон с навинчивающейся пластмассовой крышкой с контролем первого вскрытия и с защитой от вскрытия детьми, на которую надет пластмассовый стаканчик-дозатор. Каждый флакон вместе с листком-вкладышем упакован в картонную пачку.

6.6. Особые меры предосторожности при утилизации использованного лекарственного препарата или отходов, полученных после применения лекарственного препарата, и другие манипуляции с препаратом

Особые требования отсутствуют.

7. ДЕРЖАТЕЛЬ РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ

Германия

А. Наттерманн энд Сие. ГмбХ / A. Nattermann & Cie. GmbH

Brueningstrasse 50, 65929 Frankfurt am Main, Germany

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 25.12.2025 № 32328
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

7.1. Представитель держателя регистрационного удостоверения

Претензии потребителей направлять по адресу:

Российская Федерация

ООО «Опелла Хелскеа»

Российская Федерация, 125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 22, помещ. 42

Тел.: +7 495 721 14 00

8. НОМЕР (НОМЕРА) РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ

9. КАТЕГОРИЯ ОТПУСКА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Лекарственный препарат относится к категории отпуска без рецепта.

Общая характеристика лекарственного препарата Бронхикум ТП доступна в едином реестре зарегистрированных лекарственных средств Евразийского экономического союза и на официальном сайте уполномоченного органа (экспертной организации): https://lk.regmed.ru/Register/EAEU_SmPC.