ЛП-№(012773)-(РГ-RU) от 10.12.2025

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 08.12.2025 № 30410
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

1. НАИМЕНОВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Зеленина капли, капли для приема внутрь.

2. КАЧЕСТВЕННЫЙ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ

Действующие вещества: белладонны настойка + валерианы лекарственной корневищ с корнями настойка + ландыша травы настойка + [левоментол].
Каждые 100 мл препарата содержат 20 мл белладонны настойки (красавки настойки), 40 мл валерианы лекарственной корневищ с корнями настойки (валерианы настойки), 40 мл ландыша травы настойки (ландыша настойки) и 0,8 г левоментола (L - ментола).
Вещества, наличие которых надо учитывать в составе лекарственного препарата: спирт этиловый (этанол) (см. раздел 4.4.).
Полный перечень вспомогательных веществ приведен в разделе 6.1.

3. ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА

Капли для приема внутрь.
Прозрачная жидкость от зеленовато-коричневого до желтовато-коричневого цвета с характерным запахом.

4. КЛИНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

4.1. Показания к применению

Препарат Зеленина капли показан к применению у взрослых в возрасте от 18 лет в качестве успокаивающего средства при вегето-сосудистой дистонии, повышенной нервной возбудимости, комплексной терапии хронической сердечной недостаточности.

4.2. Режим дозирования и способ применения

Режим дозирования
Перед применением препарата необходимо проконсультироваться с врачом.
Доза устанавливается индивидуально.
Рекомендуемая доза у взрослых - по 20-25 капель 2-3 раза в день.
Длительность применения препарата устанавливается индивидуально врачом.
Дети
Препарат противопоказан к применению у детей в возрасте от 0 до 18 лет.
Способ применения
Внутрь.

4.3. Противопоказания

- гиперчувствительность к действующим веществам и (или) к вспомогательному веществу, перечисленному в разделе 6.1;
- закрытоугольная глаукома;
- гиперацидный гастрит;
- язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки;

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 08.12.2025 № 30410
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

- гиперплазия предстательной железы с нарушением оттока мочи;
- выраженный кардиосклероз;
- эндокардит;
- миокардит;
- беременность;
- период грудного вскармливания;
- возраст до 18 лет.

4.4. Особые указания и меры предосторожности при применении

С осторожностью
Заболевания печени, алкоголизм, черепно-мозговая травма, заболевания головного мозга, эпилепсия.
Вспомогательные вещества
Данный лекарственный препарат содержит небольшое количество этанола. Содержание абсолютного этилового спирта в максимальной разовой дозе препарата для взрослых составляет 0,28 г, в максимальной суточной дозе - 0,83 г.

4.5. Взаимодействие с другими лекарственными препаратами и другие виды взаимодействия

Усиливает действие снотворных, седативных и спазмолитических средств.

4.6. Фертильность, беременность и лактация

Беременность
Противопоказано применение препарата при беременности (в связи с отсутствием данных о применении препарата при беременности).
Лактация
Противопоказано применение препарата в период грудного вскармливания (в связи с отсутствием данных о применении препарата в период грудного вскармливания).

4.7. Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами

В период применения препарата необходимо соблюдать осторожность при выполнении потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера, оператора).

4.8. Нежелательные реакции

Резюме нежелательных реакций
Возможны аллергические реакции, мышечная слабость, головная боль, изжога, гастралгия, тошнота, рвота, диарея, сухость слизистой оболочки полости рта, парез аккомодации, задержка мочи у пациентов с гиперплазией предстательной железы.
Сообщение о подозреваемых нежелательных реакциях
Важно сообщать о подозреваемых нежелательных реакциях после регистрации лекарственного препарата с целью обеспечения непрерывного мониторинга соотношения

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 08.12.2025 № 30410
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

«польза – риск» лекарственного препарата. Медицинским работникам рекомендуется сообщать о любых подозреваемых нежелательных реакциях лекарственного препарата через национальные системы сообщения о нежелательных реакциях государств – членов Евразийского экономического союза.
Российская Федерация
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения
109012, г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1
Телефон: +7 (800) 550-99-03
Электронная почта: pharm@roszdravnadzor.gov.ru или npr@roszdravnadzor.gov.ru
Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://www.roszdravnadzor.gov.ru/

4.9. Передозировка

Симптомы
При применении препарата в дозах, превышающих рекомендуемые, возможно усиление дозозависимых побочных эффектов.
Лечение
Симптоматическое.

5. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

5.1. Фармакодинамические свойства

Фармакотерапевтическая группа: психолептики; снотворные и седативные средства; другие снотворные и седативные средства.
Код АТХ: N05CM
Механизм действия и фармакодинамические эффекты
Фармакологическое действие препарата обусловлено свойствами компонентов, входящих в его состав.
Красавки настойка оказывает м-холиноблокирующее и спазмолитическое действие.
Ландыша настойка оказывает кардиотоническое действие.
Валерианы настойка обладает седативным и спазмолитическим действием.
Левоментол - местнораздражающее средство, оказывает венотонизирующее, анальгезирующее, рефлекторное вазодилатирующее и антиангинальное действие.

5.2. Фармакокинетические свойства

Препарат содержит сложный комплекс биологически активных веществ растительного происхождения и ментола, в связи с чем проведение фармакокинетических исследований не представляется возможным.

6. ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

6.1. Перечень вспомогательных веществ

Спирт этиловый (этанол).

6.2. Несовместимость

Не применимо.

6.3. Срок годности (срок хранения)

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 08.12.2025 № 30410
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

3 года.

6.4. Особые меры предосторожности при хранении

В защищенном от света месте, при температуре от 8 до 25 °С.

6.5. Характер и содержание упаковки

По 15, 25 мл препарата во флаконы светозащитного стекла, укупоренные пробками-капельницами из полиэтилена высокого давления, с пластмассовыми крышками навинчиваемыми или навинчиваемыми с контролем первого вскрытия, также допускается использование крышек-капельниц без пробки.
На флаконы наклеивают этикетку из бумаги или самоклеящуюся этикетку.
Каждый флакон вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона.
Допускается вложение полипропиленовой ложки мерной в каждую пачку.
По 10, 16, 20, 30, 40, 56, 112 флаконов по 15, 25 мл с соответствующим количеством инструкций по медицинскому применению помещают в коробку картонную или ящик из гофрированного картона (для стационаров).

6.6. Особые меры предосторожности при утилизации использованного лекарственного препарата или отходов, полученных после применения лекарственного препарата и другие манипуляции с препаратом

Особые требования отсутствуют.

7. ДЕРЖАТЕЛЬ РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ

Российская Федерация
АО «Кировская фармацевтическая фабрика»
610000, Кировская обл., г. Киров, ул. Московская, д. 27 а

7.1. Представитель держателя регистрационного удостоверения

Претензии потребителей направлять по адресу:
Российская Федерация
АО «Кировская фармацевтическая фабрика»
610000, Кировская обл., г. Киров, ул. Московская, д. 27 а
Тел. (8332) 22-01-26
E-mail: kachestvo-s@k-ff.ru

8. НОМЕР (НОМЕРА) РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ

9. КАТЕГОРИЯ ОТПУСКА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Лекарственный препарат относится к категории отпуска без рецепта.

Общая характеристика лекарственного препарата Зеленина капли доступна в едином реестре зарегистрированных лекарственных средств Евразийского экономического союза и на официальном сайте уполномоченного органа (экспертной организации) https://lk.regmed.ru/Register/EAEU_SmPC.