ЛП-№(014683)-(РГ-RU) от 28.04.2026

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 23.04.2026 № 8347
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

1. НАИМЕНОВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Флюфайт, порошок для приготовления раствора для приема внутрь с ароматом имбиря.

Флюфайт, порошок для приготовления раствора для приема внутрь с ароматом меда и лимона.

Флюфайт, порошок для приготовления раствора для приема внутрь с ароматом лимона.

Флюфайт, порошок для приготовления раствора для приема внутрь с ароматом малины.

2. КАЧЕСТВЕННЫЙ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ

Действующие вещества: Кофеин+Парацетамол+Фенилэфрин+Фенирамин.

Флюфайт, порошок для приготовления раствора для приема внутрь с ароматом имбиря

Каждый пакетик (саше) содержит 30 мг кофеина, 750 мг парацетамола, 20 мг фенирамина (в виде малеата), 10 мг фенилэфрина (в виде гидрохлорида).

Вещества, наличие которых надо учитывать в составе лекарственного препарата: натрий, аспартам, лактоза (см. раздел 4.4).

Флюфайт, порошок для приготовления раствора для приема внутрь с ароматом меда и лимона

Каждый пакетик (саше) содержит 30 мг кофеина, 750 мг парацетамола, 20 мг фенирамина (в виде малеата), 10 мг фенилэфрина (в виде гидрохлорида).

Вещества, наличие которых надо учитывать в составе лекарственного препарата: натрий, аспартам, лактоза (см. раздел 4.4).

Флюфайт, порошок для приготовления раствора для приема внутрь с ароматом лимона

Каждый пакетик (саше) содержит 30 мг кофеина, 750 мг парацетамола, 20 мг фенирамина (в виде малеата), 10 мг фенилэфрина (в виде гидрохлорида).

Вещества, наличие которых надо учитывать в составе лекарственного препарата: натрий, аспартам, лактоза, краситель солнечный закат желтый (см. раздел 4.4).

Флюфайт, порошок для приготовления раствора для приема внутрь с ароматом малины

Каждый пакетик (саше) содержит 30 мг кофеина, 750 мг парацетамола, 20 мг фенирамина (в виде малеата), 10 мг фенилэфрина (в виде гидрохлорида).

Вещества, наличие которых надо учитывать в составе лекарственного препарата: натрий, аспартам, лактоза, краситель Понсо 4R (пунцовый 4R) (см. раздел 4.4).

Полный перечень вспомогательных веществ приведен в разделе 6.1.

3. ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА

Порошок для приготовления раствора для приема внутрь [с ароматом имбиря, с ароматом меда и лимона, с ароматом лимона, с ароматом малины].

Флюфайт, порошок для приготовления раствора для приема внутрь с ароматом имбиря

Сыпучий порошок от почти белого до светло-желтого цвета с мелкими темными

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 23.04.2026 № 8347
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

вкраплениями. При растворении в 200 мл горячей воды образуется раствор светло-коричневого цвета с запахом имбиря, с опалесценцией.

Флюфайт, порошок для приготовления раствора для приема внутрь с ароматом меда и лимона

Сыпучий порошок от почти белого до светло-желтого цвета с мелкими темными вкраплениями. При растворении в 200 мл горячей воды образуется раствор со слабым коричневатым оттенком с запахом меда и лимона, с опалесценцией.

Флюфайт, порошок для приготовления раствора для приема внутрь с ароматом лимона

Сыпучий порошок от почти белого до светло-желтого цвета со светло-оранжевыми вкраплениями. При растворении в 200 мл горячей воды образуется раствор от светло-желтого до оранжевого цвета с запахом лимона, с опалесценцией.

Флюфайт, порошок для приготовления раствора для приема внутрь с ароматом малины

Сыпучий порошок от почти белого до светло-розового цвета с более темными розовыми вкраплениями. При растворении в 200 мл горячей воды образуется раствор розового цвета с запахом малины, с опалесценцией.

4. КЛИНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

4.1. Показания к применению

Препарат Флюфайт показан к применению у взрослых и детей с 15 лет.

Симптоматическое лечение «простудных заболеваний», острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), в том числе гриппа (лихорадочный синдром, болевой синдром, ринорея).

4.2. Режим дозирования и способ применения

Режим дозирования

По 1 пакетику (саше) каждые 4–6 часов (3–4 раза в сутки) через 1–2 часа после приема пищи. Максимальная суточная доза — 4 пакетика.

Продолжительность терапии

Препарат не рекомендуется применять более 5 дней как обезболивающее и более 3 дней как жаропонижающее без предварительной консультации врача.

Дети

Безопасность и эффективность препарата Флюфайт у детей в возрасте от 0 до 15 лет не установлены. Данные отсутствуют.

Режим дозирования для детей от 15 до 18 лет не отличается от режима дозирования для взрослых.

Способ применения

Содержимое 1 пакетика (саше) высыпать в стакан, залить горячей водой, перемешать до полного растворения и выпить (по желанию можно добавить сахар или мед). Принимать препарат необходимо с большим количеством жидкости, через 1–2 часа после приема пищи.

Флюфайт, порошок для приготовления раствора для приема внутрь с ароматом имбиря

Описание приготовленного раствора: раствор светло-коричневого цвета с запахом имбиря, с опалесценцией.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 23.04.2026 № 8347
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

Флюфайт, порошок для приготовления раствора для приема внутрь с ароматом меда и лимона

Описание приготовленного раствора: раствор со слабым коричневатым оттенком с запахом меда и лимона, с опалесценцией.

Флюфайт, порошок для приготовления раствора для приема внутрь с ароматом лимона

Описание приготовленного раствора: раствор от светло-желтого до оранжевого цвета с запахом лимона, с опалесценцией.

Флюфайт, порошок *для приготовления раствора для приема внутрь с ароматом малины*

Описание приготовленного раствора: раствор розового цвета с запахом малины, с опалесценцией.

4.3. Противопоказания

- Гиперчувствительность к парацетамолу, кофеину, фенилэфрину, фенирамину или к любому из вспомогательных веществ, перечисленных в разделе 6.1;
- выраженный атеросклероз коронарных артерий;
- портальная гипертензия;
- повышенная чувствительность к симпатомиметическим препаратам, парацетамолу и другим компонентам, входящим в состав препарата;
- прием других препаратов, содержащих вещества, входящие в состав препарата Флюфайт;
- одновременный прием трициклических антидепрессантов, ингибиторов моноаминоксидазы (МАО) и прекращение их приема менее двух недель назад, бета-адреноблокаторов (см. раздел 4.5);
- беременность (см. раздел 4.6);
- период грудного вскармливания (см. раздел 4.6);
- детский возраст (до 15 лет);
- алкоголизм.

4.4. Особые указания и меры предосторожности при применении

В период лечения следует воздержаться от приема алкоголя, снотворных и анксиолитических (транквилизаторы) лекарственных средств. Не следует принимать препарат вместе с другими лекарственными средствами, содержащими парацетамол.

Если симптомы заболевания ухудшаются, сохраняются или появляются новые в течение 3–5 дней, следует проконсультироваться с врачом. Препарат может вызывать сонливость.

В случае проглатывания препарата ребенком следует немедленно обратиться за медицинской помощью.

С осторожностью

При заболеваниях сердца, артериальной гипертензии, бронхиальной астме, хронической обструктивной болезни легких, эмфиземе, хроническом бронхите, сахарном диабете, заболеваниях щитовидной железы, феохромоцитоме, заболеваниях крови, дефиците глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, врожденных гипербилирубинемиях (синдромы Жильбера, Дубина–Джонсона и Ротора), одновременном приеме препаратов, способных отрицательно влиять на печень (например, индукторов микросомальных ферментов печени), печеночной и/или

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 23.04.2026 № 8347
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

почечной недостаточности, остром гепатите, пилородуоденальной обструкции, стенозирующей язве желудка и/или двенадцатиперстной кишки, эпилепсии, закрытоугольной глаукоме, гиперплазии предстательной железы, а также пациентами, страдающими истощением и/или обезвоживанием, препарат может применяться с осторожностью после консультации с врачом.

Вспомогательные вещества

Натрий

Данный препарат содержит 172,81 мг натрия на пакетик (саше), что эквивалентно 8,6 % от рекомендуемого ВОЗ для взрослого человека максимального ежедневного поступления, равного 2 г натрия.

Аспартам

Данный лекарственный препарат содержит 80 мг аспартама (Е951) в каждом пакетике (саше). Аспартам является источником фенилаланина. Может быть вредным для пациентов с фенилкетонурией.

Лактоза

Данный лекарственный препарат содержит 1800 мг лактозы безводной на 1 пакетик (саше), что необходимо учитывать пациентам с сахарным диабетом. Данный лекарственный препарат не следует принимать пациентам с редко встречающейся наследственной непереносимостью галактозы, лактазной недостаточностью или глюкозо-галактозной мальабсорбцией.

Красители

Препарат Флюфайт, порошок для приготовления раствора для приема внутрь с ароматом лимона, содержит азокраситель солнечный закат желтый (Е110), который может вызывать аллергические реакции и оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей.

Препарат Флюфайт, порошок для приготовления раствора для приема внутрь с ароматом малины, содержит краситель Понсо 4R (пунцовый 4R, (Е124)), который может вызывать аллергические реакции.

4.5. Взаимодействие с другими лекарственными препаратами и другие виды взаимодействия

Кофеин

Однократный прием большой дозы кофеина способствует увеличению экскреции лития почками. Резкое прекращение приема кофеина может привести к увеличению концентрации лития в сыворотке крови.

Парацетамол

Усиливает эффекты ингибиторов МАО, седативных препаратов, этанола.

При приеме с дигоксином или другими сердечными гликозидами может увеличиваться риск развития аритмии и инфаркта миокарда.

Антидепрессанты, противопаркинсонические средства, антипсихотические средства, фенотиазиновые производные повышают риск развития задержки мочи, сухости во рту, запоров. Глюкокортикостероиды увеличивают риск развития глаукомы. Ингибиторы микросомального окисления (циметидин) снижают риск гепатотоксического действия. Метоклопрамид и домперидон увеличивают, а колестирамин снижает скорость всасывания парацетамола. Парацетамол снижает эффективность диуретических препаратов. При одновременном назначении с барбитуратами, дифенином, карбамазепином, рифампицином и

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 23.04.2026 № 8347
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

другими индукторами микросомальных ферментов печени повышается риск развития гепатотоксического действия парацетамола. У большинства пациентов, длительно принимающих варфарин, редкое использование парацетамола, как правило, мало или вообще не влияет на международное нормализованное отношение (МНО). Однако при продолжительном регулярном использовании парацетамол усиливает эффект непрямых антикоагулянтов (варфарина и других производных кумарина), что увеличивает риск кровотечений.

Фенилэфрин

Фенилэфрин при приеме с ингибиторами МАО может приводить к повышению артериального давления. Фенилэфрин снижает эффективность действия бета-адреноблокаторов и антигипертензивных препаратов. Трициклические антидепрессанты усиливают адреномиметическое действие фенилэфрина, одновременное назначение галотана повышает риск развития желудочковой аритмии. Снижает гипотензивное действие гуанетидина, который, в свою очередь, усиливает альфа-адреномиметическую активность фенилэфрина.

Фенирамин

Фенирамин одновременно с ингибиторами МАО, фуразолидоном может привести к гипертоническому кризу, возбуждению, гиперпирексии.

4.6. Фертильность, беременность и лактация

Беременность

Применение препарата при беременности противопоказано в связи с отсутствием данных по безопасности применения препарата у данной категории пациентов.

Лактация

Применение препарата в период грудного вскармливания противопоказано в связи с отсутствием данных по безопасности применения препарата у данной категории пациентов.

Фертильность

Данные о влиянии лекарственного препарата на фертильность отсутствуют.

4.7. Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами

Препарат Флюфайт может вызывать сонливость. В период лечения необходимо воздерживаться от вождения автотранспорта и занятий другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

4.8. Нежелательные реакции

Резюме нежелательных реакций

Нежелательные реакции сгруппированы по системно-органным классам и частоте появления. Частоту нежелательных реакций классифицировали следующим образом: очень часто (≥ 1/10), часто (≥ 1/100, но < 1/10), нечасто (≥ 1/1000, но < 1/100), редко (≥ 1/10 000, но < 1/1000), очень редко (< 1/10 000) и частота неизвестна (на основании имеющихся данных оценить невозможно).

Нарушения со стороны крови и лимфатической системы:

Частота неизвестна: анемия, тромбоцитопения, агранулоцитоз, гемолитическая анемия,

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 23.04.2026 № 8347
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

апластическая анемия, метгемоглобинемия, панцитопения.

Нарушения со стороны иммунной системы:

Частота неизвестна: аллергические реакции: кожная сыпь, зуд, крапивница, ангионевротический отек, реакция гиперчувствительности, анафилактическая реакция.

Нарушения со стороны нервной системы:

Частота неизвестна: головная боль, головокружение, нарушение засыпания, сонливость, повышенная возбудимость.

Нарушения со стороны органа зрения:

Частота неизвестна: мидриаз, парез аккомодации, повышение внутриглазного давления.

Нарушения со стороны сердца:

Частота неизвестна: тахикардия, чувство сердцебиения.

Нарушения со стороны сосудов:

Частота неизвестна: повышение артериального давления.

Нарушения со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения:

Частота неизвестна: бронхоспазм, сухость слизистой оболочки носа.

Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта:

Частота неизвестна: тошнота, рвота, боль в эпигастральной области, сухость слизистой оболочки полости рта.

Нарушения со стороны печени и желчевыводящих путей:

Частота неизвестна: повышение активности печеночных ферментов, гепатотоксическое действие.

Нарушения со стороны кожи и подкожных тканей:

Очень редко:

- острый генерализованный экзантематозный пустулез (ОГЭП). Острое состояние с развитием гнойничковых высыпаний. Характеризуется лихорадкой и диффузной эритемой, сопровождающейся жжением и зудом. Может возникнуть отек лица, рук и слизистых;
- синдром Стивенса–Джонсона (ССД) (злокачественная экссудативная эритема). Тяжелая форма многоформной эритемы, при которой возникают пузыри на слизистой оболочке полости рта, горла, глаз, половых органов, других участках кожи и слизистых оболочек.
- токсический эпидермальный некролиз (ТЭН, синдром Лайелла). Синдром является следствием обширного апоптоза кератиноцитов, что приводит к отслойке обширных участков кожи в местах дермоэпидермального соединения. Пораженная кожа имеет вид ошпаренной кипятком.

Нарушения со стороны почек и мочевыводящих путей

Частота неизвестна: затруднение мочеиспускания, нефротоксичность (почечная колика, глюкозурия, интерстициальный нефрит, папиллярный некроз).

Дети

Ожидается, что частота, вид и тяжесть нежелательных реакций у детей и взрослых будут одинаковы.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 23.04.2026 № 8347
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

Сообщение о подозреваемых нежелательных реакциях

Важно сообщать о подозреваемых нежелательных реакциях после регистрации лекарственного препарата с целью обеспечения непрерывного мониторинга соотношения «польза – риск» лекарственного препарата. Медицинским работникам рекомендуется сообщать о любых подозреваемых нежелательных реакциях лекарственного препарата через национальные системы сообщения о нежелательных реакциях государств – членов Евразийского экономического союза.
Российская Федерация
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения
Адрес: 109012, г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1
Телефон: +7 800 550-99-03
Электронная почта: pharm@roszdravnadzor.gov.ru или npr@roszdravnadzor.gov.ru
Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
https://www.roszdravnadzor.gov.ru/

4.9. Передозировка

В случае передозировки следует немедленно обратиться к врачу. Быстрое оказание медицинской помощи является критически важным, даже если вы не наблюдаете каких-либо признаков или симптомов.

Кофеин

Симптомы острой передозировки: абдоминальная боль, рвота, чувство жара, покраснение лица, лихорадка, озноб, возбуждение, бессонница, раздражительность, потеря аппетита, слабость, тремор, повышенный мышечный тонус, состояние измененного сознания, бред, галлюцинации, повышение артериального давления с последующей артериальной гипотензией, тахикардия, тахипноэ, повышение диуреза, гипокалиемия, гипонатриемия, гипергликемия, метаболический ацидоз, судороги, миоклония и рабдомиолиз, наджелудочковые и желудочковые аритмии.

Симптомы хронической интоксикации кофеином, «кофеинизм»: раздражительность, бессонница, беспокойство, эмоциональная лабильность, хроническая боль в животе.

Парацетамол

Симптомы проявляются после приема свыше 7,5–10 г: в течение первых 24 часов после приема — бледность кожных покровов, тошнота, рвота; анорексия, абдоминальная боль; увеличение протромбинового времени, нарушение метаболизма глюкозы, гипокалиемия и метаболический ацидоз (в т.ч. лактоацидоз). Симптомы нарушения функции печени могут появиться через 12–48 ч после передозировки: повышение активности «печеночных» трансаминаз, гепатонекроз. В тяжелых случаях — печеночная недостаточность с прогрессирующей энцефалопатией, кома. Редко печеночная недостаточность развивается молниеносно и может осложняться почечной недостаточностью (тубулярный некроз).

Фенирамин

Симптомы: угнетение центральной нервной системы, гипертермия, антихолинергический синдром (мидриаз, приливы крови к лицу, лихорадка, сухость во рту, задержка мочи, парез кишечника), тахикардия, артериальная гипотензия, артериальная гипертензия, тошнота, рвота, возбуждение, дезориентация, галлюцинации, психоз, судороги, аритмии. Редко у пациентов с ажитацией, судорогами или у пациентов в коме развивается рабдомиолиз и почечная недостаточность.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 23.04.2026 № 8347
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

Фенилэфрин

Симптомы: тошнота, рвота, раздражительность, возбуждение, бессонница, психоз, судороги, сердцебиение, тахикардия, повышение артериального давления, рефлекторная брадикардия.

Лечение:

Промывание желудка, назначение активированного угля в первые 6 часов после передозировки, введение донаторов SH-групп и предшественников синтеза глутатиона – метионина через 8–9 часов после передозировки и ацетилцистеина через 12 часов. Необходимость в проведении дополнительных терапевтических мероприятий (дальнейшее введение метионина и ацетилцистеина) определяется концентрацией парацетамола в крови, а также временем, прошедшим после его приема. Симптоматическая терапия.

Порог передозировки может быть снижен у пациентов пожилого возраста и детей, у пациентов, принимающих определенные лекарства (например, индукторы микросомальных ферментов печени), алкоголь или страдающих истощением.

5. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

5.1. Фармакодинамические свойства

Фармакотерапевтическая группа: Анальгетики; другие анальгетики и антипиретики; анилиды. Код АТХ: N02BE51.

Механизм действия

Комбинированный препарат. Комбинированное средство, действие которого обусловлено входящими в его состав компонентами. Оказывает жаропонижающее, слабое противовоспалительное, противоотечное, обезболивающее, противоаллергическое, сосудосуживающее действие, устраняет симптомы «простуды». Суживает сосуды носа, устраняет отек слизистой оболочки полости носа и носоглотки.

5.2. Фармакокинетические свойства

Данные отсутствуют.

6. ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

6.1. Перечень вспомогательных веществ

Флюфайт, порошок для приготовления раствора для приема внутрь с ароматом имбиря

Натрия хлорид
Лимонная кислота безводная
Натрия цитрат безводный
Аспартам
Лактоза безводная
Маннитол
Динатрия эдетат
Ароматизатор имбирный (аравийская камедь, мальтодекстрин, имбирное масло, имбирный олеорезин)
Краситель карамельный

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 23.04.2026 № 8347
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

Флюфайт, порошок для приготовления раствора для приема внутрь с ароматом меда и лимона

Натрия хлорид
Лимонная кислота безводная
Натрия цитрат безводный
Аспартам
Лактоза безводная
Маннитол
Динатрия эдетат
Ароматизатор медовый (аравийская камедь, мальтодекстрин, пропиленгликоль, ванилин, этилванилин, этилмальтол, метилфенилацетат, фенилэтилацетат, фенилуксусная кислота)
Ароматизатор лимонный (аравийская камедь, мальтодекстрин, лаймовое масло, лимонное масло, цитраль)
Краситель карамельный

Флюфайт, порошок для приготовления раствора для приема внутрь с ароматом лимона

Натрия хлорид
Лимонная кислота безводная
Натрия цитрат безводный
Аспартам
Лактоза безводная
Маннитол
Динатрия эдетат
Ароматизатор лимонный (аравийская камедь, мальтодекстрин, лаймовое масло, лимонное масло, цитраль)
Краситель солнечный закат желтый

Флюфайт, порошок для приготовления раствора для приема внутрь с ароматом малины

Натрия хлорид
Лимонная кислота безводная
Натрия цитрат безводный
Аспартам
Лактоза безводная
Маннитол
Динатрия эдетат
Ароматизатор малиновый (аравийская камедь, мальтодекстрин, пропиленгликоль, этилпара-метил-бета-фенилглицидат, ванилин, изоамилацетат, бета-ионон, бензилацетат, изоамилбутират, анизил ацетат, этиллактат, изобутилацетат, уксусная кислота)
Краситель пунцовый [Понсо 4R]

6.2. Несовместимость

Не применимо.

6.3. Срок годности (срок хранения)

3 года.

6.4. Особые меры предосторожности при хранении

Хранить при температуре не выше 25 °С.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 23.04.2026 № 8347
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

6.5. Характер и содержание упаковки

По 5 г препарата в пакетики (саше) из четырехслойного материала: бумага/полиэтилен/алюминиевая фольга/полиэтилен.

По 4 или 10 пакетиков вместе с листком-вкладышем помещают в картонную пачку.

6.6. Особые меры предосторожности при утилизации использованного лекарственного препарата или отходов, полученных после применения лекарственного препарата, и другие манипуляции с препаратом

Особые требования отсутствуют.

7. ДЕРЖАТЕЛЬ РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ

Российская Федерация
ООО «Ремедия»
123242, г. Москва, ул. Дружинниковская, д. 13.

7.1. Представитель держателя регистрационного удостоверения

Претензии потребителей направлять по адресу:
Российская Федерация
ООО «Ремедия»
123242, г. Москва, ул. Дружинниковская, д. 13.
Телефон: +7 (963) 963-12-42

8. НОМЕР (НОМЕРА) РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ

9. КАТЕГОРИЯ ОТПУСКА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Лекарственный препарат относится к категории отпуска без рецепта.

Общая характеристика лекарственного препарата Флюфайт доступна в едином реестре зарегистрированных лекарственных средств Евразийского экономического союза и на официальном сайте уполномоченного органа (экспертной организации) https://lk.regmed.ru/Register/EAEU_SmPC.