ЛП-№(014478)-(РГ-RU) от 14.04.2026

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 03.04.2026 № 6900
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

1. НАИМЕНОВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

НЕО-АНГИН, таблетки для рассасывания

2. КАЧЕСТВЕННЫЙ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ

Действующие вещества: Амилметакрезол + Дихлорбензиловый спирт + [Левоментол].

Каждая таблетка для рассасывания содержит 0,6 мг амилметакрезола, 1,2 мг дихлорбензилового спирта, 5,9 мг левоментола.

Вещества, наличие которых надо учитывать в составе лекарственного препарата: сахароза, глюкоза, краситель пунцовый (Понсо 4R) (Е124) (см. раздел 4.4.).

Полный перечень вспомогательных веществ приведен в разделе 6.1.

3. ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА

Таблетки для рассасывания.

Круглые, слегка двояковыпуклые таблетки с шероховатой поверхностью красного цвета с характерным запахом. Допускается неравномерность окрашивания, наличие пузырьков воздуха в карамельной массе и незначительная неровность краев. Возможно появление белого налета.

4. КЛИНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

4.1. Показания к применению

Препарат НЕО-АНГИН показан к применению у взрослых и детей в возрасте от 6 лет для симптоматического лечения при инфекционно-воспалительных заболеваниях полости рта и глотки.

4.2. Режим дозирования и способ применения

Режим дозирования

Рекомендованная доза: рассасывать по одной таблетке каждые 2–3 часа. Максимальная суточная доза 12 таблеток. Не превышать рекомендованную дозу. Продолжительность курса лечения – не более 3 дней. Если при приеме препарата в течение 3 дней симптомы сохраняются, необходимо пересмотреть назначенную терапию.

Дети

Дети в возрасте от 6 до 18 лет

Режим дозирования для детей от 6 до 18 лет не отличается от режима дозирования для взрослых.

Дети в возрасте от 0 до 6 лет

Безопасность и эффективность препарата НЕО-АНГИН у детей в возрасте от 0 до 6 лет на данный момент не установлены. Данные отсутствуют.

Способ применения

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 03.04.2026 № 6900
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

Для местного применения. Таблетки следует медленно рассасывать в полости рта.

4.3. Противопоказания

- Гиперчувствительность к амилметакрезолу, дихлорбензиловому спирту, левоментолу или к любому из вспомогательных веществ, указанных в разделе 6.1;

4.4. Особые указания и меры предосторожности при применении

При применении препарата НЕО-АНГИН возможно развитие реакций гиперчувствительности. В этом случае следует прекратить применение препарата.

Вспомогательные вещества

Препарат содержит сахарозу (1,4 г) и глюкозу (1,1 г) в каждой таблетке. При назначении препарата пациентам с сахарным диабетом необходимо учитывать, что 1 таблетка соответствует 10 ккал /42 кДж или 0,22 ХЕ (хлебных единиц).

Данный лекарственный препарат не следует принимать пациентам с редко встречающейся наследственной непереносимостью: галактозы, например галактоземией; фруктозы, глюкозо-галактозной мальабсорбцией или дефицитом сахаразы-изомальтазы.

Препарат содержит глюкозу, которая является источником сульфитов - диоксид серы (Е220). Это вещество в редких случаях может вызвать тяжелые реакции гиперчувствительности и бронхоспазм.

Препарат содержит краситель Понсо 4R (Е124), который может вызывать аллергические реакции.

4.5. Взаимодействие с другими лекарственными препаратами и другие виды взаимодействия

Клинически значимых взаимодействий с другими препаратами не выявлено.
Возможно одновременное применение препарата с другими местными средствами от боли в горле.

4.6. Фертильность, беременность и лактация

Беременность

Данные о применении амилметакрезола, 2,4-дихлорбензилового спирта и левоментола в период беременности отсутствуют или ограничены. Применение препарата во время беременности возможно по рекомендации врача в случае, если предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода.

Лактация

Данные о том, выделяются ли амилметакрезол, 2,4-дихлорбензиловый спирт, левоментол или их метаболиты в грудное молоко, отсутствуют. Нельзя исключать риск для новорожденных/младенцев. Применение препарата в период грудного вскармливания возможно по рекомендации врача в случае, если предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для ребенка.

4.7. Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами

НЕО-АНГИН не оказывает влияния на способность управлять транспортными средствами и работу с механизмами.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 03.04.2026 № 6900
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

4.8. Нежелательные реакции

Табличное резюме нежелательных реакций

Нижеперечисленные побочные реакции отмечались при кратковременном применении препарата в рекомендованных дозах. При лечении хронических состояний и при длительном применении возможно появление других побочных реакций.

Нежелательные реакции сгруппированы в соответствии с их частотой. Группы частоты определяются следующим образом: очень часто (≥1/10), часто (≥1/100, до <1/10), нечасто (≥1/1 000, до <1/100), редко (≥1/10 000, до <1/1 000), очень редко (<1/10 000), частота неизвестна (на основании имеющихся данных оценить невозможно).

Внутри каждой группы частоты нежелательные реакции представлены в порядке снижения серьезности.

Частота	***Нежелательные явления***
Нарушения со стороны иммунной системы	
Частота неизвестна	Реакции гиперчувствительности (в т. ч. ангионевротический отек, крапивница, сыпь, бронхоспазм, гипотензия с обмороком)
Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта	
Частота неизвестна	Тошнота, боль в животе, дискомфорт в полости рта (чувство жжения или покалывания, отек)

При появлении вышеуказанных или иных побочных реакций, не указанных в инструкции, следует прекратить применение препарата и обратиться к врачу.

Сообщение о подозреваемых нежелательных реакциях

Важно сообщать о подозреваемых нежелательных реакциях после регистрации лекарственного препарата с целью обеспечения непрерывного мониторинга соотношения «польза - риск» лекарственного препарата. Медицинским работникам рекомендуется сообщать о любых подозреваемых нежелательных реакциях лекарственного препарата через национальные системы сообщения о нежелательных реакциях государств - членов Евразийского экономического союза.

Российская Федерация

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения.

Адрес: 109012, г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1

Телефон: +7 800 550 99 03

Электронная почта: pharm@roszdravnadzor.gov.ru или npr@roszdravnadzor.gov.ru

Интернет сайт: https://roszdravnadzor.gov.ru

4.9. Передозировка

Симптомы

При применении препарата НЕО-АНГИН в соответствии с инструкцией по применению передозировка маловероятна. Случайная или преднамеренная передозировка может привести к дискомфорту со стороны желудочно-кишечного тракта.

Лечение

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 03.04.2026 № 6900
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

Симптоматическое под контролем врача.

5. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

5.1 Фармакодинамические свойства

Фармакотерапевтическая группа: препараты для лечения заболеваний горла; антисептики.

Код АТХ: R02AA03.

Механизм действия и фармакодинамические эффекты

Действующими веществами препарата НЕО-АНГИН являются амилметакрезол, 2,4-дихлорбензиловый спирт и левоментол. Амилметакрезол – производное фенола, антисептик. 2,4-дихлорбензиловый спирт является производным бензола, антисептик. Левоментол оказывает мягкое локальное местноанестезирующее действие при боли в горле, а также облегчает заложенность носа. Механизм действия амилметакрезола и 2,4-дихлорбензилового спирта связан с коагуляцией белков микробных и грибковых клеток, а также с взаимодействием с липидами клеточных мембран, что определяет эффективность против возбудителей. При комбинации активных ингредиентов отмечается синергия антимикробного действия, что ведет к уменьшению доз отдельных ингредиентов в комбинации.

Препарат оказывает антисептическое действие при инфекционно-воспалительных заболеваниях полости рта и глотки, активен в отношении широкого спектра грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов *in vitro*, оказывает антимикотическое (противогрибковое) действие.

Препарат оказывает смягчающее действие на слизистую оболочку и уменьшает раздражение, сухость и боль в горле, в том числе при глотании и речи, с началом активности через 5 минут и продолжительностью до 2 часов.

Выраженный обезболивающий эффект по сравнению с плацебо наблюдается при курсовом применении препарата в течение 3 дней.

Левоментол уменьшает сухой раздражающий кашель, связанный с простудой, и заложенность носа.

5.2. Фармакокинетические свойства

Данные по метаболизму отсутствуют.

6. ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

6.1. Перечень вспомогательных веществ

аниса звездчатого плодов масло,

мяты перечной листьев масло,

сахароза,

сироп глюкозы,

винная кислота,

краситель пунцовый (Понсо 4R).

6.2. Несовместимость

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 03.04.2026 № 6900
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

Не применимо.

6.3. Срок годности

3 года.

6.4. Особые меры предосторожности при хранении

Хранить при температуре не выше 25° С.

6.5. Характер и содержание упаковки

Первичная упаковка: По 8 или 12 таблеток в блистер из ПВХ-ПВдХ/алюминиевой фольги.

Вторичная упаковка: По 2 блистера по 8 таблеток каждый или по 2 или 4 блистера по 12 таблеток каждый вместе с листком-вкладышем в пачку картонную.

6.6 Особые меры предосторожности при утилизации использованного лекарственного препарата или отходов, полученных после применения препарата, и другие манипуляции с препаратом

Особые требования отсутствуют.

7. ДЕРЖАТЕЛЬ РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ

Германия
Медице Фарма ГмбХ & Ко. КГ
Куловег 37, 58638 Изерлон, Германия

7.1. Представитель держателя регистрационного удостоверения

Претензии потребителей направлять по адресу

Российская Федерация,
ООО «фармрег.ру», Российская Федерация, 115477, г. Москва, ул. Кантемировская, д.58, этаж 1, пом. XIII, ком. 98/1008/1.
Телефон: + 7 (499) 940-10-93, 8-800-775-85-21.
Эл. почта: pv@pharmreg.ru

8. НОМЕР РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ

9. КАТЕГОРИЯ ОТПУСКА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Лекарственный препарат относится к категории отпуска без рецепта

Общая характеристика лекарственного препарата НЕО-АНГИН доступна в едином реестре зарегистрированных лекарственных средств Евразийского экономического союза и на официальном сайте уполномоченного органа (экспертной организации) https://lk.regmed.ru/Register/EAEU_SmPC