ЛП-№(005564)-(РГ-RU) от 10.07.2025

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 08.07.2025 № 16958
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0004)

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

▼ Данный лекарственный препарат подлежит дополнительному мониторингу. Это позволит быстро выявить новую информацию по безопасности. Мы обращаемся к работникам системы здравоохранения с просьбой сообщать о любых подозреваемых нежелательных реакциях. Порядок сообщения о нежелательных реакциях представлен в разделе 4.8.

1. НАИМЕНОВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Дуоника, 10 мг + 10 мг, таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой.

2. КАЧЕСТВЕННЫЙ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ

Действующие вещества: доксиламин + пиридоксин.
Каждая таблетка содержит 10,00 мг доксиламина (в виде сукцината) и 10,00 мг пиридоксина (в виде гидрохлорида).
Вспомогательные вещества, наличие которых надо учитывать в составе лекарственного препарата: натрий - 0,358 мг (см. раздел 4.4.).
Полный перечень вспомогательных веществ приведен в разделе 6.1.

3. ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА

Таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой.
Круглые двояковыпуклые таблетки, покрытые оболочкой светло-розового цвета. На поперечном разрезе ядро белого или почти белого цвета.

4. КЛИНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

4.1. Показания к применению

Препарат Дуоника показан для применения у женщин старше 18 лет для лечения тошноты и рвоты в период беременности.

4.2. Режим дозирования и способ применения

Режим дозирования
Для контроля тошноты и рвоты, возникающих в утренние часы – 2 таблетки препарата Дуоника перед сном. В случае отсутствия адекватного контроля симптомов в течение дня – дополнительно 1 таблетка препарата утром и 1 таблетка в середине дня.
Схема дозирования в любом триместре беременности подбирается индивидуально, в зависимости от времени появления, продолжительности, тяжести и частоты симптомов. Препарат Дуоника представляет собой лекарственную форму с отсроченным высвобождением, которая оптимально действует при приеме за 4–6 часов до предполагаемого появления симптомов. Для достижения оптимального эффекта важно принимать препарат ежедневно в рамках назначенного курса лечения. Не следует назначать препарат в режиме «по требованию» («по мере необходимости»).
Максимальная рекомендованная суточная доза: 4 таблетки ежедневно (2 таблетки перед сном, 1 таблетка утром, 1 таблетка в середине дня).
По мере увеличения срока беременности следует консультировать женщину о необходимости дальнейшего приема препарата.
В случае пропуска дозы следует принять пропущенную дозу как можно скорее. Однако, если подошло время приема следующей дозы, пропущенную дозу принимать не следует. Далее следует продолжить прием препарата в соответствии с предписанным режимом дозирования.
Рекомендуется постепенное снижение дозы во время прекращения приема препарата, чтобы предотвратить возможность внезапного возобновления симптомов тошноты и рвоты.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 08.07.2025 № 16958
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0004)

Особые группы пациентов

Пациенты с нарушением функции почек

В связи с возможным увеличением периода полувыведения доксиламина, рекомендуется коррекция дозы в сторону уменьшения.

Пациенты с нарушением функции печени

В связи с возможным увеличением периода полувыведения доксиламина, рекомендуется коррекция дозы в сторону уменьшения.

Дети

Безопасность и эффективность препарата Дуоника у детей в возрасте от 0 до 18 лет не установлены. Данные отсутствуют.

Способ применения

Натощак, запивая стаканом воды (см. раздел 4.5.). Таблетки следует принимать целиком, не ломая и не разжевывая.

4.3. Противопоказания

- Гиперчувствительность к доксиламину, пиридоксину или к любому из вспомогательных веществ, перечисленных в разделе 6.1.;
- Бронхиальная астма;
- Закрытоугольная глаукома;
- Стенозирующая язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки;
- Гиперчувствительность к другим антигистаминным средствам;
- Обструкция шейки мочевого пузыря;
- Прием ингибиторов моноаминоксидазы (МАО), включая линезолид и метилтионина хлорид (метиленовый синий) (см. раздел 4.5.);
- Детский возраст до 18 лет;
- Период грудного вскармливания (см. раздел 4.6.).

4.4. Особые указания и меры предосторожности при применении

Пациентам старше 65 лет – в связи с возможными головокружениями и сонливостью, а также в связи с возможным увеличением периода полувыведения доксиламина рекомендуется коррекция дозы в сторону уменьшения кратности приема препарата.

Как все снотворные или седативные препараты, доксиламин может усугублять синдром ночного апноэ, увеличивая число и продолжительность приступов апноэ.

Возможное злоупотребление блокаторами Н1-гистаминовых рецепторов первого поколения, включая доксиламин, может приводить к физической и психологической зависимости, о которой сообщалось на фоне преднамеренного приема более высоких доз доксиламина, чем рекомендованные.

Вспомогательные вещества

Натрий в препарате Дуоника содержится во вспомогательных веществах кроскармеллоза натрия, натрия гидрокарбонат, натрия лаурилсульфат (см. раздел 6.1.). Препарат содержит менее 1 ммоль (23 мг) натрия на одну таблетку (см. раздел 2.), то есть по сути не содержит натрия.

4.5. Взаимодействие с другими лекарственными препаратами и другие виды взаимодействий

Противопоказанные комбинации

Применение препарата противопоказано женщинам, принимающим ингибиторы МАО, которые пролонгируют и усиливают антихолинергический эффект антигистаминных препаратов (см. раздел 4.3.).

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 08.07.2025 № 16958
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0004)

Нерекомендуемые комбинации

Не рекомендуется совместный прием препарата с лекарственными средствами, угнетающими центральную нервную систему (ЦНС) (барбитураты, снотворные средства, наркотические анальгетики, противокашлевые препараты, транквилизаторы и седативные средства). Доксиламин может усиливать угнетающее действие таких препаратов на ЦНС.

Атропин и другие атропиноподобные лекарственные средства

При одновременном приеме с М-холиноблокирующими средствами (атропин, имипраминовые антидепрессанты, большинство Н1-антигистаминных препаратов с атропиноподобным действием, антихолинергические противопаркинсонические препараты, спазмолитические лекарственные средства с атропиноподобным действием, дизопирамид, фенотиазиновые нейролептики, клозапин) повышается риск возникновения таких побочных эффектов, как задержка мочи, запор, сухость во рту и других.

Взаимодействие с пищей

После приема препарата с пищей возможно снижение абсорбции в желудочно-кишечном тракте, поэтому препарат следует принимать натощак.

Алкоголь

Так как алкоголь усиливает седативный эффект большинства антагонистов Н1-гистаминовых рецепторов, в том числе и доксиламина, необходимо избегать одновременное употребление препарата Дуоника с алкогольными напитками и лекарственными препаратами, содержащими этанол.

4.6. Фертильность, беременность и лактация

Беременность

Препарат предназначен для применения беременными женщинами.

На основании адекватных и хорошо контролируемых исследований комбинация доксиламина и пиридоксина может применяться на протяжении всего периода беременности. В отношении данной комбинации накоплен обширный клинический опыт (более 33 миллионов случаев применения при беременности по всему миру).

При беременности всегда существует исходный риск врожденных пороков развития, выкидыша или других неблагоприятных исходов. Фоновый исходный риск серьезных пороков развития, то есть риск рождения ребенка с врожденным дефектом, если во время беременности не происходит тератогенного воздействия, составляет примерно 1–3 %. Этот риск может увеличиться из-за факторов, вызывающих врожденные дефекты (возраст матери, медицинский или семейный анамнез, воздействие определенных лекарственных препаратов, химических веществ или радиации). Комбинация доксиламина и пиридоксина является наиболее тщательно изученной в отношении безопасности применения при беременности среди лекарственных средств, отпускаемых по рецепту. Опубликованные данные свидетельствуют, что применение препаратов, содержащих комбинацию доксиламина и пиридоксина, во время беременности не увеличивает исходный риск серьезных пороков развития.

Препараты, содержащие доксиламин и пиридоксин, были детально изучены в масштабных эпидемиологических исследованиях (когортных исследованиях типа «случай-контроль» и мета-анализах), направленных на выявление возможной тератогенности. По результатам мета-анализа 16 когортных и 11 исследований типа «случай-контроль», опубликованных в период с 1963 по 1991 гг., повышенного риска развития пороков развития в I триместре на фоне применения доксиламина и пиридоксина выявлено не было. Второй мета-анализ включал 12 когортных исследований и 5 исследований типа «случай-контроль», опубликованных с 1963 по 1985 гг. Статистически значимых взаимосвязей между использованием в I триместре комбинации доксиламина и пиридоксина и аномалиями развития плода не обнаружено.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 08.07.2025 № 16958
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0004)

Лактация
Доксиламин является низкомолекулярным веществом, поэтому возможно его проникновение в грудное молоко. У ребенка, находящегося на грудном вскармливании, могут ожидаться такие парадоксальные эффекты, как необычное возбуждение, раздражительность или седативный эффект. К группе особо риска при этом относятся дети раннего возраста с апноэ или другими респираторными синдромами.
Пиридоксин выделяется с грудным молоком. У грудных детей не отмечалось развития нежелательных реакций вследствие получения пиридоксина с молоком матери.
Препарат противопоказан в период грудного вскармливания (см. раздел 4.3.). При необходимости применения препарата в период лактации на время лечения следует прекратить грудное вскармливание.
Фертильность
Данные у человека отсутствуют.

4.7. Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами
Препарат может вызывать сонливость из-за антихолинергических свойств доксиламина. Женщинам, принимающим препарат, следует воздерживаться от занятий потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

4.8. Нежелательные реакции
Резюме профиля безопасности
Наиболее распространенной нежелательной реакцией, связанной с применением доксиламина, является сонливость. Другие нежелательные реакции, связанные с приемом доксиламина, могут включать головокружение, нервозность, боль в области эпигастрия, головную боль, ощущения сердцебиения, диарею, дезориентацию, раздражительность, судороги, задержку мочи или бессонницу.
Пиридоксин представляет собой витамин, который, как правило, не оказывает побочного действия.
Резюме нежелательных реакций
Определение частоты нежелательных реакций проводится в соответствии со следующими критериями: очень часто (≥1/10), часто (от ≥1/100 до <1/10), нечасто (от ≥1/1000 до <1/100), редко (от ≥1/10000 до <1/1000), очень редко (<1/10000), частота неизвестна (невозможно оценить на основании имеющихся данных).
В клинических исследованиях комбинации доксиламина и пиридоксина были зарегистрированы следующие нежелательные реакции:
Нарушения со стороны нервной системы
Частота неизвестна: сонливость, головокружение, головная боль.
Желудочно-кишечные нарушения
Частота неизвестна: изжога, раздражение желудка, послабление стула, запор, метеоризм, тошнота, дисгевзия.
Общие нарушения и реакции в месте введения
Частота неизвестна: слабость, утомляемость усталость, вялость, упадок сил.

В пострегистрационном периоде для комбинации доксиламина и пиридоксина сообщалось о следующих нежелательных реакциях:
Нарушения со стороны иммунной системы
Частота неизвестна: гиперчувствительность.
Нарушения метаболизма и питания
Частота неизвестна: гипергликемия, гипокалиемия.
Психические нарушения

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 08.07.2025 № 16958
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0004)

Частота неизвестна: тревога, синдром дефицита внимания/гиперактивности*, депрессия, дезориентация, нетерпимость, бессонница, перепады настроения, ночные кошмары.

Нарушения со стороны нервной системы

Частота неизвестна: судороги*, головокружение, головная боль, гипестезия, гиперсомния*, потеря сознания, сонливость.

Нарушения со стороны органа зрения

Частота неизвестна: мидриаз, светобоязнь, нечеткость зрения, снижение остроты зрения, яркость поля зрения, нарушение аккомодации.

Нарушения со стороны органа слуха и лабиринта

Частота неизвестна: дискомфорт в ушах, головокружение.

Нарушения со стороны сердца

Частота неизвестна: сердцебиение, тахикардия.

Нарушения со стороны сосудов

Частота неизвестна: гипотензия, холодные периферические отделы конечностей.

Нарушения со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения

Частота неизвестна: гипоксия.

Желудочно-кишечные нарушения

Частота неизвестна: вздутие живота, боль в животе, запор, диарея, метеоризм, рвота с кровью, тошнота, изменение цвета языка, рвота.

Нарушения со стороны кожи и подкожных тканей

Частота неизвестна: ангионевротический отек, мультиформная эритема, гипергидроз, зуд, сыпь, макулопапулезная сыпь, изменение цвета кожи.

Нарушения со стороны мышечной, скелетной и соединительной ткани

Частота неизвестна: скелетно-мышечная боль, боль в конечностях.

Нарушения со стороны почек и мочевыводящих путей

Частота неизвестна: дизурия, киста почки*, задержка мочи.

Беременность, послеродовый период и перинатальные состояния

Частота неизвестна: самопроизвольный аборт, дистресс-синдром плода*, гипокинезия плода*, внутриутробная смерть*, желтуха новорожденного*, недоношенный ребенок*, преждевременные роды.

Врожденные, семейные и генетические нарушения

Частота неизвестна: врожденные аномалии*, гипоплазия зубов*.

Общие нарушения и реакции в месте введения

Частота неизвестна: смерть, задержка развития*, дискомфорт, синдром отмены препарата, синдром отмены препарата у новорожденных*, утомляемость, пена изо рта, раздражительность**, недомогание, периферические отеки, боль.

Лабораторные и инструментальные данные

Частота неизвестна: снижение пульсации плечевой артерии, потеря веса.

Травмы, интоксикации и осложнения процедур

Частота неизвестна: передозировка.

Социальные обстоятельства

Частота неизвестна: умственная отсталость*.

* - в отношении плода/ребенка.

** - в отношении женщины и ребенка.

Сообщение о подозреваемых нежелательных реакциях

Важно сообщать о подозреваемых нежелательных реакциях после регистрации лекарственного препарата с целью обеспечения непрерывного мониторинга соотношения "польза – риск" лекарственного препарата. Медицинским работникам рекомендуется сообщать о любых подозреваемых нежелательных реакциях лекарственного препарата через национальные системы сообщения о нежелательных реакциях государств – членов Евразийского экономического союза.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 08.07.2025 № 16958
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0004)

Российская Федерация
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения
109012, г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1.
Телефон: +7 (800) 550-99-03
Электронная почта: pharm@roszdravnadzor.gov.ru
Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
https://www.roszdravnadzor.gov.ru/

Республика Казахстан
РГП на ПХВ «Национальный Центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан
010000, г. Астана, район Байконыр, ул. Амангельды Иманова, д. 13 (БЦ «Нурсаулет 2»).
Телефон: +7 (7172) 235-135
Электронная почта: farm@dari.kz
Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.ndda.kz

Республика Армения
ГНКО «Центр экспертизы лекарств и медицинских технологий»
0051, г. Ереван, проспект Комитаса, д. 49/5.
Телефон: (+374 10) 23-16-82, (+374 10) 23-08-96, (+374 60) 83-00-73
Телефон горячей линии отдела мониторинга безопасности лекарственных средств:
(+374 10) 20-05-05, (+374 96) 22-05-05
Электронная почта: info@ampra.am
Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://pharm.am

Республика Беларусь
РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»
220037, г. Минск, Товарищеский переулок, д. 2а.
Телефон: (+ 375 17) 354-53-53
Телефон отдела фармаконадзора: (+ 375 17) 242-00-29
Электронная почта: rceth@rceth.by
Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://www.rceth.by

Кыргызская Республика
Департамент лекарственных средств и медицинских изделий при Министерстве Здравоохранения Кыргызской Республики
720044, г. Бишкек, ул. 3-я Линия, д. 25.
Телефон: +996 (312) 21-92-78
Телефон горячей линии: 0800-800-26-26
Электронная почта: dlsmi@pharm.kg
Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://pharm.kg

4.9. Передозировка

Симптомы

Признаки и симптомы интоксикации могут включать беспокойство, сухость во рту, расширение зрачков, сонливость, головокружение, спутанность сознания и тахикардию.
В токсических дозах доксиламин проявляет антихолинергические эффекты, включая, нарушение аккомодации, гиперемию, гипертермию, галлюцинации, снижение настроения, тревогу, нарушение координации движений, тремор, атетоз, эпилептический синдром, кому, рабдомиолиз, острую почечную недостаточность и смерть. Непроизвольные движения иногда являются предвестниками судорог, что может свидетельствовать о тяжелой степени отравления.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 08.07.2025 № 16958
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0004)

Лечение
Промывание желудка, прием активированного угля, промывание кишечника, симптоматическая терапия.

5. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

5.1. Фармакодинамические свойства

Фармакотерапевтическая группа: антигистаминные средства системного действия; эфиры алкиламинов.
Код АТХ: R06AA59
Механизм действия
Доксиламин – блокатор Н1-гистаминовых рецепторов из группы этаноламинов, проникает через гематоэнцефалический барьер. Оказывает снотворное, седативное, антигистаминное и М-холиноблокирующее действие.
Пиридоксин (витамин В6) и его метаболиты участвуют в обмене веществ, необходимы для нормального функционирования центральной и периферической нервной системы.
Совместное применение доксиламина и пиридоксина обеспечивает устранение тошноты и рвоты. Лекарственная форма с отсроченным высвобождением обеспечивает эффективность принимаемой на ночь дозы препарата в утренние часы, что соответствует периоду времени наибольшей потребности в купировании симптомов у пациента.
Фармакодинамические эффекты
Препарат Дуоника устраняет тошноту и рвоту при беременности.

5.2. Фармакокинетические свойства

Абсорбция
Доксиламин и пиридоксин всасываются в желудочно-кишечном тракте, преимущественно в тощей кишке.
Максимальная концентрация (C_{max}) доксиламина и пиридоксина в плазме крови наблюдается через 7,5 и 5,5 ч после приема препарата, соответственно. Прием пищи замедляет всасывание как доксиламина, так и пиридоксина. Это связано с более низкой максимальной концентрацией доксиламина, степень всасывания при этом не изменяется.
Распределение
Пиридоксин хорошо связывается с белками плазмы крови, в первую очередь с альбумином. Его основной активный метаболит пиридоксаль-5'-фосфат составляет не менее 60 % концентрации циркулирующего в крови пиридоксина.
Биотрансформация
Доксиламин биотрансформируется в печени путем N-дезалкилирования до основных метаболитов: N-десметил доксиламин и N,N-дидесметил доксиламин.
Пиридоксин является пролекарством, которое метаболизируется преимущественно в печени. При биотрансформации пиридоксина образуются первичные и вторичные метаболиты, наряду с обратной конвертацией в пиридоксин. Основным, но неактивным, метаболитом пиридоксина является 4-пиридоксиновая кислота. Пиридоксин эффективнее захватывается гепатоцитами в фосфорилированной форме. Скорость фосфорилирования пиридоксина намного больше, чем дефосфорилирования. К активным метаболитам пиридоксина относят, главным образом, пиридоксаль-5'-фосфат.
Элиминация
Основные метаболиты доксиламина: N-десметил доксиламин и N,N-дидесметил доксиламин выводятся почками.
Период полувыведения доксиламина и пиридоксина составляет 12,5 и 0,5 ч соответственно.

6. ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

6.1. Перечень вспомогательных веществ

Ядро таблетки:

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 08.07.2025 № 16958
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0004)

Целлюлоза микрокристаллическая
Магния трисиликат
Кроскармеллоза натрия
Кремния диоксид коллоидный
Магния стеарат
Пленочная оболочка:
Гипромеллоза
Макрогол 400
Макрогол 8000
Триэтилцитрат
Метакриловой кислоты и этилакрилата сополимер [1:1]
Тальк
Титана диоксид
Кремния диоксид коллоидный безводный
Натрия гидрокарбонат
Натрия лаурилсульфат
Краситель железа оксид красный

6.2. Несовместимость
Не применимо.

6.3. Срок годности (срок хранения)
2 года.

6.4. Особые меры предосторожности при хранении
Хранить при температуре не выше 25 °С.

6.5. Характер и содержание первичной упаковки
По 10 или 15 таблеток в контурную ячейковую упаковку или контурную ячейковую упаковку с перфорацией из пленки поливинилхлоридной/поливинилиденхлоридной и фольги алюминиевой печатной лакированной.
6 контурных ячейковых упаковок по 10 таблеток или 4 контурные ячейковые упаковки по 15 таблеток вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона для потребительской тары.

6.6. Особые меры предосторожности при уничтожении использованного лекарственного препарата или отходов, полученных после применения препарата, и другие манипуляции с препаратом
Нет особых требований к утилизации.

7. ДЕРЖАТЕЛЬ РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ
Российская Федерация
Акционерное общество «Валента Фармацевтика» (АО «Валента Фарм»)
141108, Московская область, г. Щелково, ул. Фабричная, д. 2.
Телефон: +7 (495) 933-48-62, факс +7 (495) 933-48-63.
Электронная почта: info@valentapharm.com

7.1. Представитель держателя регистрационного удостоверения на территории Союза
Претензии потребителей направлять по адресу:
Российская Федерация
Акционерное общество «Валента Фармацевтика» (АО «Валента Фарм»)
141108, Московская область, г. Щелково, ул. Фабричная, д. 2.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 08.07.2025 № 16958
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0004)

Телефон: +7 (495) 933-48-62, факс +7 (495) 933-48-63
Электронная почта: info@valentapharm.com

Республика Казахстан
Представительство Акционерного общества «Валента Фармацевтика» в Республике Казахстан
050009, г. Алматы, Алмалинский район, Проспект Абая, д. 151, офис № 1106.
Телефон: +7 (727) 334-15-51
Моб. телефон: +7 (701) 946-73-00, +7 (771) 779-79-37
Электронная почта: asia@valentapharm.com

Республика Армения
ООО «Бета Фарм»
0014, г. Ереван, проспект Азатутян, д. 27.
Телефон: (+374 99) 19-04-00
Электронная почта: karen.mkrtchyan@betapharm.am

Республика Беларусь
ООО «ИЛПО»
220013, г. Минск, ул. 2-ая Шестая линия, д. 9.
Телефон: (+375 17) 270-55-84, факс (+375 17) 270-55-95
Электронная почта: ilpo@nsys.by

Кыргызская Республика
ООО «Медсервис.KG» («Медсервис.КейДжи»)
720051, г. Бишкек, ул. Курманжан Датка, д. 133.
Телефон: +996 (312) 36-90-39
Электронная почта: z.abdullaeva@pharmtrade.kg

8. НОМЕР РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ
ЛП-№(005564)-(РГ-RU)

9. ДАТА ПЕРВИЧНОЙ РЕГИСТРАЦИИ (ПОДТВЕРЖДЕНИЯ РЕГИСТРАЦИИ, ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ)
Дата первой регистрации: 27.05.2024

10. ДАТА ПЕРЕСМОТРА ТЕКСТА
Общая характеристика лекарственного препарата Дуоника доступна на информационном портале Евразийского экономического союза в информационно-коммуникационной сети «Интернет» http://eec.eaeunion.org/