ЛП-N=(006626)-(РГ-RU) от 20.08.2024

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 16.02.2026 № 2788
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0013)

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

1. НАИМЕНОВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Торговое наименование: Ультрикс® Квадри Вакцина гриппозная четырехвалентная инактивированная расщепленная (далее - Ультрикс® Квадри).

Дозировка: 0,5 мл/доза.

Лекарственная форма: раствор для внутримышечного введения.

Общепринятое наименование препарата: вакцина для профилактики гриппа [инактивированная].

2. КАЧЕСТВЕННЫЙ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ

2.1 Общее описание

Вакцина представляет собой смесь протективных поверхностных и внутренних антигенов вирусов гриппа типа А (подтипы A(H_1N_1) и A(H_3N_2)) и типа В (линии Yamagata и линии Victoria) в фосфатно-солевом буферном растворе.

Антигены получают из очищенных вирусов гриппа типа А (подтипы A(H_1N_1) и A(H_3N_2)) и типа В (линии Yamagata и линии Victoria), выращенных раздельно в развивающихся куриных эмбрионах.

Антигенный состав вакцины изменяется каждый год в соответствии с эпидемической ситуацией и рекомендациями ВОЗ.

Вакцина не содержит адъювантов, адсорбентов и консервантов.

2.2 Качественный и количественный состав

0,5 мл (1 доза) содержит

Действующие вещества

Антиген вируса гриппа типа А (H_1N_1)	-	(15 ± 2,0) мкг ГА;
Антиген вируса гриппа типа А (H_3N_2)	-	(15 ± 2,0) мкг ГА;
Антиген вируса гриппа типа В (линия Yamagata)	-	(15 ± 2,0) мкг ГА;
Антиген вируса гриппа типа В (линия Victoria)	-	(15 ± 2,0) мкг ГА.

Вспомогательные вещества

Полный перечень вспомогательных веществ приведен в разделе 6.1.

3. ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА

Раствор для внутримышечного введения.

Бесцветная или слегка желтоватая прозрачная жидкость, возможно наличие слабой опалесценции.

4. КЛИНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

4.1. Показания к применению

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 16.02.2026 № 2789
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0013)

Активная ежегодная профилактическая иммунизация против сезонного гриппа детей с 6-ти месячного возраста, подростков и взрослых без ограничения возраста.

Вакцина особенно показана:

1. Лицам с высоким риском заболевания и возникновения осложнений в случае заболевания гриппом:

- часто болеющим острыми респираторными вирусными инфекциями;

- страдающим хроническими соматическими заболеваниями, в том числе болезнями и пороками развития сердечно-сосудистой, дыхательной и центральной нервной систем, хроническими заболеваниями почек, болезнями обмена веществ, сахарным диабетом, хронической анемией, аллергическими заболеваниями (кроме аллергии к куриным белкам), врожденным или приобретенным иммунодефицитом, в том числе инфицированным вирусом иммунодефицита человека;

- беременным женщинам (см. раздел «Фертильность, беременность и лактация»);

- старше 60 лет.

2. Лицам, по роду учебной или профессиональной деятельности имеющим высокий риск заболевания гриппом или заражения им других лиц:

- учащимся образовательных учреждений, студентам;

- работникам медицинских и образовательных учреждений, транспорта, коммунальной и социальной сфер, полиции, военнослужащим и т.д.

4.2. Режим дозирования и способ применения

Режим дозирования

Вакцинация проводится ежегодно в осенне-зимний период. Возможна вакцинация в начале эпидемического подъема заболеваемости гриппом.

Взрослые: вакцину вводят однократно в прививочной дозе 0,5 мл.

Дети:

- Дети в возрасте 36 месяцев – 17 лет: вакцину вводят однократно в прививочной дозе 0,5 мл.

- Дети в возрасте 6-35 месяцев: вакцину вводят двукратно с интервалом 28 дней в прививочной дозе 0,25 мл (1/2 дозы).

Способ применения

Не вводить внутривенно!

Вакцину следует вводить внутримышечно.

Перед применением вакцину следует выдержать до комнатной температуры.

Взрослые: вакцину вводят внутримышечно в область дельтовидной мышцы (верхняя треть наружной поверхности плеча).

Дети:

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 16.02.2026 № 2789
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0013)

- Дети в возрасте 36 месяцев – 17 лет: вакцину вводят внутримышечно в область дельтовидной мышцы (верхняя треть наружной поверхности плеча).

- Дети в возрасте 12-35 месяцев: вакцину вводят внутримышечно в переднебоковую поверхность бедра или область дельтовидной мышцы.

- Дети в возрасте 6-11 месяцев: вакцину вводят внутримышечно в переднебоковую поверхность бедра.

Схема отбора 1/2 дозы вакцины:

1. При использовании шприца, содержащего 0,5 мл (1 дозу) препарата, необходимо удалить половину содержимого, надавив на поршень до соответствующей риски на шприце или до метки на этикетке шприца. Пациенту вводится оставшееся количество вакцины (0,25 мл).

2. При использовании ампулы, содержащей 0,5 мл (1 дозу) препарата, отбирается 0,25 мл вакцины стерильным шприцем, имеющим соответствующую градуировку. Остаток вакцины в ампуле должен быть немедленно утилизирован.

Не пригоден к применению препарат в шприцах/ампулах с нарушенной целостностью или маркировкой, при изменении физических свойств (цвета, прозрачности), при наличии в растворе посторонних частиц, при истекшем сроке годности, нарушении требований к условиям хранения.

Вскрытие шприцев/ампул и проведение вакцинации осуществляют при строгом соблюдении правил асептики и антисептики. Препарат во вскрытых шприцах/ампулах хранению не подлежит.

4.3. Противопоказания

- аллергические реакции на предшествующие прививки гриппозными вакцинами;

- аллергические реакции на куриный белок и другие компоненты вакцины;

- сильная реакция (температура выше 40 ºС, отек и гиперемия в месте введения свыше 8 см в диаметре) или осложнения на предыдущее введение гриппозных вакцин в анамнезе;

- острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний - прививки проводят через 2-4 недели после выздоровления или в период реконвалесценции или ремиссии;

- при нетяжелых ОРВИ, острых кишечных заболеваниях вакцинацию проводят после нормализации температуры;

- детский возраст до 6 мес.

4.4. Особые указания и меры предосторожности при применении

Перед прививкой вакцинируемые должны быть осмотрены врачом (фельдшером) с обязательным проведением термометрии. При температуре тела выше 37 °С вакцинацию не проводят.

Подобно всем инъекционным вакцинам, при возникновении редко встречающегося после введения вакцины анафилактического явления необходимо всегда располагать возможностью оказания медицинской помощи и осуществления наблюдения.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 16.02.2026 № 2789
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0013)

Кабинеты, где проводится вакцинация, должны быть оснащены средствами противошоковой терапии. Вакцинированный должен находиться под наблюдением медработника в течение 30 мин после вакцинации.

Ультрикс® Квадри ни при каких случаях не допускается вводить внутривенно.

Подобно остальным вакцинам, защитный иммунный ответ может возникать не у всех вакцинируемых лиц.

Дети

Ультрикс® Квадри не применяется у детей младше 6 месяцев.

4.5. Взаимодействие с другими лекарственными препаратами и другие виды взаимодействия

Вакцина Ультрикс® Квадри может применяться одновременно с инактивированными и живыми вакцинами Национального календаря профилактических прививок (за исключением туберкулезных вакцин) и инактивированными вакцинами Календаря профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям (за исключением антирабических). При этом должны учитываться противопоказания к каждой из применяемых вакцин; препараты следует вводить в разные участки тела разными шприцами.

Вакцина Ультрикс® Квадри может вводиться на фоне базисной терапии основного заболевания. Вакцинация пациентов, получивших иммуносупрессивную терапию (глюкокортикостероиды, цитотоксические препараты, радиотерапия), может быть менее эффективной.

4.6. Фертильность, беременность и лактация

Беременность

Данные клинических исследований вакцины с участием женщин на II и III триместрах беременности показали, что вакцинация не оказывает отрицательного воздействия на плод и организм женщины и может применяться при беременности. Вакцинация данным препаратом может проводиться, начиная со II триместра беременности.

Кормление грудью

Опыт применения гриппозных инактивированных вакцин показывает, что вакцинация женщины в период грудного вскармливания не оказывает токсического воздействия на ребенка.

Окончательное решение о вакцинации беременных и кормящих грудью женщин должно приниматься врачом индивидуально с учетом риска заражения гриппом и возможных осложнений, вызванных заболеванием гриппом.

Фертильность

Данные о влиянии на фертильность отсутствуют.

4.7. Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 16.02.2026 № 2789
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0013)

Ультрикс® Квадри не влияет на способность управлять транспортом или заниматься другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

4.8. Нежелательные реакции

Нежелательные явления, представленные ниже, перечислены в соответствии с поражением органов и систем органов и частотой встречаемости. Частота встречаемости определяется следующим образом: очень часто (≥1/10), часто (≥1/100 и <1/10), нечасто (≥1/1000 и <1/100), редко (≥1/10000 и <1/1000), очень редко (< 1/10000, включая отдельные случаи), «частота неизвестна» (на основании имеющихся данных оценить невозможно).

Нарушения со стороны нервной системы

Часто: головная боль.

Нарушения со стороны кожи и подкожных тканей

Часто: повышенная потливость.

Нарушения со стороны мышечной, скелетной и соединительной ткани

Нечасто: артралгия, миалгия.

Общие нарушения и реакции в месте введения

Очень часто: боль, гиперемия в месте инъекции.

От «нечасто» до «часто»: уплотнение, отек и зуд в месте инъекции; повышение температуры, озноб; слабость, усталость; кашель; боль в горле.

Указанные нежелательные реакции могут развиться в день вакцинации; обычно исчезают самостоятельно через 1-3 дня и не требуют лечения.

Дети:

В клинических исследованиях с участием детей от 6 месяцев до 6 лет сообщалось о следующих реакциях, отсутствующих у взрослых:

Нарушения со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения:

Частота неизвестна: ринит; кашель;

Желудочно-кишечные нарушения:

Частота неизвестна: диарея.

У детей от 6 месяцев до 3 лет большинство нежелательных явлений выявлялось после первой вакцинации.

Несмотря на отсутствие клинических данных, нельзя исключить возможность развития характерных для гриппозных вакцин неврологических расстройств и аллергических реакций (в том числе реакций немедленного типа на куриный белок и другие компоненты вакцины).

Пациент должен быть проинформирован о необходимости сообщить врачу о любых выраженных или не указанных в данной инструкции побочных реакциях.

Сообщение о подозреваемых нежелательных реакциях

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 16.02.2026 № 2789
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0013)

Важно сообщать о подозреваемых нежелательных реакциях после регистрации лекарственного препарата с целью обеспечения непрерывного мониторинга соотношения «польза – риск» лекарственного препарата. Медицинским работникам рекомендуется сообщать о любых подозреваемых нежелательных реакциях лекарственных препаратов через национальные системы сообщения о нежелательных реакциях государств-членов Евразийского экономического союза.

Российская Федерация

109012, г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр.1

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)

Телефон: +7 800 550 99 03

Электронная почта: pharm@roszdravnadzor.gov.ru

Адрес в интернете: https://roszdravnadzor.gov.ru

Республика Армения

0051, г. Ереван, пр. Комитаса 49/5

«Научный Центр экспертизы лекарств и медицинских технологий имени академика А.Э. Габриэляна» АОЗТ Министерства здравоохранения Республики Армения

Тел.: (+374 10) 20-05-05, (+374 96) 22-05-05

Электронная почта: vigilance@pharm.am

Адрес в интернете: https://www.pharm.am

Республика Беларусь

220037, г. Минск, Товарищеский пер., д. 2а

Республиканское Унитарное Предприятие «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» Министерства здравоохранения Республики Беларусь

Телефон: +375 (17) 242 00 29

Электронная почта: rcpl@rceth.by, rceth@rceth.by

Адрес в интернете: https://www.rceth.by

Республика Казахстан

010000, г. Астана, ул. А. Иманова, д.13

РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан

Тел.: +7 (7172) 23-51-35

Электронная почта: pdlc@dari.kz

Адрес в интернете: https://www.ndda.kz

4.9. Передозировка

О случаях передозировки не сообщалось.

5. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 16.02.2026 № 2789
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0013)

5.1. Фармакодинамические свойства

Фармакотерапевтическая группа: Вакцины. Вакцина для профилактики вирусных инфекций. Вакцина для профилактики гриппа.

Код АТХ: J07BB02

Механизм действия

Вакцина стимулирует выработку гуморальных антител против гемагглютининов. Данные антитела нейтрализуют вирусы гриппа. После вакцинации антитела появляются через 8-12 дней, иммунитет сохраняется до 12 месяцев.

Клиническая эффективность и безопасность

В ходе клинических исследований, проведенных с участием разных групп населения: взрослые от 18 до 60 лет, взрослые старше 60 лет, дети от 6 месяцев до 6 лет, дети от 6 лет до 18 лет, беременные женщины в возрасте 18-40 лет, находящихся на II-III триместрах беременности, оценивали иммуногенность вакцины Ультрикс® Квадри по показателям:

- уровень сероконверсии (должен быть более 40%);

- уровень серопротекции (должен быть более 70%);

- фактор сероконверсии (отношение средних титров после/до вакцинации, должен быть более 2,5).

Иммуногенность вакцины оценивалась на 28-й день после введения вакцины методом реакции торможения гемагглютинации (РТГА).

Результаты иммуногенности представлены ниже:

Таблица 1. Результаты исследования иммуногенности у взрослых.

Штамм антигена	**Взрослые в возрасте от 18 до 60 лет**	**Взрослые старше 60 лет**
Уровень сероконверсии, %		
A (H_1N_1)	76,7	80,0
A (H_3N_2)	76,7	100
B (линия Yamagata)	78,3	94,0
B (линия Victoria)	78,3	86,0
Уровень серопротекции, %		
A (H_1N_1)	99,2	96,0 (86,5; 98,9)
A (H_3N_2)	87,5	100,0
B (линия Yamagata)	90,0	94,0 (83,8; 97,9)
B (линия Victoria)	72,5	90,0 (78,6; 95,7)
Фактор сероконверсии		
A (H_1N_1)	13,90	9,8
A (H_3N_2)	15,92	13,3
B (линия Yamagata)	16,14	8,7
B (линия Victoria)	17,59	6,7

Таблица 2. Результаты исследования иммуногенности у беременных женщин.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 16.02.2026 № 2789
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0013)

Штамм антигена	**Беременные женщины от 18 до 40 лет (II триместр беременности)**	**Беременные женщины от 18 до 40 лет (III триместр беременности)**
Уровень сероконверсии, %		
A (H_1N_1)	86,0±4,9	88,0±4,6
A (H_3N_2)	96,0±2,8	90,0±4,24
B (линия Yamagata)	70,0±6,5	84,0±5,2
B (линия Victoria)	84,0±5,4	54,0±7,05
Уровень серопротекции, %		
A (H_1N_1)	100,0	100,0
A (H_3N_2)	100,0	90,0±4,24
B (линия Yamagata)	100,0	98,0±2,0
B (линия Victoria)	100,0	50,0±7,07
Фактор сероконверсии		
A (H_1N_1)	10,6	17,4
A (H_3N_2)	13,0	18,1
B (линия Yamagata)	5,2	6,3
B (линия Victoria)	8,4	4,5

Таблица 3. Результаты исследования иммуногенности у детей.

Штамм антигена	**Дети от 6 мес. до 3 лет**	**Дети от 3 лет до 6 лет**	**Дети от 6 лет до 18 лет**
Уровень сероконверсии, %			
A (H_1N_1)	74,5 (66,9 - 80,8)	60 (50,7 - 68,7)	66,3
A (H_3N_2)	79,9 (72,7 - 85,5)	85,5 (77,7 - 90,8)	47,5
B (линия Yamagata)	75,8 (68,4 - 82)	54,5 (45,2 - 63,5)	67,5
B (линия Victoria)	43 (35,3 - 51)	95,5 (89,8 - 98,0)	62,5
Уровень серопротекции, %			
A (H_1N_1)	94 (88,9 - 96,8)	100 (96,6 -100)	100,0
A (H_3N_2)	96,6 (92,4 - 98,6)	100 (96,6 -100)	98,8
B (линия Yamagata)	79,9 (72,7 - 85,5)	60 (50,7 - 68,7)	73,6
B (линия Victoria)	43 (35,3 - 51)	97,3 (92,3 - 99,1)	70,0
Фактор сероконверсии			
A (H_1N_1)	5,1	5,5	6,61
A (H_3N_2)	10,7	10,7	2,67
B (линия Yamagata)	5,6	5,2	4,36
B (линия Victoria)	3,7	10	4,07

Результаты клинических исследований вакцины с участием детей в возрасте до 6 месяцев на момент подготовки ОХЛП отсутствуют.

Серологические исследования сывороток привитых добровольцев показали, что применение вакцины Ультрикс® Квадри приводит к выраженному образованию антител к вирусов гриппа типа А (подтипы A(H_1N_1) и A(H_3N_2)) и типа В (линии Yamagata и линии Victoria), что свидетельствует о высокой иммуногенности вакцины.

В связи с ежегодным изменением штаммового состава вакцин для профилактики гриппа, а также учитывая индивидуальный иммунный ответ вакцинируемых, показатели у разных лиц могут отличаться от указанных выше.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 16.02.2026 № 2789
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0013)

Изменения показателей клинического и биохимического анализов крови, общего анализа мочи, регистрируемые в динамике наблюдения, расценены как клинически незначимые и независящие от вакцинации, аллергизирующих свойств у изучаемой вакцины не выявлено, серьезных нежелательных явлений, случаев смерти или других значимых нежелательных явлений в ходе исследований зарегистрировано не было.

Данные, полученные в проведенных клинических исследованиях, свидетельствуют о хорошей переносимости, безопасности, отсутствии реактогенности и об иммуногенных свойствах вакцины Ультрикс® Квадри. Результаты иммуногенности демонстрируют выраженные защитные свойства вакцины Ультрикс® Квадри. Добавление 4-го штамма в вакцину обеспечивает дополнительную защиту от вирусов гриппа В, не снижая безопасность вакцины и не влияя на ее иммуногенность к трем другим штаммам, но повышая профилактический потенциал вакцинации как мероприятия.

5.2. Фармакокинетические свойства

Для вакцин не требуется оценка фармакокинетических свойств.

5.3. Данные доклинической безопасности

В доклинических исследованиях, полученных по результатам стандартных исследований мутагенной активности, общей токсичности (острой и субхронической токсичности), иммунотоксичности, репродуктивной токсичности, аллергизирующих свойств в реакции анафилактического шока особый вред для человека не выявлен.

6. ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

6.1. Перечень вспомогательных веществ

Полисорбат 80, октоксинол-10, фосфатно-солевой буферный раствор (натрия хлорид, динатрия гидрофосфат дигидрат, натрия дигидрофосфат дигидрат, вода для инъекций).

Ультрикс® Квадри содержит менее 1 ммоль (23 мг) натрия на дозу, то есть, по сути, не содержит натрия.

Ультрикс® Квадри может содержать следовые количества яичного белка - овальбумина (не более 1 мкг на дозу), используемого в производственном процессе.

6.2. Несовместимость

Информация приведена в п. 4.5.

В связи с отсутствием исследований совместимости, данный лекарственный препарат не следует смешивать с другими лекарственными препаратами.

6.3. Срок годности

1 год.

6.4. Особые меры предосторожности при хранении

Хранить при температуре от 2 ºС до 8 ºС.

Не замораживать.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 16.02.2026 № 2789
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0013)

Препарат, подвергшийся замораживанию, применению не подлежит.

6.5. Характер и содержимое первичной упаковки

Раствор для внутримышечного введения.

Первичная упаковка:

По 0,5 мл (1 доза) в шприцах из стекла с впаянной иглой с защитным колпачком или ампулах вместимостью 1 мл из стекла.

На каждый шприц наклеивают этикетки из бумаги или пленки самоклеящейся. Объем препарата в шприце, соответствующий 1/2 дозы, отмечен риской/меткой, нанесенной на корпус шприца, или меткой, нанесенной на край этикетки.

На каждую ампулу наклеивают этикетку из бумаги или этикетку самоклеящуюся, или текст наносят непосредственно на ампулу.

Вторичная упаковка:

1. По 1 шприцу в контурной ячейковой упаковке, покрытой фольгой алюминиевой или бумагой, или пленкой полимерной. По 1 контурной ячейковой упаковке в пачке из картона вместе с листком-вкладышем.

2. По 1 шприцу в контурной ячейковой упаковке, покрытой фольгой алюминиевой или бумагой, или пленкой полимерной. По 10 контурных ячейковых упаковок в пачке из картона вместе с листком-вкладышем.

3. По 10 ампул в коробке (пачке) из картона вместе с листком-вкладышем. Коробки (пачки) оклеивают этикеткой-бандеролью из бумаги.

4. По 5 ампул в контурной ячейковой упаковке. По 2 контурные ячейковые упаковки с ампулами в пачке из картона вместе с листком-вкладышем.

В продаже могут находиться не все виды и размеры упаковок.

6.6. Особые меры предосторожности при уничтожении использованного лекарственного препарата или отходов, полученных после применения лекарственного препарата или работы с ним

Использованные и неиспользованные шприцы/ампулы утилизируют в соответствии с требованиями действующего законодательства государств-членов Евразийского экономического союза.

6.7 Условия отпуска

Отпускают по рецепту (упаковки по 1 шприцу).

Для лечебно-профилактических учреждений (упаковки по 10 шприцев или 10 ампул).

7. ДЕРЖАТЕЛЬ РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ

ООО «ФОРТ», Россия

390540, Рязанская обл., м.р-н Рязанский, с.п. Окское, д. Ялтуново, тер. фармацевтического комплекса, стр. 1а

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 16.02.2026 № 2789
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0013)

Тел.: (4912) 70-15-00, факс (4312) 70-15-01

Электронная почта: info@fort-bt.ru

7.1. Представитель держателя регистрационного удостоверения

Претензии потребителей направлять по адресу:

ООО «ФОРТ», Россия

390540, Рязанская обл., м.р-н Рязанский, с.п. Окское, д. Ялтуново, тер. фармацевтического комплекса, стр. 1а

Тел.: (4912) 70-15-00, факс (4312) 70-15-01

Электронная почта: info@fort-bt.ru

8. НОМЕР РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ

9. ДАТА ПЕРВИЧНОЙ РЕГИСТРАЦИИ (ПОДТВЕРЖДЕНИЯ РЕГИСТРАЦИИ, ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ)

10. ДАТА ПЕРЕСМОТРА ТЕКСТА

Общая характеристика лекарственного препарата «Ультрикс® Квадри Вакцина гриппозная четырехвалентная инактивированная расщепленная» доступна на информационном портале Евразийского экономического союза в информационно-коммуникационной сети «Интернет» http://eec.eaeunion.org/.