

**ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА****1. НАИМЕНОВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА**

ПЕМЕТРЕКСЕД-ТЛ, 100 мг, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий.  
ПЕМЕТРЕКСЕД-ТЛ, 500 мг, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий.

**2. КАЧЕСТВЕННЫЙ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ**

Действующее вещество: пеметрексед.

**ПЕМЕТРЕКСЕД-ТЛ, 100 мг, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий**

Каждый флакон содержит 100 мг пеметрекседа (в виде пеметрекседа динатрия гемипентагидрата).

Вспомогательные вещества, наличие которых надо учитывать в составе лекарственного препарата: натрий (см. раздел 4.4).

**ПЕМЕТРЕКСЕД-ТЛ, 500 мг, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий**

Каждый флакон содержит 500 мг пеметрекседа (в виде пеметрекседа динатрия гемипентагидрата).

Вспомогательные вещества, наличие которых надо учитывать в составе лекарственного препарата: натрий (см. раздел 4.4).

После восстановления каждый мл раствора содержит 25 мг пеметрекседа (см. раздел 6.6).  
Полный перечень вспомогательных веществ приведен в разделе 6.1.

**3. ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА**

Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий.

Белая или почти белая лиофилизированная масса или порошок.

**4. КЛИНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ****4.1. Показания к применению**

ПЕМЕТРЕКСЕД-ТЛ показан к применению у взрослых в возрасте от 18 лет.

**Немелкоклеточный рак легкого**

- Препарат ПЕМЕТРЕКСЕД-ТЛ в комбинации с цисплатином показан для первой линии терапии пациентов с местно-распространенным или метастатическим немелкоклеточным раком легкого, кроме преимущественно плоскоклеточной гистологической формы.
- Препарат ПЕМЕТРЕКСЕД-ТЛ в качестве монотерапии показан для поддерживающей терапии местно-распространенного или метастатического немелкоклеточного рака легкого, кроме преимущественно плоскоклеточной гистологической формы, у пациентов с отсутствием прогрессирования после первой линии терапии на основе препаратов платины.
- Препарат ПЕМЕТРЕКСЕД-ТЛ в качестве монотерапии показан для второй линии терапии у пациентов с местно-распространенным или метастатическим

немелкоклеточным раком легкого, кроме преимущественно плоскоклеточной гистологической формы.

#### Злокачественная мезотелиома плевры

- Препарат ПЕМЕТРЕКСЕД-ТЛ в комбинации с цисплатином показан для лечения пациентов с нерезектабельной злокачественной мезотелиомой плевры, ранее не проходивших курс химиотерапии.

#### **4.2. Режим дозирования и способ применения**

Терапия препаратом ПЕМЕТРЕКСЕД-ТЛ может проводиться только под наблюдением врача, имеющего опыт применения противоопухолевых препаратов.

##### Режим дозирования

###### *Комбинированное лечение с цисплатином*

Рекомендованная доза препарата ПЕМЕТРЕКСЕД-ТЛ составляет 500 мг/м<sup>2</sup> в виде внутривенной инфузии в течение не менее чем 10 минут в первый день каждого 21-дневного цикла терапии.

Рекомендованная доза цисплатина составляет 75 мг/м<sup>2</sup> в виде внутривенной инфузии в течение 2 часов примерно через 30 минут после завершения инфузии пеметрекседа в первый день каждого 21-дневного цикла терапии. Пациентам должна быть проведена противорвотная терапия, а также обеспечена адекватная гидратация до и/или после введения цисплатина (также следует обратиться к инструкции по медицинскому применению цисплатина с целью получения специфических рекомендаций относительно дозирования).

###### *Монотерапия*

Для пациентов с немелкоклеточным раком легкого после химиотерапии рекомендованная доза препарата ПЕМЕТРЕКСЕД-ТЛ составляет 500 мг/м<sup>2</sup> в виде внутривенной инфузии в течение 10 минут в первый день каждого 21-дневного цикла.

###### *Рекомендации перед началом применения препарата ПЕМЕТРЕКСЕД-ТЛ*

Для снижения частоты возникновения и степени тяжести кожных реакций необходимо применять глюкокортикостероиды за день до введения, в день введения и на следующий день после введения пеметрекседа. Глюкокортикостероид должен быть эквивалентен 4 мг дексаметазона, принимаемого перорально 2 раза в день (см. раздел 4.4).

Для снижения токсичности препарата пациенты, получающие терапию препаратом ПЕМЕТРЕКСЕД-ТЛ, должны ежедневно принимать препараты фолиевой кислоты или мультивитамины с содержанием фолиевой кислоты (от 350 до 1000 мкг). Необходимо принять минимум пять доз фолиевой кислоты в течение семи дней перед первым введением препарата ПЕМЕТРЕКСЕД-ТЛ. Применение должно продолжаться на протяжении всего курса терапии препаратом ПЕМЕТРЕКСЕД-ТЛ, а также в течение 21 дня после последнего введения препарата ПЕМЕТРЕКСЕД-ТЛ. В 7-дневный период перед первым введением препарата ПЕМЕТРЕКСЕД-ТЛ пациенту необходимо ввести одну внутримышечную инъекцию витамина В<sub>12</sub> (1000 мкг), далее – по одной инъекции каждые три цикла. Последующие инъекции витамина В<sub>12</sub> могут быть выполнены в тот же день, что и введение препарата ПЕМЕТРЕКСЕД-ТЛ.

###### *Наблюдение*

Перед каждым введением препарата ПЕМЕТРЕКСЕД-ТЛ необходимо проводить мониторинг всех пациентов, который включает в себя общий анализ крови с лейкоцитарной формулой и определение числа тромбоцитов. Для оценки функции почек и печени перед каждым введением препарата ПЕМЕТРЕКСЕД-ТЛ необходимо выполнить биохимический анализ крови. Перед началом каждого цикла химиотерапии у пациентов должны наблюдаться следующие показатели: абсолютное число нейтрофилов (АЧН)  $\geq 1500/\text{мм}^3$ , число тромбоцитов  $\geq 100\,000/\text{мм}^3$ . Клиренс креатинина (КК) должен составлять  $\geq 45$  мл/мин. Концентрация общего билирубина должна быть в  $\leq 1,5$  раза ниже верхней границы нормы (ВГН). Уровень щелочной фосфатазы (ЩФ), аспартатаминотрансферазы (АСТ) и аланинаминотрансферазы (АЛТ) должен быть в  $\leq 3$  раза ниже ВГН. Уровень ЩФ, АСТ и АЛТ в  $\leq 5$  раз ниже ВГН допустим при наличии метастазов в печени.

#### Коррекция дозы

Коррекцию дозы перед повторными циклами следует проводить, основываясь на наиболее низком из гематологических показателей или на максимально выраженной негематологической токсичности в течение предыдущего цикла лечения. Лечение может быть отложено с целью восстановления от проявлений токсичности (см. раздел 4.4). По мере восстановления терапию следует продолжить в соответствии с рекомендациями, приведенными в таблицах 1–3, которые относятся к применению препарата ПЕМЕТРЕКСЕД-ТЛ в монотерапии или в комбинации с цисплатином.

**Таблица 1.** Режим дозирования препарата ПЕМЕТРЕКСЕД-ТЛ (при монотерапии или при комбинированной терапии) и цисплатина

| Гематологическая токсичность                                                                                        | Коррекция дозы ( $\text{мг}/\text{м}^2$ )                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Минимальное АЧН $< 500/\text{мм}^3$ и минимальное число тромбоцитов $\geq 50\,000/\text{мм}^3$                      | 75% от предыдущей дозы (препарат ПЕМЕТРЕКСЕД-ТЛ и цисплатин) |
| Минимальное число тромбоцитов $< 50\,000/\text{мм}^3$ , независимо от минимального АЧН                              | 75% от предыдущей дозы (препарат ПЕМЕТРЕКСЕД-ТЛ и цисплатин) |
| Минимальное число тромбоцитов $< 50\,000/\text{мм}^3$ с кровотечением <sup>а</sup> , независимо от минимального АЧН | 50% от предыдущей дозы (препарат ПЕМЕТРЕКСЕД-ТЛ и цисплатин) |

<sup>а</sup> Эти критерии соответствуют определению кровотечения  $\geq 2$ -й степени в соответствии с Общими критериями токсичности Национального института рака (NCI CTC).

При развитии негематологической токсичности (за исключением нейротоксичности)  $\geq 3$ -й степени лечение необходимо отложить до восстановления показателей, соответствующих уровню у пациента до начала лечения или меньших. Далее терапию необходимо возобновить в соответствии с рекомендациями, приведенными в таблице 2.

**Таблица 2.** Режим дозирования препарата ПЕМЕТРЕКСЕД-ТЛ (при монотерапии или при комбинированной терапии) и цисплатина

| Негематологическая токсичность <sup>а, б</sup>                                           | Коррекция дозы препарата ПЕМЕТРЕКСЕД-ТЛ ( $\text{мг}/\text{м}^2$ ) | Коррекция дозы цисплатина ( $\text{мг}/\text{м}^2$ ) |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Любая токсичность 3-й или 4-й степени, за исключением воспаления слизистой оболочки      | 75% от предыдущей дозы                                             | 75% от предыдущей дозы                               |
| Диарея, требующая госпитализации (независимо от степени), или диарея 3-й или 4-й степени | 75% от предыдущей дозы                                             | 75% от предыдущей дозы                               |
| Воспаление слизистой оболочки 3-й или 4-й степени                                        | 50% от предыдущей дозы                                             | 100% от предыдущей дозы                              |

<sup>a</sup> Согласно критериям NCI CTC.

<sup>b</sup> За исключением нейротоксичности.

В случае нейротоксичности рекомендованная коррекция дозы препарата ПЕМЕТРЕКСЕД-ТЛ и цисплатина представлена в таблице 3. При нейротоксичности 3-й или 4-й степени терапию необходимо прекратить.

**Таблица 3.** Режим дозирования препарата ПЕМЕТРЕКСЕД-ТЛ (при монотерапии или при комбинированной терапии) и цисплатина

| Степень нейротоксичности <sup>a</sup> | Коррекция дозы препарата ПЕМЕТРЕКСЕД-ТЛ (мг/м <sup>2</sup> ) | Коррекция дозы цисплатина (мг/м <sup>2</sup> ) |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 0–1                                   | 100% от предыдущей дозы                                      | 100% от предыдущей дозы                        |
| 2                                     | 100% от предыдущей дозы                                      | 50% от предыдущей дозы                         |

<sup>a</sup> Согласно критериям NCI CTC.

Терапию препаратом ПЕМЕТРЕКСЕД-ТЛ следует отменить, если у пациента наблюдается гематологическая или негематологическая токсичность 3-й или 4-й степени после двух снижений дозы. Терапию следует немедленно прекратить при наличии нейротоксичности 3-й или 4-й степени.

### Особые группы пациентов

#### *Пациенты пожилого возраста*

При проведении клинических исследований не было получено данных о повышении риска развития нежелательных явлений у пациентов в возрасте 65 лет и старше по сравнению с пациентами в возрасте до 65 лет. Режим снижения доз соответствует общим рекомендациям.

#### *Пациенты с нарушением функции почек*

Препарат ПЕМЕТРЕКСЕД-ТЛ в основном выводится в неизменном виде почками. При показателях КК  $\geq 45$  мл/мин коррекция дозы не требуется. Пациентам, у которых КК  $< 45$  мл/мин, применение препарата ПЕМЕТРЕКСЕД-ТЛ не рекомендуется в связи с недостаточностью данных по применению препарата у такой категории пациентов (см. разделы 4.3 и 4.4).

#### *Пациенты с нарушением функции печени*

Не было установлено взаимосвязи между показателями АСТ, АЛТ или общего билирубина и фармакокинетикой пеметрекседа. Недостаточно данных по применению препарата у пациентов с нарушением функции печени с повышением концентрации билирубина больше чем в 1,5 раза от ВГН и/или повышением активности аминотрансфераз больше чем в 3 раза от ВГН (при отсутствии метастазов в печени) либо больше чем в 5 раз от ВГН (при наличии метастазов в печени).

### Дети

Безопасность и эффективность препарата ПЕМЕТРЕКСЕД-ТЛ у детей в возрасте до 18 лет не установлены. Данные отсутствуют.

### Способ применения

Внутривенно.

Препарат ПЕМЕТРЕКСЕД-ТЛ вводится в виде внутривенной инфузии в течение не менее чем 10 минут в первый день каждого 21-дневного цикла терапии. Инструкцию по приготовлению раствора лекарственного препарата перед применением см. в разделе 6.6.

*Меры предосторожности, принимаемые перед применением препарата и при работе с ним*

Информация по работе с цитотоксическими препаратами приведена в разделе 6.6.

#### 4.3. Противопоказания

- Гиперчувствительность к пеметрекседу или любому из вспомогательных веществ, перечисленных в разделе 6.1.
- Миелосупрессия (абсолютное число нейтрофилов  $<1500/\text{мм}^3$ , число тромбоцитов  $<100\,000/\text{мм}^3$ ) (см. раздел 4.4).
- Выраженная почечная недостаточность (КК  $<45$  мл/мин) (см. раздел 4.4).
- Беременность, период грудного вскармливания (см. раздел 4.6).
- Детский возраст (отсутствие данных по безопасности и эффективности).
- Одновременное применение с вакциной против желтой лихорадки (см. раздел 4.5).

#### 4.4. Особые указания и меры предосторожности при применении

##### С осторожностью

- При нарушении функции печени.
- При тяжелых заболеваниях сердечно-сосудистой системы, в том числе инфаркте миокарда и нарушении мозгового кровообращения.

##### Особые указания

Пеметрексед может подавлять функцию костного мозга, что проявляется в форме нейтропении, тромбоцитопении и анемии (или панцитопении) (см. раздел 4.8). Миелосупрессия является дозолимитирующей токсичностью пеметрекседа. Перед каждым введением препарата ПЕМЕТРЕКСЕД-ТЛ необходимо проводить общий анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы и количества тромбоцитов. Препарат ПЕМЕТРЕКСЕД-ТЛ не следует применять до тех пор, пока абсолютное число нейтрофилов не достигнет  $\geq 1500/\text{мм}^3$ , а число тромбоцитов –  $\geq 100\,000/\text{мм}^3$ . Снижение дозы в начале очередного цикла основывается на наименьших значениях АЧН, числа тромбоцитов и максимальной негематологической токсичности, которые наблюдались в предыдущем цикле терапии (см. раздел 4.2).

В тех случаях, когда проводилась премедикация фолиевой кислотой и витамином В<sub>12</sub>, отмечались меньшая токсичность и снижение частоты гематологической и негематологической токсичности 3-й или 4-й степени, проявлявшейся в форме нейтропении, фебрильной нейтропении и инфекции с нейтропенией 3-й или 4-й степени. Поэтому всех пациентов, принимающих терапию препаратом ПЕМЕТРЕКСЕД-ТЛ, следует проинструктировать по поводу применения фолиевой кислоты и витамина В<sub>12</sub> в качестве профилактической меры для снижения токсичности, связанной с терапией (см. раздел 4.2). У пациентов, не получавших премедикацию глюкокортикостероидом, отмечались кожные реакции. Премедикация дексаметазоном (или эквивалентным препаратом) может снизить частоту и степень тяжести кожных реакций (см. раздел 4.2).

Было изучено недостаточное количество пациентов с КК <45 мл/мин. Поэтому применение пеметрекседа у пациентов с КК <45 мл/мин не рекомендуется (см. раздел 4.2).

У пациентов с почечной недостаточностью легкой или умеренной степени (КК от 45 до 79 мл/мин) следует избегать применения нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП), таких как ибупрофен и ацетилсалициловая кислота (>1,3 г/сут), в течение двух дней перед применением пеметрекседа, в день применения и в течение двух дней после применения пеметрекседа (см. раздел 4.5).

У пациентов с почечной недостаточностью легкой или умеренной степени, которым показана терапия пеметрекседом, применение НПВП с длительным периодом полувыведения должно быть прекращено как минимум за пять дней до введения пеметрекседа, следует избегать его в день введения и в течение как минимум двух дней после введения пеметрекседа (см. раздел 4.5).

При монотерапии пеметрекседом или при его применении в комбинации с другими химиотерапевтическими препаратами отмечались серьезные явления со стороны почек, в том числе острая почечная недостаточность. При этом у многих пациентов, у которых они наблюдались, были факторы риска развития явлений со стороны почек, в том числе обезвоживание или уже имеющиеся гипертензия или диабет. Согласно пострегистрационным данным, при применении пеметрекседа в качестве монотерапии или в комбинации с другими химиотерапевтическими препаратами также отмечались случаи развития нефрогенного несахарного диабета и некроза почечных канальцев. Большинство случаев разрешались после прекращения применения пеметрекседа. Необходим регулярный контроль за состоянием пациентов на предмет развития острого тубулярного некроза, снижения функции почек и признаков и симптомов нефрогенного несахарного диабета (например, гипернатриемии).

Влияние тканевой жидкости, например плеврального выпота или асцита, на действие пеметрекседа до конца не определено. В ходе клинических исследований у пациентов с солидными опухолями устойчивое скопление тканевой жидкости не оказывало влияния на плазменную концентрацию или клиренс пеметрекседа по сравнению с пациентами без скопления тканевой жидкости. Таким образом, следует рассмотреть возможность дренирования скопившейся жидкости перед началом терапии пеметрекседом, однако оно может не понадобиться.

Ввиду желудочно-кишечной токсичности пеметрекседа, применяемого в комбинации с цисплатином, наблюдалось сильное обезвоживание. Пациентам должна быть проведена противорвотная терапия, а также обеспечена адекватная гидратация до и/или после терапии.

Серьезные сердечно-сосудистые нежелательные явления, в том числе инфаркт миокарда и нарушение мозгового кровообращения, наблюдались нечасто в ходе клинических исследований пеметрекседа, как правило, при применении в комбинации с другим цитотоксическим препаратом, при этом в основном у пациентов с фоновыми факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний (см. раздел 4.8).

Поскольку состояние иммуносупрессии распространено у онкологических пациентов, не рекомендуется сопутствующая вакцинация живыми аттенуированными вакцинами (см. разделы 4.3 и 4.5).

Ввиду того что пеметрексед может вызывать генетические нарушения, половозрелым мужчинам не рекомендуется зачинать детей на протяжении терапии пеметрекседом и в течение 3 месяцев после нее. Рекомендуется использовать надежные методы контрацепции или воздерживаться от половой жизни. Вследствие того, что пеметрексед может вызывать необратимое бесплодие, мужчинам рекомендуется рассмотреть возможность сохранения спермы до начала терапии.

Женщины детородного возраста должны применять надежные методы контрацепции во время терапии пеметрекседом и в течение 6 месяцев после ее завершения (см. раздел 4.6).

Отмечались случаи лучевого пневмонита у пациентов, получавших лучевую терапию до, во время или после терапии пеметрекседом. Таким пациентам должно быть уделено особое внимание; следует с осторожностью применять другие радиосенсибилизирующие препараты.

У пациентов, проходивших лучевую терапию несколько недель или лет назад, отмечались случаи рецидива побочных явлений лучевой терапии.

#### Вспомогательные вещества

*ПЕМЕТРЕКСЕД-ТЛ, 100 мг, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий*

Препарат содержит менее 1 ммоль (менее 23 мг) натрия в 1 флаконе, т.е. по сути не содержит натрия.

*ПЕМЕТРЕКСЕД-ТЛ, 500 мг, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий*

Препарат содержит 2,4 ммоль (около 54 мг) натрия в 1 флаконе.

Необходимо соблюдать осторожность при назначении лицам, соблюдающим бессолевую диету.

#### **4.5. Взаимодействие с другими лекарственными препаратами и другие виды взаимодействия**

Пеметрексед в основном выводится в неизменном виде почками посредством канальцевой секреции и, в меньшей степени, посредством клубочковой фильтрации.

Исследования *in vitro* продемонстрировали, что пеметрексед активно секретируется посредством ОАТЗ (переносчик органических анионов человека 3-го типа).

Совместное применение с нефротоксичными препаратами, такими как аминогликозиды, «петлевые» диуретики, платиносодержащие препараты, циклоспорин, может привести к снижению клиренса пеметрекседа. Следует с осторожностью применять такие препараты в комбинации с пеметрекседом, при необходимости тщательно следить за КК.

Совместное применение препаратов, которые также выводятся посредством канальцевой секреции (например, пробенецид, пенициллин), может привести к снижению клиренса пеметрекседа. Следует с осторожностью применять такие препараты в комбинации с пеметрекседом, при необходимости тщательно следить за КК.

У пациентов с нормальной функцией почек ( $\text{КК} \geq 80$  мл/мин) применение НПВП в высоких дозах (например, ибупрофена  $>1600$  мг/сут или ацетилсалициловой кислоты  $\geq 1,3$  г/сут) может привести к снижению клиренса пеметрекседа и, как следствие, повысить частоту нежелательных явлений при применении пеметрекседа. Следует с осторожностью применять НПВП в высоких дозах одновременно с пеметрекседом у пациентов с нормальной функцией почек.

У пациентов с почечной недостаточностью легкой или умеренной степени ( $\text{КК}$  от 45 до 79 мл/мин) следует избегать одновременного применения пеметрекседа с НПВП в высоких дозах в течение двух дней перед применением пеметрекседа, в день применения и в течение двух дней после применения пеметрекседа (см. раздел 4.4).

Ввиду отсутствия данных о возможном взаимодействии между пеметрекседом и НПВП с длительным периодом полувыведения, такими как пироксикам или рофекоксиб, одновременное применение этих препаратов с пеметрекседом у пациентов с почечной недостаточностью легкой или умеренной степени следует прекратить на следующий период времени: в течение как минимум пяти дней до введения пеметрекседа, в день введения и в течение как минимум двух дней после введения пеметрекседа (см. раздел 4.4). Если требуется совместное применение НПВП и пеметрекседа, у пациентов должен проводиться строгий мониторинг проявлений токсичности, особенно миелосупрессии и токсичности со стороны желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

Пеметрексед подвергается ограниченному метаболизму в печени. Результаты исследований *in vitro* с применением микросом печени человека показали, что не ожидается клинически значимого ингибирования пеметрекседом метаболического клиренса препаратов, которые метаболизируются изоферментами CYP3A, CYP2D6, CYP2C9, CYP1A2.

#### Взаимодействия, общие для цитотоксических препаратов

Из-за высокого риска тромбообразования у пациентов с онкологическими заболеваниями часто проводится антикоагуляционная терапия. Высокая индивидуальная вариабельность состояния свертывающей системы крови в течение заболевания и возможность взаимодействия между пероральными антикоагулянтами и противоопухолевой химиотерапией требуют повышенной частоты мониторинга МНО (международное нормализованное отношение), если принимается решение о лечении пациента пероральными антикоагулянтами.

*Противопоказано одновременное применение:* вакцина против желтой лихорадки ввиду риска генерализованной вакцинальной болезни с летальным исходом (см. раздел 4.3).

*Не рекомендуется одновременное применение:* живые аттенуированные вакцины (кроме вакцины против желтой лихорадки, с которой одновременное применение противопоказано) ввиду риска системного заболевания с возможным летальным исходом. Риск повышается у пациентов с уже имеющейся иммуносупрессией из-за их фонового заболевания. Следует применять инактивированные вакцины, если таковые существуют (полиомиелит) (см. раздел 4.4).

Фармакокинетика пеметрекседа не изменяется при применении с фолиевой кислотой перорально, витамином В<sub>12</sub> внутримышечно и при комбинированном применении с цисплатином.

### **4.6. Фертильность, беременность и лактация**

#### Контрацепция у мужчин и женщин

Пеметрексед может вызывать генетические нарушения. Женщины в детородном возрасте должны пользоваться эффективными методами контрацепции в ходе терапии пеметрекседом и в течение 6 месяцев после ее завершения. Половозрелым мужчинам следует использовать надежные средства контрацепции, так как не рекомендуется зачинать детей на протяжении терапии и в течение 3 месяцев после ее завершения.

#### Беременность

Данные по применению пеметрекседа у беременных женщин отсутствуют, но предполагается, что он, как и другие антиметаболиты, может вызывать серьезные врожденные дефекты у плода при применении во время беременности. В исследованиях на животных наблюдалось токсическое действие на репродуктивную функцию. Пеметрексед не следует применять во время беременности (см. раздел 4.3).

#### Лактация

Неизвестно, выделяется ли пеметрексед в грудное молоко, так что нельзя исключить нежелательных реакций у грудного ребенка. Кормление грудью во время терапии пеметрекседом следует прекратить (см. раздел 4.3).

#### Фертильность

Вследствие того, что терапия пеметрекседом может вызывать необратимое бесплодие, мужчинам рекомендуется рассмотреть возможность сохранения спермы до начала терапии.

#### **4.7. Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами**

Влияние пеметрекседа на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами не изучалось. Однако отмечалось, что пеметрексед может вызывать повышенную утомляемость. Поэтому пациентов, у которых наблюдается повышенная утомляемость, следует предостеречь от управления транспортными средствами и работы с механизмами.

#### **4.8. Нежелательные реакции**

##### Резюме профиля безопасности

Наиболее распространенными нежелательными явлениями, связанными с терапией пеметрекседом (в качестве монотерапии или в комбинированной терапии), являются: подавление функции костного мозга, проявляющееся в виде анемии, нейтропении, лейкопении, тромбоцитопении; желудочно-кишечная токсичность, проявляющаяся в виде анорексии, тошноты, рвоты, диареи, запора, фарингита, воспаления слизистой оболочки и стоматита. Другие нежелательные явления включают нефротоксичность, повышенный уровень аминотрансфераз, алопецию, усталость, обезвоживание, сыпь, инфекцию/сепсис и нейропатию. Редко наблюдаются такие явления, как синдром Стивенса–Джонсона и токсический эпидермальный некролиз.

##### Резюме нежелательных реакций

Ниже приведены сведения о нежелательных явлениях применения пеметрекседа как в качестве монотерапии, так и в комбинации с другими лекарственными средствами (независимо от причинно-следственной связи), наблюдавшихся в клинических исследованиях и в пострегистрационном периоде.

Нежелательные реакции приведены в соответствии с классами систем органов, представленными в медицинском словаре для нормативно-правовой деятельности (MedDRA). В каждом классе систем органов нежелательные реакции распределены и представлены по частоте развития: очень часто ( $\geq 1/10$ ), часто ( $\geq 1/100$ , но  $< 1/10$ ), нечасто ( $\geq 1/1000$ , но  $< 1/100$ ), редко ( $\geq 1/10\,000$ , но  $< 1/1000$ ), очень редко ( $< 1/10\,000$ ), частота неизвестна (на основании имеющихся данных оценить невозможно).

Ниже представлены нежелательные явления разной степени тяжести, независимо от причинно-следственной связи, наблюдавшиеся в ходе клинических исследований при применении пеметрекседа в сравнении с доцетакселом, при применении пеметрекседа в комбинации с цисплатином в сравнении с гемцитабином в комбинации с цисплатином, при применении пеметрекседа в комбинации с цисплатином в сравнении с монотерапией цисплатином, при применении пеметрекседа с оптимальной поддерживающей терапией в сравнении с плацебо с оптимальной поддерживающей терапией и в пострегистрационном периоде.

*Инфекции и инвазии:* очень часто – инфекции<sup>1</sup>, фарингит; часто – сепсис<sup>2</sup>; очень редко – дермогиподермит.

*Нарушения со стороны крови и лимфатической системы:* очень часто – нейтропения, лейкопения, снижение уровня гемоглобина; часто – фебрильная нейтропения, тромбоцитопения; нечасто – панцитопения; редко – аутоиммунная гемолитическая анемия.

*Нарушения со стороны иммунной системы:* часто – гиперчувствительность; редко – анафилактический шок.

*Нарушения метаболизма и питания:* часто – дегидратация.

*Нарушения со стороны нервной системы:* часто – нарушение вкуса, периферическая моторная нейропатия, периферическая сенсорная нейропатия, головокружение; нечасто – острое нарушение мозгового кровообращения, ишемический инсульт, внутричерепное кровоизлияние.

*Нарушения со стороны органа зрения:* часто – конъюнктивит, сухость глаз, повышенное слезотечение, сухой кератоконъюнктивит, отек век, заболевание поверхностных тканей глаза.

*Нарушения со стороны сердца:* часто – сердечная недостаточность, аритмия; нечасто – стенокардия, инфаркт миокарда, ишемическая болезнь сердца, наджелудочковая аритмия.

*Нарушения со стороны сосудов:* нечасто – периферическая ишемия<sup>3</sup>.

*Нарушения со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения:* нечасто – легочная эмболия, интерстициальная пневмония<sup>2, 4</sup>.

*Желудочно-кишечные нарушения:* очень часто – стоматит, анорексия, рвота, диарея, тошнота; часто – диспепсия, запор, боль в животе; нечасто – ректальные кровотечения, желудочно-кишечные кровотечения, перфорация кишечника, эзофагит, колит<sup>5</sup>.

*Нарушения со стороны печени и желчевыводящих путей:* часто – повышенный уровень АЛТ, повышенный уровень АСТ; редко – гепатит.

*Нарушения со стороны кожи и подкожных тканей:* очень часто – сыпь, шелушение; часто – гиперпигментация, зуд, мультиформная эритема, алопеция, крапивница; редко – эритема; очень редко – синдром Стивенса–Джонсона<sup>2</sup>, токсический эпидермальный некролиз<sup>2</sup>, пемфигоид, буллезный дерматит, приобретенный буллезный эпидермолиз, эритематозный отек<sup>6</sup>, псевдоцеллюлит, дерматит, экзема, пруриго.

*Нарушения со стороны почек и мочевыводящих путей:* очень часто – снижение КК, увеличение уровня креатинина<sup>5</sup>; часто – почечная недостаточность, снижение скорости клубочковой фильтрации; частота неизвестна – нефрогенный несахарный диабет, некроз почечных канальцев.

*Общие нарушения и реакции в месте введения:* очень часто – утомляемость; часто – пирексия, боль, отек, боль в груди, воспаление слизистой оболочки.

*Лабораторные и инструментальные данные:* часто – повышение уровня гамма-глутамилтрансферазы (ГГТ).

*Травмы, интоксикации и осложнения процедур:* нечасто – лучевой эзофагит, лучевой пневмонит, редко – случаи рецидива побочных эффектов лучевой терапии.

<sup>1</sup> С нейтропенией или без нее.

<sup>2</sup> Иногда с летальным исходом.

<sup>3</sup> Иногда приводит к некрозу конечностей.

<sup>4</sup> С дыхательной недостаточностью.

<sup>5</sup> Наблюдалось только в комбинации с цисплатином.

<sup>6</sup> Преимущественно нижних конечностей.

#### Сообщение о подозреваемых нежелательных реакциях

Важно сообщать о подозреваемых нежелательных реакциях после регистрации препарата с целью обеспечения непрерывного мониторинга соотношения «польза–риск» лекарственного препарата. Медицинским работникам рекомендуется сообщать о любых подозреваемых нежелательных реакциях лекарственного препарата через национальные системы сообщения о нежелательных реакциях государств – членов Евразийского экономического союза.

## Российская Федерация

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)

109012, г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1

Телефон: +7 (800) 550-99-03

Электронная почта: [pharm@roszdravnadzor.gov.ru](mailto:pharm@roszdravnadzor.gov.ru)

Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

<https://www.roszdravnadzor.gov.ru/>

### 4.9. Передозировка

#### Симптомы

Нейтропения, анемия, тромбоцитопения, воспаление слизистой оболочки, сенсорная полинейропатия и сыпь.

Ожидаемые осложнения передозировки включают подавление функции костного мозга, проявляющееся нейтропенией, тромбоцитопенией и анемией. Также может наблюдаться присоединение инфекций с лихорадкой или без лихорадки, диарея и/или воспаление слизистой оболочки.

#### Лечение

Симптоматическое, включая немедленное применение кальция фолината.

В случае подозрения на передозировку препарата следует регулярно контролировать общий анализ крови.

## 5. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

### 5.1. Фармакодинамические свойства

Фармакотерапевтическая группа: противоопухолевые средства; антиметаболиты; аналоги фолиевой кислоты

Код АТХ: L01BA04

#### Механизм действия и фармакодинамические эффекты

Пеметрексед является многоцелевым противоопухолевым антифолатом, который оказывает свое действие путем нарушения ключевых фолат-зависимых метаболических процессов, крайне важных для репликации клеток.

Исследования *in vitro* показали, что пеметрексед ведет себя как многоцелевой антифолат, ингибируя тимидилатсинтазу (TS), дигидрофолатредуктазу (DHFR), глицинамидрибонуклеотидформилтрансферазу (GARFT), которые являются ключевыми фолат-зависимыми ферментами при биосинтезе тимидиновых и пуриновых нуклеотидов.

Пеметрексед поступает в клетки с помощью переносчика восстановленных фолатов и мембранных белковых фолат-связывающих транспортных систем. Поступая в клетку, пеметрексед быстро и эффективно превращается в полиглутаматные формы с помощью фермента фолилполиглутаматсинтетазы. Полиглутаматные формы задерживаются в клетках и являются более мощными ингибиторами TS и GARFT. Полиглутаминирование – это зависимый от времени и концентрации процесс, который встречается в опухолевых клетках и, в меньшей степени, в нормальных тканях. У метаболитов, полученных в процессе полиглутаминирования, увеличен внутриклеточный период полувыведения, вследствие чего увеличивается действие препарата в опухолевых клетках.

При комбинированном применении пеметрекседа и цисплатина в исследованиях *in vitro*

наблюдался синергизм противоопухолевого действия.

## 5.2. Фармакокинетические свойства

### Распределение

Постоянный объем распределения пеметрекседа равен 9 л/м<sup>2</sup>. Исследования *in vitro* показали, что около 81% пеметрекседа связывается с белками плазмы. Нарушение функции почек разной степени тяжести не оказывало заметного влияния на связывание пеметрекседа с белками плазмы.

### Биотрансформация

Пеметрексед ограниченно подвергается метаболизму в печени.

### Элиминация

Пеметрексед в основном выводится почками, при этом от 70 до 90% введенной дозы обнаруживается в неизменном виде в течение первых 24 часов после введения.

Исследования *in vitro* показывают, что пеметрексед активно секретируется ОАТЗ (переносчиком органических анионов 3). У пациентов с нормальной функцией почек общий системный клиренс пеметрекседа составляет 91,8 мл/мин, период полувыведения из плазмы составляет 3,5 часа. Межпациентная вариабельность клиренса умеренная, составляет 19,3%. Площадь под кривой «концентрация–время» и максимальная плазменная концентрация пеметрекседа увеличивается пропорционально дозе. Фармакокинетика пеметрекседа остается неизменной в течение нескольких циклов терапии.

Одновременное введение цисплатина не оказывает влияние на фармакокинетические свойства пеметрекседа. Применение фолиевой кислоты перорально и витамина В<sub>12</sub> внутримышечно не влияло на фармакокинетику пеметрекседа.

## 6. ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

### 6.1. Перечень вспомогательных веществ

#### Вспомогательные вещества

Маннитол (Е421)

0,1 М раствор натрия гидроксида

или

0,1 М раствор хлористоводородной кислоты

до pH 7,2

### 6.2. Несовместимость

Пеметрексед несовместим с растворами, содержащими кальций, в том числе с раствором Рингера лактата и раствором Рингера. Данный лекарственный препарат не следует смешивать с другими лекарственными препаратами, за исключением упомянутых в разделе 6.6.

### 6.3. Срок годности (срок хранения)

#### Невскрытый флакон

2 года.

#### Приготовленный раствор

При температуре 2–8 °С не более 24 часов.

### **6.4. Особые меры предосторожности при хранении**

Хранить при температуре от 15 до 25 °С.

Условия хранения после восстановления лекарственного препарата см. в разделе 6.3.

### **6.5. Характер и содержимое первичной упаковки**

По 100 мг или 500 мг в пересчете на пеметрексед во флаконы из прозрачного стекла I гидролитического класса объемом 10 мл (для дозировки 100 мг) и 50 мл (для дозировки 500 мг), герметично укупоренные пробками из резины типа I, обжатые колпачками комбинированными (алюминиевыми с предохранительными пластмассовыми крышками). На флакон наклеивают этикетку из бумаги этикеточной или писчей или самоклеящуюся этикетку.

По одному флакону вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона коробочного.

### **6.6. Особые меры предосторожности при уничтожении использованного лекарственного препарата или отходов, полученных после применения лекарственного препарата, и другие манипуляции с препаратом**

#### Рекомендации по приготовлению раствора для инфузий

1. В качестве растворителя используется только 0,9% раствор натрия хлорида (без консервантов).
2. Для препарата дозировкой 100 мг: для получения восстановленного раствора содержимое флакона (100 мг действующего вещества) растворяют в 4,2 мл 0,9% раствора натрия хлорида (без консервантов) до концентрации 25 мг/мл (приблизительно).  
Для препарата дозировкой 500 мг: для получения восстановленного раствора содержимое флакона (500 мг действующего вещества) растворяют в 20 мл 0,9% раствора натрия хлорида (без консервантов) до концентрации 25 мг/мл.  
Каждый флакон аккуратно взбалтывают до полного растворения лиофилизата. Полученный раствор должен быть прозрачным; допустимо изменение цвета раствора от бесцветного до желтоватого или зеленовато-желтоватого цвета. Неблагоприятного воздействия на качество препарата при этом не оказывается. Требуется дополнительное разведение.
3. Соответствующий объем полученного раствора пеметрекседа нужно дополнительно развести до 100 мл 0,9% раствором натрия хлорида (без консервантов).
4. Растворы пеметрекседа, приготовленные согласно инструкциям выше, совместимы с системами для инфузий из поливинилхлорида и полиолефина.
5. Перед введением раствор препарата необходимо визуально проверить на наличие механических включений и изменение цвета. Если наблюдаются механические включения, раствор не вводят.
6. Раствор для инфузий необходимо использовать немедленно или в течение не более 24 часов при условии хранения при температуре 2–8 °С, так как раствор пеметрекседа не содержит антибактериальных консервантов. Раствор предназначен только для

однократного применения. Неиспользованный раствор препарата подлежит уничтожению.

#### Меры предосторожности при приготовлении и введении

Как и при обращении с другими потенциально токсичными противоопухолевыми препаратами, следует проявлять осторожность при обращении и приготовлении раствора для инфузии пеметрекседа. Рекомендуется использовать перчатки. Если раствор пеметрекседа попал на кожу, следует немедленно и тщательно промыть кожу водой с мылом. Если раствор пеметрекседа попал на слизистую оболочку, следует тщательно промыть ее водой. Пеметрексед не оказывает кожно-нарывного действия. При повреждении сосуда не существует специального антидота. Зафиксировано незначительное число случаев повреждения сосуда при введении пеметрекседа, которые не оценивались исследователем как серьезные. При повреждении сосуда необходимо следовать локальным стандартам лечения.

#### Утилизация

Весь оставшийся лекарственный препарат и отходы следует уничтожить в соответствии с установленными национальным законодательством требованиями.

### **7. ДЕРЖАТЕЛЬ РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ**

Российская Федерация  
ООО «Технология лекарств»  
141400, Московская обл., г. Химки, ул. Рабочая, д. 2а, стр. 31, пом. 21  
Телефон: +7 (495) 225-62-00  
Факс: +7 (495) 225-62-65  
Электронная почта: info@drugsformulation.ru

#### **7.1. Представитель держателя регистрационного удостоверения**

##### Претензии потребителей направлять по адресу:

Российская Федерация  
ООО «Технология лекарств»  
141400, Московская обл., г. Химки, ул. Рабочая, д. 2а, стр. 31, пом. 21  
Телефон: +7 (495) 225-62-00  
Факс: +7 (495) 225-62-65  
Электронная почта: info@drugsformulation.ru

### **8. НОМЕР РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ**

### **9. ДАТА ПЕРВИЧНОЙ РЕГИСТРАЦИИ (ПОДТВЕРЖДЕНИЯ РЕГИСТРАЦИИ, ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ)**

Дата первой регистрации:

### **10. ДАТА ПЕРЕСМОТРА ТЕКСТА**

Общая характеристика лекарственного препарата НЕМЕТРЕКСЕД-ТЛ доступна на информационном портале Евразийского экономического союза в информационно-коммуникационной сети Интернет: <http://ees.eaeunion.org/>.