ЛП-№(013498)-(РГ-RU) от 10.02.2026

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 05.02.2026 № 1979
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

# ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

## 1. НАИМЕНОВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Муравьиный спирт, 1,4 %, раствор для наружного применения спиртовой.

## 2. КАЧЕСТВЕННЫЙ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ

Действующее вещество: муравьиная кислота.

Каждые 100 мл препарата содержат 1,4 г муравьиной кислоты.

Вещества, наличие которых надо учитывать в составе лекарственного препарата: этанол (спирт этиловый) 70 % (см. разделы 4.4).

Полный перечень вспомогательных веществ приведен в разделе 6.1.

## 3. ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА

Раствор для наружного применения спиртовой.

Прозрачная бесцветная жидкость с резким характерным запахом.

## 4. КЛИНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### 4.1. Показания к применению

Препарат Муравьиный спирт показан к применению у взрослых пациентов.

В составе комплексной терапии при невралгии, миалгии, артралгии, неспецифических моно- и полиартритах в качестве отвлекающего средства.

### 4.2. Режим дозирования и способ применения

Режим дозирования

Взрослые

Растирают кожу в болезненной области. Небольшое количество препарата наносят на область болевых ощущений и легкими движениями растирают. Курс лечения продолжается в зависимости от лечебного эффекта, но не более 3- 4 недель. При необходимости курс можно повторить.

Дети

Безопасность и эффективность препарата у детей в возрасте от 0 до 18 лет не установлена. Данные отсутствуют.

Способ применения

Наружно.

### 4.3. Противопоказания

Гиперчувствительность к муравьиной кислоте или к любому из вспомогательных веществ, перечисленных в разделе 6.1.

Нарушение целостности кожных покровов или воспалительные заболевания кожи в месте предполагаемого нанесения (в т.ч. дерматит, экзема).

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 05.02.2026 № 1979
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

Беременность, период грудного вскармливания (см. раздел 4.6.).

Детский возраст до 18 лет (в связи с отсутствием данных).

**4.4. Особые указания и меры предосторожности при применении**

С осторожностью

Не допускается нанесение препарата на лицо и шею, половые органы, вблизи слизистых оболочек, на слизистые оболочки, раны. При попадании в глаза следует тщательно промыть их большим количеством воды. После нанесения препарата необходимо вымыть руки.

**4.5. Взаимодействие с другими лекарственными препаратами и другие виды взаимодействия**

При одновременном применении с препаратами для наружного применения, содержащими органические соединения, могут образовываться новые соединения и наблюдаться денатурация белковых компонентов.

**4.6. Фертильность, беременность и лактация**

Противопоказано применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания.

**4.7. Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами**

Муравьиный спирт не оказывает влияния на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами.

**4.8. Нежелательные реакции**

Резюме нежелательных реакций

Гиперемия, зуд кожи, аллергические реакции, ощущение жжения в мете нанесения препарата.

Сообщение о подозреваемых нежелательных реакциях

Важно сообщать о подозреваемых нежелательных реакциях после регистрации лекарственного препарата с целью обеспечения непрерывного мониторинга соотношения «польза – риск» лекарственного препарата. Медицинским работникам рекомендуется сообщать о любых подозреваемых нежелательных реакциях лекарственного препарата через национальные системы сообщения о нежелательных реакциях государств – членов Евразийского экономического союза.

«Российская Федерация.

Федеральная служба по надзору в сфере

Здравоохранения.

Адрес: 109012, г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1.

Телефон: +7 800 550 99 03.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 05.02.2026 № 1979
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

Электронная почта: pharm@roszdravnadzor.gov.ru

или npr@roszdravnadzor.gov.ru

Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

https:/ /www.roszdravnadzor.gov. ru/».

**4.9. Передозировка**

Симптомы

При случайном приеме препарата внутрь возможны: головокружение, головная боль, тошнота, рвота, гастралгия, нарушение функции сердечно-сосудистой системы, стимуляция или угнетение центральной нервной системы, нарушение зрения, циркуляторный коллапс, шок, в том числе с летальным исходом.

Лечение

Рекомендуется промывание желудка, прием активированного угля, при необходимости - симптоматическая терапия.

## 5. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

**5.1. Фармакодинамические свойства**

Фармакотерапевтическая группа: препараты для наружного применения при мышечных и суставных болях; другие препараты для наружного применения при мышечных и суставных болях.

Код АТХ: M02AX10

Механизм действия и фармакодинамические эффекты

Местнораздражающее средство, оказывает «отвлекающее» действие. Возбуждает сенсорные рецепторы кожи, вызывает расширение сосудов, улучшает трофику тканей.

**5.2. Фармакокинетические свойства**

Данные отсутствуют.

## 6. ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

**6.1. Перечень вспомогательных веществ**

Этанол (спирт этиловый) 70 %.

**6.2. Несовместимость**

Не применимо.

**6.3. Срок годности (срок хранения)**

3 года.

**6.4. Особые меры предосторожности при хранении.**

Хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 25 $^{0}$С.

**6.5. Характер и содержание упаковки**

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 05.02.2026 № 1979
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

По 50, 100 мл во флаконы из темного стекла, укупоренные пробками полимерными, или пробками-капельницами полиэтиленовыми, и/или крышками навинчиваемыми пластмассовыми.

По 50, 100 мл во флаконы-капельницы из темного стекла типа ФК, укупоренные пробками-капельницами полиэтиленовыми в комплекте с крышками навинчиваемыми пластмассовыми.

По 50, 100 мл во флаконы из полимерных материалов из полиэтилена низкого давления в комплекте с пробками полимерными и крышками навинчиваемыми пластмассовыми.

Каждый флакон или флакон – капельницу вместе с инструкцией по применению помещают в картонную пачку.

Допускается наносить на пачку текст инструкции по медицинскому применению лекарственного препарата.

Допускается упаковка флаконов, флаконов - капельниц по 50 шт, 56 шт без пачки вместе с равным количеством инструкций по применению в ящик из гофрированного картона или коробку из картона и комбинированных материалов (Для стационаров).

**6.6. Особые меры предосторожности при утилизации использованного лекарственного препарата или отходов, полученных после применения препарата, и другие манипуляции с препаратом**

Нет особых требований.

**7. ДЕРЖАТЕЛЬ РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ**

Российская Федерация,

ООО «Научно – исследовательский институт Медицины и Стандартизации», Россия

141070, Московская обл., г. Королев, ул. Фрунзе, д. 1А, помещ. III, офис 208.

**7.1. Представитель держателя регистрационного удостоверения**

Претензии потребителей направлять по адресу:

Российская Федерация,

ООО «Научно – исследовательский институт Медицины и Стандартизации», Россия

141070, Московская обл., г. Королев, ул. Фрунзе, д. 1А, помещ. III, офис 208.

**8. НОМЕР (НОМЕРА) РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА**

**9. КАТЕГОРИЯ ОТПУСКА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА**

Лекарственный препарат относится к категории отпуска без рецепта.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 05.02.2026 № 1979
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

Общая характеристика лекарственного препарата Муравьиный спирт доступна в едином реестре зарегистрированных лекарственных средств Евразийского экономического союза и на официальном сайте уполномоченного органа (экспертной организации) (https ://lk.regmed.ru/Register/EAEU_SmPC).