ЛП-№(012478)-(РГ-RU) от 18.11.2025

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 12.11.2025 № 28235
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

# ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

## 1. НАИМЕНОВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

СКИН-КАП, 0,2 %, аэрозоль для наружного применения.

## 2. КАЧЕСТВЕННЫЙ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ

Действующее вещество: пиритион цинк активированный.
Каждые 100 г препарата содержат 200 мг пиритиона цинка активированного.
Вещества, наличие которых надо учитывать в составе лекарственного препарата: этанол (см. раздел 4.4).
Полный перечень вспомогательных веществ приведен в разделе 6.1.

## 3. ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА

Аэрозоль для наружного применения.
Маслянистый раствор от белого с желтоватым оттенком до светло-желтого цвета с характерным запахом.

## 4. КЛИНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### 4.1. Показания к применению

Препарат СКИН-КАП показан к применению у взрослых пациентов и у детей старше 1 года для лечения следующих состояний:
- псориаз;
- атопический дерматит, нейродермит;
- экзема;
- себорейный дерматит.

### 4.2. Режим дозирования и способ применения

Режим дозирования
После интенсивного встряхивания препарат в достаточном количестве с расстояния около 15 см распыляют на пораженные участки кожи 2-3 раза в день до достижения клинического эффекта. Для достижения стойкого эффекта применение препарата рекомендуется продолжить в течение одной недели после исчезновения симптомов. Во время распыления флакон держать вертикально. Для обработки лекарственным препаратом волосистой части головы прилагается специальная насадка.
Длительность лечения при:
- псориазе - 1-1,5 месяца;
- атопическом дерматите - 3-4 недели;
- себорейном дерматите - 2 недели.

При необходимости можно провести повторный курс лечения после консультации с врачом.

Дети
Эффективность и безопасность у детей в возрасте от 0 до 1 года не установлены. Данные отсутствуют.
Режим дозирования у детей в возрасте от 1 до 18 лет не отличается от режима дозирования

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 12.11.2025 № 28235
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

для взрослых.

Способ применения
Наружно.

**4.3. Противопоказания**

Повышенная чувствительность к пиритион цинку или к любому из вспомогательных веществ, перечисленных в разделе 6.1.

**4.4. Особые указания и меры предосторожности при применении**

Аэрозоль СКИН-КАП предназначен для наружного применения.
Следует избегать попадания аэрозоля СКИН-КАП в глаза.
Вспомогательные вещества
Препарат СКИН-КАП содержит этанол, который может вызвать чувство жжения на поврежденной коже.

**4.5. Взаимодействие с другими лекарственными препаратами и другие виды взаимодействия**

Клинически значимого взаимодействия пиритиона цинка активированного с другими лекарственными препаратами не выявлено.

**4.6. Фертильность, беременность и лактация**

Беременность
При беременности препарат следует назначать в случаях, когда ожидаемая польза терапии для матери превышает потенциальный риск для плода. Не сообщалось о развитии каких-либо негативных последствий при применении препаратов пиритиона цинка активированного беременными женщинами.
Лактация
В период грудного вскармливания препарат следует назначать в случаях, когда ожидаемая польза терапии для матери превышает потенциальный риск для грудного ребенка. Не сообщалось о развитии каких-либо негативных последствий при применении препаратов пиритиона цинка активированного женщинами в период грудного вскармливания.
Фертильность
Данные по фертильности отсутствуют.

**4.7. Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами**

Препарат СКИН-КАП не оказывает отрицательного влияния на способность управлять транспортными средствами и выполнять другие виды деятельности, требующие концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

**4.8. Нежелательные реакции**

Резюме нежелательных реакций
Препарат обычно хорошо переносится. Иногда отмечаются аллергические реакции. В первые дни лечения возможно кратковременное чувство жжения в месте нанесения препарата, которое, как правило, не требует отмены препарата.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 12.11.2025 № 28235
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

Сообщение о подозреваемых нежелательных реакциях
Важно сообщать о подозреваемых нежелательных реакциях после регистрации лекарственного препарата с целью обеспечения непрерывного мониторинга соотношения «польза – риск» лекарственного препарата. Медицинским работникам рекомендуется сообщать о любых подозреваемых нежелательных реакциях лекарственного препарата через национальные системы сообщения о нежелательных реакциях государств – членов Евразийского экономического союза.
Российская Федерация
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения
109012, г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1
Телефон: +7 (800) 550-99-03
Электронная почта: pharm@roszdravnadzor.gov.ru
Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://www.roszdravnadzor.gov.ru/

### 4.9. Передозировка

До настоящего времени о случаях передозировки пиритиона цинка активированного не сообщалось.

## 5. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

### 5.1. Фармакодинамические свойства

Фармакотерапевтическая группа: другие препараты, применяемые в дерматологии.
Код АТХ: D11AX12
Фармакодинамические эффекты
Пиритион цинк активированный обладает противовоспалительной, антибактериальной и противогрибковой активностью. Противогрибковая активность особенно выражена в отношении грибов рода *Malassezia* (ранее - *Pityrosporum ovale* и *Pityrosporum orbiculare*), поддерживающих воспаление и избыточное шелушение при перхоти, себорее, псориазе и других заболеваниях кожи. Антибактериальная активность цинка пиритиона активированного проявляется в отношении ряда патогенных микроорганизмов (стрептококк, стафилококк, синегнойная и кишечная палочки, протей и другие). Пиритион цинк активированный снижает внутриклеточный уровень АТФ, способствует деполяризации клеточных мембран, вызывая гибель грибов и бактерий.

### 5.2. Фармакокинетические свойства

При наружном применении пиритион цинк активированный депонируется в эпидермисе и поверхностных слоях дермы. Системная абсорбция незначительная. Препарат обнаруживается в крови в следовых количествах.

## 6. ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

### 6.1. Перечень вспомогательных веществ

Изопропилмиристат
Полисорбат-80
Троламин
Этанол

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 12.11.2025 № 28235
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

Вода
Пропелленты: изобутан, пропан, бутан

**6.2. Несовместимость**

Не применимо.

**6.3. Срок годности (срок хранения)**

5 лет.

**6.4. Особые меры предосторожности при хранении**

Хранить при температуре от +4 до +30 °С.

**6.5. Характер и содержание упаковки**

По 35 г, 70 г и 140 г препарата в алюминиевый аэрозольный баллон, который состоит из клапана и крышки. К баллону прилагается дополнительная насадка. Баллон вместе с дополнительной насадкой и инструкцией по медицинскому применению помещают в картонную пачку.

По 35 г препарата в алюминиевый аэрозольный баллон, который состоит из клапана и крышки («бесплатный образец»). К каждому баллону прилагается инструкция по медицинскому применению, помещенная под крышку.

**6.6. Особые меры предосторожности при утилизации использованного лекарственного препарата или отходов, полученных после применения лекарственного препарата, и другие манипуляции с препаратом**

Особые требования отсутствуют.

## 7. ДЕРЖАТЕЛЬ РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ

Россия
ООО «Инвар»
107023, г. Москва, пл. Журавлева, д. 2 строен.2
Тел.: 8 (495) 544-51-54, 8 (800) 333-60-02
E-mail: info@invar.ru

**7.1. Представитель держателя регистрационного удостоверения**

Претензии потребителей направлять по адресу:
Россия
ООО «Инвар»
107023, г. Москва, пл. Журавлева, д. 2 строение 2
Тел.: 8 (495) 544-51-54, 8 (800) 333-60-02

## 8. НОМЕР (НОМЕРА) РЕГИСТРАЦИОННЫХ УДОСТОВЕРЕНИЙ

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 12.11.2025 № 28235
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

## 9. КАТЕГОРИЯ ОТПУСКА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Без рецепта.

Общая характеристика лекарственного препарата СКИН-КАП доступна в едином реестре зарегистрированных лекарственных средств Евразийского экономического союза и на официальном сайте уполномоченного органа (экспертной организации) https://eec.eaeunion.org/.