ЛП-№(013739)-(РГ-RU) от 02.03.2026

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 26.02.2026 № 3598
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

# ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

## 1. НАИМЕНОВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА
Ревит, драже.

## 2. КАЧЕСТВЕННЫЙ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ
Действующие вещества: ретинола пальмитат (витамин А - пальмитат), тиамина гидрохлорид, рибофлавин, аскорбиновая кислота.

Каждое драже содержит: 0,00138 г (2500 МЕ) ретинола пальмитата (витамина А - пальмитата); 0,001 г тиамина гидрохлорида; 0,001 г рибофлавина; 0,035 г аскорбиновой кислоты.

Вспомогательные вещества, наличие которых надо учитывать в составе лекарственного препарата: сахароза (см. раздел 4.4.).

Полный перечень вспомогательных веществ приведен в разделе 6.1.

## 3. ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА
Драже.
Драже желто-оранжевого цвета, правильной шарообразной формы с гладкой поверхностью.

## 4. КЛИНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
### 4.1. Показания к применению
Препарат Ревит предназначен для профилактики дефицита витаминов, входящих в его состав, у взрослых и детей с 3 лет.

### 4.2. Режим дозирования и способ применения
Режим дозирования
Взрослым – по 1 драже 3 раза в день ежедневно в течение 1–2 месяцев.
Дети
Детям от 3 до 7 лет – по 1–2 драже в день, от 7 до 15 лет – по 2–3 драже в день ежедневно в течение 1–2 месяцев.
Способ применения
Внутрь, через 10–15 минут после еды.

### 4.3. Противопоказания
Гиперчувствительность к действующим веществам и/или к любому из вспомогательных веществ, перечисленных в разделе 6.1.
Детский возраст до 3 лет.
Дефицит сахаразы/изомальтазы (см. раздел 4.4.).
Непереносимость фруктозы (см. раздел 4.4.).
Глюкозо-галактозная мальабсорбция (см. раздел 4.4.).

### 4.4. Особые указания и меры предосторожности при применении
С осторожностью
В состав препарата входит сахароза (1 драже содержит 0,034 ХЕ сахарозы), что следует учитывать больным сахарным диабетом.
Особые указания
Не рекомендуется одновременный прием других поливитаминных комплексов во избежание передозировки.
Возможно окрашивание мочи в желтый цвет, что совершенно безвредно и объясняется наличием в препарате рибофлавина.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 26.02.2026 № 3598
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

Вспомогательные вещества
Препарат содержит сахарозу. Пациентам с редко встречающейся наследственной непереносимостью фруктозы, глюкозо-галактозной мальабсорбцией или дефицитом сахаразы-изомальтазы не следует принимать этот препарат.

**4.5. Взаимодействие с другими лекарственными препаратами и другие виды взаимодействия**
Не изучалось.

**4.6. Фертильность, беременность и лактация**
Беременность
Возможно применение препарата по назначению врача.
Лактация
Возможно применение препарата по назначению врача.

**4.7. Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами**
Применение препарата не оказывает влияния на способность управлять транспортными средствами, механизмами.

**4.8. Нежелательные реакции**
Резюме нежелательных реакций
Для описания частоты нежелательных реакций в данном разделе используется следующая классификация MedDRA:
очень часто (≥ 1/10); часто (≥ 1/100, но < 1/10); нечасто (≥ 1/1000, но < 1/100); редко (≥ 1/10000, но < 1/1000); очень редко (< 1/10000); частота неизвестна (на основании имеющихся данных оценить невозможно).
*Нарушения со стороны иммунной системы*
Частота неизвестна - возможны аллергические реакции.

Сообщение о подозреваемых нежелательных реакциях
Важно сообщать о подозреваемых нежелательных реакциях после регистрации лекарственного препарата с целью обеспечения непрерывного мониторинга соотношения «польза – риск» лекарственного препарата. Медицинским работникам рекомендуется сообщать о любых подозреваемых нежелательных реакциях лекарственного препарата через национальные системы сообщения о нежелательных реакциях государств – членов Евразийского экономического союза.

Российская Федерация
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения
Адрес: 109012, г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1
Телефон: +7 800 550 99 03
Электронная почта: pharm@roszdravnadzor.gov.ru или npr@roszdravnadzor.gov.ru
Сайт: www.roszdravnadzor.gov.ru

**4.9. Передозировка**
Жирорастворимые витамины могут накапливаться в тканях. При передозировке они более токсичны, чем водорастворимые.
Симптомы
Симптомы острой передозировки витамина А (развиваются через 6 ч после приема в дозе от 300 000 ЕД до 1 млн ЕД (120–400 драже) однократно): сонливость, вялость, диплопия, головокружение, сильная головная боль, тошнота, тяжелая рвота, диарея, раздражительность,

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 26.02.2026 № 3598
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

остеопороз, кровотечение из десен, сухость и изъязвление слизистой оболочки полости рта, шелушение губ, кожи (особенно ладоней), возбуждение, спутанность сознания. Клиника обратима.

Лечение

Отмена препарата; симптоматическая терапия.

## 5. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

### 5.1. Фармакодинамические свойства

Фармакотерапевтическая группа: витамины; другие комбинированные витаминные препараты; комбинации витаминов.

Код АТХ: A11JA.

Механизм действия и фармакодинамические эффекты

Фармакологический эффект драже «Ревит» обусловлен входящими в его состав витаминами.

Ретинола пальмитат (витамин А) преимущественно обеспечивает нормализацию процессов белкового и углеводного обменов.

Тиамина гидрохлорид (витамин $B_1$) обеспечивает нормальную функциональную деятельность нервной, сердечно - сосудистой систем, пищеварительного тракта.

Рибофлавин (витамин $B_2$) является важным компонентом в белковом, жировом и углеводном обмене, принимает участие в поддержке нормальной зрительной функции глаза.

Аскорбиновая кислота (витамин С) участвует в окислительно-восстановительных процессах, обмене углеводов, свертывании крови, регенерации тканей.

### 5.2. Фармакокинетические свойства

Не изучалось.

## 6. ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

### 6.1. Перечень вспомогательных веществ

Мука пшеничная
Патока крахмальная
Сахароза (сахар)
Мяты перечной листьев масло (масло эфирное мятное ректификованное)
Воск пчелиный
Подсолнечника масло (масло подсолнечное)
Тальк.

### 6.2. Несовместимость

Не применимо.

### 6.3. Срок годности (срок хранения)

1 год 6 месяцев.

### 6.4. Особые меры предосторожности при хранении

Хранить при температуре не выше 25 °С.

### 6.5. Характер и содержание упаковки

По 100 штук в банки из полиэтилена низкого давления типа БП-60 в комплекте с навинчиваемыми крышками из полиэтилена низкого давления.

По 10 штук в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой.

Каждую банку или 3, или 5 контурных ячейковых упаковок вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 26.02.2026 № 3598
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

**6.6. Особые меры предосторожности при утилизации использованного лекарственного препарата или отходов, полученных после применения лекарственного препарата, и другие манипуляции с препаратом**
Особые требования отсутствуют.

## 7. ДЕРЖАТЕЛЬ РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ

Российская Федерация
АО «Марбиофарм»
424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. К. Маркса, д. 121
Телефон: +7 (8362) 42-03-12
Факс: (8362) 45-00-00
e-mail: marbiopharm@marbiopharm.ru

**7.1. Представитель держателя регистрационного удостоверения**
Претензии потребителей направлять по адресу:
Российская Федерация
АО «Марбиофарм»
424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. К. Маркса, д. 121
Телефон: +7 (8362) 42-03-12
Факс: (8362) 45-00-00
e-mail: marbiopharm@marbiopharm.ru

## 8. НОМЕР (НОМЕРА) РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ

## 9. КАТЕГОРИЯ ОТПУСКА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Лекарственный препарат относится к категории отпуска без рецепта.

Общая характеристика лекарственного препарата Ревит доступна в едином реестре зарегистрированных лекарственных средств Евразийского экономического союза и на официальном сайте уполномоченного органа (экспертной организации) (https://lk.regmed.ru/Register/EAEU_SmPC).