ЛП-№(014055)-(РГ-RU) от 23.03.2026
СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 19.03.2026 № 5664
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0003)

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

1. НАИМЕНОВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Гексавит, драже

2. КАЧЕСТВЕННЫЙ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ

Действующие вещества: аскорбиновая кислота (витамин С), никотинамид, пиридоксина гидрохлорид (витамин B_6), ретинола пальмитат (витамин А), рибофлавин (витамин B_2), тиамина гидрохлорид (витамин B_1).

Каждое драже содержит аскорбиновой кислоты (витамин С) - 0,07 г, никотинамида - 0,015 г, пиридоксина гидрохлорида (витамин B_6) - 0,002 г, ретинола пальмитат (витамин А) – 5000 МЕ, рибофлавин (витамин B_2) - 0,002 г, тиамина гидрохлорид (витамин B_1) - 0,002 г.

Вещества, наличие которых надо учитывать в составе лекарственного препарата: сахароза (см. разделы 4.3. и 4.4).

Полный перечень вспомогательных веществ приведен в разделе 6.1.

3. ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА

Драже.

Драже шарообразной формы от желто-оранжевого до зеленовато-желтого цвета, со слабым характерным запахом. Поверхность драже должна быть ровной, гладкой, однородной по окраске.

4. КЛИНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

4.1. Показания к применению

Гексавит применяется у взрослых с 18 лет для профилактики гиповитаминозов.

4.2. Режим дозирования и способ применения

Режим дозирования

Взрослым по 1 драже 2-3 раза в сутки.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 19.03.2026 № 5664
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0003)

Длительность применения препарата 1 месяц. Повторные курсы возможны после консультации с врачом.

Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции по применению.

Дети

Безопасность и эффективность у детей в возрасте от 0 до 18 лет не установлены. Препарат Гексавит противопоказан к применению у детей.

Способ применения

Внутрь, через 10-15 минут после еды.

4.3. Противопоказания

• Гиперчувствительность к действующим веществам препарата или к любому из вспомогательных веществ, перечисленных в разделе 6.1;

• Гипервитаминоз;

• Желчнокаменная болезнь;

• Хронический панкреатит;

• Беременность, период лактации;

• Детский возраст до 18 лет;

• Врожденная непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция, сахарозо-изомальтозная недостаточность.

4.4. Особые указания и меры предосторожности при применении

С осторожностью

В состав препарата входит сахароза (1 драже содержит 0,068 ХЕ сахарозы), что следует учитывать больным сахарным диабетом.

Особые указания

Не превышать рекомендованную суточную дозу. Не принимать одновременно другие поливитаминные комплексы во избежание передозировки. Возможно окрашивание мочи в ярко-желтый цвет, что совершенно безвредно и объясняется наличием в составе препарата рибофлавина.

Вспомогательные вещества

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 19.03.2026 № 5664
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0003)

Препарат содержит сахарозу. Пациентам с редко встречающейся наследственной непереносимостью фруктозы, глюкозо-галактозной мальабсорбцией или дефицитом сахаразы-изомальтазы не следует принимать этот препарат.

4.5 Взаимодействие с другими лекарственными препаратами и другие виды взаимодействия

Исследования взаимодействия не проводились.

4.6. Фертильность, беременность и лактация

Беременность

Препарат противопоказан при беременности.

Лактация

Препарат противопоказан в период лактации.

4.7. Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами

Гексавит не оказывает влияния на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами.

4.8 Нежелательные реакции

Резюме нежелательных реакций

Представленные ниже возможные нежелательные реакции распределены по системно-органным классам с указанием частоты их возникновения: очень часто (>1/10); часто (>1/100, но <1/10); нечасто (>1/1000, но <1/100); редко (>1/10000, но <1/1000); очень редко (<1/10000), частота неизвестна (на основании имеющихся данных оценить невозможно).

Нарушения со стороны иммунной системы: редко – аллергические реакции.

Сообщения о подозреваемых нежелательных реакциях

Важно сообщать о подозреваемых нежелательных реакциях после регистрации лекарственного препарата с целью обеспечения непрерывного мониторинга соотношения «польза – риск» лекарственного препарата.

Медицинским работникам рекомендуется сообщать о любых подозреваемых нежелательных реакциях лекарственного препарата через национальную

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 19.03.2026 № 5664
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0003)

систему сообщения о нежелательных реакциях государств – членов Евразийского экономического союза.

Российская Федерация.

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения.

Адрес: 109012, г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1.

Телефон: +7 800 550 99 03

Электронная почта: pharm@roszdravnadzor.gov.ru

Или npr@roszdravnadzor.gov.ru

Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

https://www.roszdravnadzor.gov.ru

4.9. Передозировка

Симптомы

Тошнота, мышечная слабость, боль в области печени, пожелтевшая кожа, раздражение слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта, метеоризм, абдоминальная боль спастического характера, учащенное мочеиспускание.

Лечение

Промывание желудочно-кишечного тракта, прием активированного угля, назначение симптоматической терапии.

5. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

5.1. Фармакодинамические свойства

Фармакотерапевтическая группа: Витамины; другие комбинированные витаминные препараты; комбинации витаминов.

Код АТХ: A11JA

Механизм действия и фармакодинамические эффекты

Комбинированный препарат, содержащий комплекс витаминов, являющихся важными факторами метаболических процессов. Фармакологическое действие обусловлено составом входящих в него компонентов.

Аскорбиновая кислота (витамин С) - оказывает метаболическое действие, участвует в регулировании окислительно-восстановительных процессов, углеводного обмена, свертываемости крови, регенерации тканей; повышает

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 19.03.2026 № 5664
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0003)

адаптационные способности организма и его сопротивляемость к инфекциям, способствует процессам регенерации.

Никотинамид (витамин РР) - стабилизирует процессы тканевого дыхания, жирового и углеводного обмена, систему метаболизма ксенобиотиков.

Пиридоксина гидрохлорид (витамин B_6) - способствует поддержанию структуры и функции костей, зубов, десен; оказывает влияние на эритропоэз, способствует нормальному функционированию нервной системы.

Ретинол (витамин А) - жирорастворимый витамин, играет важную роль в окислительно-восстановительных процессах, участвует в синтезе мукополисахаридов, белков, липидов. Способствует нормальному сперматои овогенезу, развитию плаценты, росту, нормальному развитию и дифференцировке эмбриональных тканей, в т.ч. эпителиальных структур и костной ткани. Участвует в формировании зрительных пигментов, необходимых для нормального сумеречного и цветового зрения; обеспечивает целостность эпителиальных тканей, регулирует рост костей.

Рибофлавин (витамин B_2) - улучшает репаративные процессы в тканях, участвует в энергетическом обмене, способствует образованию антител и оказывает положительное влияние на эритропоэз, нормализует зрение.

Тиамин (витамин B_1) - в качестве коэнзима играет важную роль в обмене углеводов, белков и липидов, в нормальном функционировании нервной системы.

5.2. Фармакокинетические свойства

Не применимо.

6. ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

6.1. Перечень вспомогательных веществ

Мука

Патока крахмальная

Сахароза (сахар)

Ароматизатор пищевой

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 19.03.2026 № 5664
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0003)

Масло подсолнечника

Тальк

Воск пчелиный

Краситель хинолиновый желтый

6.2. Несовместимость

Не применимо.

6.3 Срок годности (срок хранения)

1 год.

6.4. Особые указания при хранении

Хранить при температуре не выше 25 ^{0}С в оригинальной упаковке (банке полимерной) для защиты от света и влаги.

6.5. Характер и содержание упаковки

По 50, 100, 150 драже в банки полимерные с навинчиваемыми крышками или навинчиваемыми крышками с контролем первого вскрытия.

Каждую банку полимерную вместе с инструкцией по применению помещают в пачку.

По 30, 40, 105 банок полимерных с равным количеством инструкций по применению помещают в пакет из полиэтиленовой пленки или коробку из картона (для стационаров).

6.6. Особые меры предосторожности при утилизации использованного лекарственного препарата или отходов, полученных после применения лекарственного препарата, и другие манипуляции с препаратом

Особые требования отсутствуют.

7. ДЕРЖАТЕЛЬ РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ

Российская Федерация

АО «Уралбиофарм»

Адрес: 620026, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург,

г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, стр. 60.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 19.03.2026 № 5664
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0003)

Телефон: +7 343 254 01 93.

Электронная почта: ubf@ubf.ru

7.1 Представитель держателя регистрационного удостоверения

Претензии потребителей направлять по адресу:

Российская Федерация

АО «Уралбиофарм»

Адрес: 620026, Свердловская область, г. Екатеринбург,

ул. Куйбышева, стр. 60.

Телефон: +7 343 254 02 45, +7 343 254 01 93.

Электронная почта: ubf@ubf.ru

8. НОМЕР (НОМЕРА) РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ

9. КАТЕГОРИЯ ОТПУСКА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Лекарственный препарат относится к категории отпуска «Без рецепта».

Общая характеристика лекарственного препарата Гексавит доступна в едином реестре зарегистрированных лекарственных средств Евразийского экономического союза и на официальном сайте уполномоченного органа (экспертной организации) (http://lk.regmed.ru/Register/EAEU_SmPC)