ЛП-№(007332)-(РГ-RU) от 06.04.2026

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 01.04.2026 № 6649
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0006)

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

1. НАИМЕНОВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Пентовит, таблетки, покрытые оболочкой.

2. КАЧЕСТВЕННЫЙ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ

Действующие вещества: тиамина гидрохлорид (витамин B_1), пиридоксина гидрохлорид (витамин B_6), никотинамид, фолиевая кислота, цианокобаламин (витамин B_{12}).

Каждая таблетка, покрытая оболочкой, содержит: 10 мг тиамина гидрохлорида (витамина B_1), 5 мг пиридоксина гидрохлорида (витамина B_6), 20 мг никотинамида, 0,4 мг фолиевой кислоты, 0,05 мг цианокобаламина (витамина B_{12}).

Вспомогательные вещества, наличие которых надо учитывать в составе лекарственного препарата: сахароза (см. раздел 4.4.).

Полный перечень вспомогательных веществ приведен в разделе 6.1.

3. ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА

Таблетки, покрытые оболочкой.

Круглые, двояковыпуклые таблетки, покрытые оболочкой белого цвета.

4. КЛИНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

4.1. Показания к применению

Препарат Пентовит показан к применению у взрослых с 18 лет для комплексной терапии:

- заболеваний периферической (радикулит, невралгии, невриты) и центральной нервной системы;
- астенических состояний разного генеза.

4.2. Режим дозирования и способ применения

Режим дозирования

Взрослые

По 2–4 таблетки 3 раза в день. Курс лечения – 3–4 недели. Повторные курсы – по рекомендации врача.

Дети и подростки

Безопасность и эффективность препарата Пентовит у детей и подростков не установлены, поэтому препарат не следует принимать детям и подросткам до 18 лет.

Способ применения

Внутрь, после еды.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 01.04.2026 № 6649
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0006)

4.3. Противопоказания

- Гиперчувствительность к действующим веществам и/или к любому из вспомогательных веществ, перечисленных в разделе 6.1.;
- беременность;
- период грудного вскармливания;
- дефицит сахаразы/изомальтазы (см. раздел 4.4.);
- непереносимость фруктозы (см. раздел 4.4.);
- глюкозо-галактозная мальабсорбция (см. раздел 4.4.).

4.4. Особые указания и меры предосторожности при применении

Не превышать рекомендованную суточную дозу.

Не рекомендуется одновременный прием поливитаминных комплексов, включающих в состав витамины группы В.

Вспомогательные вещества

Препарат содержит сахарозу. Пациентам с редко встречающейся наследственной непереносимостью фруктозы, глюкозо-галактозной мальабсорбцией или дефицитом сахаразы-изомальтазы не следует принимать этот препарат.

Дети и подростки

Эффективность и безопасность у детей в возрасте до 18 лет на данный момент не установлены. Данные отсутствуют.

4.5. Взаимодействие с другими лекарственными препаратами и другие виды взаимодействия

Витамин B_6, входящий в данный комплекс, снижает противопаркинсоническую активность леводопы.

Алкоголь резко снижает всасывание витамина B_1.

4.6. Фертильность, беременность и лактация

Беременность

Применение препарата в период беременности противопоказано.

Лактация

В период грудного вскармливания применение препарата противопоказано.

4.7. Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 01.04.2026 № 6649
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0006)

Препарат не оказывает влияния на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами.

4.8. Нежелательные реакции

Частота возникновения нежелательных реакций определялась в соответствии с классификацией Всемирной организации здравоохранения: очень часто (≥1/10), часто (≥1/100, но <1/10), нечасто (≥1/1 000, но <1/100), редко (≥1/10 000, но <1/1 000), очень редко (<1/10 000), частота неизвестна (на основании имеющихся данных оценить невозможно).

Резюме нежелательных реакций

Нарушения со стороны иммунной системы:

частота неизвестна – аллергические реакции к компонентам препарата (зуд, крапивница).

Нарушения со стороны сердца:

частота неизвестна – тахикардия.

Желудочно-кишечные нарушения:

частота неизвестна – тошнота.

Сообщение о подозреваемых нежелательных реакциях.

Важно сообщать о подозреваемых нежелательных реакциях после регистрации лекарственного препарата с целью обеспечения непрерывного мониторинга соотношения «польза – риск» лекарственного препарата. Медицинским работникам рекомендуется сообщать о любых подозреваемых нежелательных реакциях лекарственного препарата через национальные системы сообщения о нежелательных реакциях государств – членов Евразийского экономического союза.

Российская Федерация

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения -
109012, г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1
Тел.: +7 800 550–99–03
Эл. почта: pharm@roszdravnadzor.gov.ru
или npr@roszdravnadzor.gov.ru
https://www.roszdravnadzor.gov.ru

Кыргызская Республика

Департамент лекарственных средств и медицинских изделий при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики
720044, г. Бишкек, ул. 3-я Линия, д. 25

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 01.04.2026 № 6649
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0006)

Тел.: 0800 800-26-26

Эл. почта: pharm@dlsmi.kg

https://www.dlsmi.kg

4.9. Передозировка

В настоящее время о случаях передозировки препарата не сообщалось.

5. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

5.1. Фармакодинамические свойства

Фармакотерапевтическая группа: витамины; другие комбинированные витаминные препараты; комбинации витаминов.

Код АТХ: A11JA.

Механизм действия и фармакодинамические эффекты

Поливитаминный препарат, действие которого обусловлено свойствами витаминов, входящих в его состав. Основанием для комбинации данных витаминов является их сочетанное действие на функциональное состояние центральной и периферической нервной системы.

6. ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

6.1. Перечень вспомогательных веществ

Ядро таблетки:

сахароза

кроскармеллоза натрия (примеллоза)

тальк

кальция стеарат

крахмал картофельный

Состав оболочки:

сахароза

воск пчелиный

тальк

магния карбонат основной

мука пшеничная

метилцеллюлоза

желатин

парафин жидкий (вазелиновое масло)

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 01.04.2026 № 6649
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0006)

титана диоксид [E171]

6.2. Несовместимость

Не применимо.

6.3. Срок годности (срок хранения)

3 года.

6.4. Особые меры предосторожности при хранении

Хранить при температуре не выше 25 °С.

6.5. Характер и содержание первичной упаковки

По 10, 50 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой.

1, 2, 3, 4, 5 контурных ячейковых упаковок по 10 таблеток вместе с листком-вкладышем или 1, 2 контурные ячейковые упаковки по 50 таблеток вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона.

По 40, 80, 120, 160, 200, 240, 264 контурных ячейковых упаковок по 50 таблеток вместе с равным количеством листков-вкладышей помещают в групповую упаковку (для стационаров).

Не все размеры упаковок могут быть доступны для реализации.

6.6. Особые меры предосторожности при уничтожении использованного лекарственного препарата или отходов, полученных после применения препарата, и другие манипуляции с препаратом

Особые требования отсутствуют.

7. ДЕРЖАТЕЛЬ РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ

Российская Федерация

АО «Алтайвитамины»

659325, Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул. Заводская, д. 69

Тел.: +7 (3854) 338-719, +7 (3854) 326-948

Факс +7 (3854) 326-943

Эл. почта: office@altayvitamin.ru

7.1. Представитель держателя регистрационного удостоверения

Претензии потребителей направлять по адресу:

Российская Федерация, Кыргызская Республика

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 01.04.2026 № 6649
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0006)

АО «Алтайвитамины»

659325, Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул. Заводская, д. 69

Тел.: +7 (3854) 337-514

Телефон горячей линии: +7 800 200-89-88

Эл. почта: saraeva.n@altayvitamin.ru

8. НОМЕР РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ

9. ДАТА ПЕРВИЧНОЙ РЕГИСТРАЦИИ (ПОДТВЕРЖДЕНИЯ РЕГИСТРАЦИИ, ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ)

Дата первой регистрации:

10. ДАТА ПЕРЕСМОТРА ТЕКСТА

Общая характеристика лекарственного препарата Пентовит доступна на информационном портале Евразийского экономического союза в информационно-коммуникационной сети Интернет http://www.eec.eaeunion.org/