ЛП-№(010601)-(РГ-RU) от 06.02.2026

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 27.01.2026 № 1279
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0004)

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

1. НАИМЕНОВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Йод, 5%, раствор для наружного применения спиртовой

2. КАЧЕСТВЕННЫЙ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ

Действующее вещество: йод.

В 1 мл раствора для наружного применения спиртового содержится 0,05 г йода.

Полный перечень вспомогательных веществ приведен в разделе 6.1.

3. ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА

Раствор для наружного применения спиртовой.

Прозрачная жидкость красно-коричневого цвета с характерным запахом.

4. КЛИНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

4.1. Показания к применению

Препарат Йод показан к применению у взрослых и детей при воспалительных и инфекционных заболеваниях кожи, ссадинах, порезах, микротравмах, ранах; воспалительных инфильтратах; обработке краев ран, кожи перед проведением инъекций, пункций, катетеризации.

4.2. Режим дозирования и способ применения

Режим дозирования

Взрослые

Смазывают пораженные или подлежащие обработке участки кожи.

При обработке операционного поля кожу дважды протирают стерильным марлевым тампоном, смоченным в растворе. Общее время обработки 4-6 мин.

Дети

Режим дозирования у детей в возрасте от 0 до 18 лет не отличается от режима дозирования для взрослых.

Способ применения

Наружно.

4.3. Противопоказания

– гиперчувствительность к йоду или к любому из вспомогательных веществ, перечисленных в разделе 6.1;

– тиреотоксикоз;

– герпетиформный дерматит.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 27.01.2026 № 1279
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0004)

4.4. Особые указания и меры предосторожности при применении

Свет и температура выше 40 °С ускоряют распад активного йода. Препарат должен иметь темно-коричневую окраску. Обесцвечивание раствора свидетельствует о разрушении комплекса с переходом активного йода в йодид-ион и снижении эффективности препарата. Несовместим с ферментами, восстановителями и щелочами. Щелочная или кислая среда, присутствие жира, гноя, крови ослабляют антисептическую активность. Следует избегать попадания в глаза.

4.5. Взаимодействие с другими лекарственными препаратами и другие виды взаимодействия

Фармацевтически несовместим с эфирными маслами, растворами аммиака, белой осадочной ртутью (ртути амидохлоридом) – образуется взрывчатая смесь.

4.6. Фертильность, беременность и лактация

Беременность

Препарат Йод можно применять в период беременности.

Лактация

Препарат Йод можно применять в период грудного вскармливания.

4.7. Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами

Йод не оказывает влияния на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами.

4.8. Нежелательные реакции

Резюме нежелательных реакций

При длительном применении на обширных раневых поверхностях – йодизм: ринит, крапивница, отек Квинке, повышенное слюнотечение, слезотечение, угревая сыпь, раздражение кожи, аллергические реакции (кожный зуд).

Сообщение о подозреваемых нежелательных реакциях

Важно сообщать о подозреваемых нежелательных реакциях после регистрации лекарственного препарата с целью обеспечения непрерывного мониторинга соотношения «польза-риск» лекарственного препарата. Медицинским работникам рекомендуется сообщать о любых подозреваемых нежелательных реакциях лекарственного препарата через национальные системы сообщения о нежелательных реакциях государств – членов Евразийского экономического союза.

Российская Федерация
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
Адрес: 109012, г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1
Телефон: +7 8005509903
Электронная почта: pharm@roszdravnadzor.gov.ru или npr@roszdravnadzor.gov.ru
Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет:
https://www.roszdravnadzor.gov.ru

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 27.01.2026 № 1279
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0004)

Республика Армения
«Научный Центр экспертизы лекарств и медицинских технологий имени академика Э. Габриеляна» АОЗТ
Адрес: 0051, г. Ереван, пр. Комитаса, 49/5
Телефоны: +374 60 83-00-73, +374 10 23-08-96, 23-16-82
Электронная почта: admin@pharm.am
Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет: www.pharm.am

Республика Беларусь
Республиканское унитарное предприятие «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»
Адрес: 220037, г. Минск, Товарищеский пер. 2а
Телефоны: +375-17-231-85-14
Факс: +375-17-252-53-58
Электронная почта: rcpl@rceth.by
Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет: www.rceth.by

Республика Казахстан
«Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан
Адрес: 010000, г. Астана, район Байконыр, ул. А.Иманова, 13
Телефон: +7 (7172) 23-51-35
Электронная почта: farm@dari.kz
Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.ndda.kz

Кыргызская Республика
Департамент лекарственных средств и медицинских изделий при министерстве здравоохранения Кыргызской Республики
Адрес: 720044, г. Бишкек, ул. 3-я линия, 25
Телефоны: +996 312 21-92-78, 0800 800 26 26
Факс: +996 312 21-05-08
Электронная почта: dlsmi@pharm.kg
Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет: www.pharm.kg

4.9. Передозировка

Симптомы.

При передозировке возможны явления йодизма, раздражение, ожоги.

Лечение

Симптоматическое, смыть избыток препарата чистой проточной водой.

5. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

5.1. Фармакодинамические свойства

Фармакотерапевтическая группа: антисептики и дезинфицирующие средства; препараты йода.

Код АТХ**:** D08AG03

Механизм действия и фармакодинамические эффекты

Антисептическое средство. Основным действующим веществом является молекулярный йод, обладающий антисептическим свойством. При нанесении на обширные поверхности кожи йод оказывает резорбтивное действие: активно влияет на обмен веществ, усиливает процессы

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 27.01.2026 № 1279
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0004)

диссимиляции, участвует в синтезе тироксина и трийодтиронина, обладает протеолитическим действием. Этиловый спирт замедляет выведение йода и уменьшает его раздражающее действие на ткани.

Йод оказывает бактерицидное действие, как на грамположительную, так и на грамотрицательную флору (активнее всего – на *Streptococcus spp.* и *Escherichia coli*), а также на патогенные грибы и дрожжи. Большинство штаммов *Staphylococcus spp.* устойчивы. *Pseudomonas aeruginosa* устойчива. Препарат малотоксичен.

5.2. Фармакокинетические свойства

Абсорбция

При контакте с кожей на 30 % превращается в йодиды, а остальная часть – в активный йод.
Распределение

Частично всасывается. Абсорбированная часть проникает в ткани и органы, селективно поглощается щитовидной железой.

Элиминация

Выводится почками (главным образом), кишечником, потовыми железами, с грудным молоком в период грудного вскармливания.

6. ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

6.1. Перечень вспомогательных веществ

Калия йодид

Этанол (спирт этиловый) 95 %

Вода очищенная

6.2. Несовместимость

Не применимо.

6.3. Срок годности (срок хранения)

3 года.

6.4. Особые меры предосторожности при хранении

Хранить в оригинальной упаковке (флакон в пачке или флаконы в коробке, или бутылки оранжевого стекла, или ПЭТ бутылки в коробке, или матовые канистры), при температуре не ниже 0°С для защиты от света.

6.5. Характер и содержание упаковки

По 10 мл, 15 мл, 25 мл, 40 мл, 50 мл или 100 мл во флаконах/флаконах-капельницах оранжевого стекла с винтовой горловиной, укупоренных пробками из полиэтилена высокой плотности или низкой плотности, или смеси полиэтилена высокой плотности и низкой плотности и крышками навинчиваемыми из полиэтилена высокой плотности или низкой плотности, или смеси полиэтилена высокой плотности и низкой плотности;

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 27.01.2026 № 1279
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0004)

или крышками навинчиваемыми с уплотнительным элементом из полиэтилена высокой плотности или низкой плотности, или смеси полиэтилена высокой плотности и низкой плотности. Допускается каждый флакон/флакон-капельницу дополнительно комплектовать пробкой-роллером из полиэтилена высокой плотности или низкой плотности, или смеси полиэтилена высокой плотности и низкой плотности или лопаточкой/кисточкой.

По 10 мл, 15 мл во флаконах-роллерах оранжевого стекла, укупоренных пробками-роллерами из полиэтилена высокой плотности или низкой плотности, или смеси полиэтилена высокой плотности и низкой плотности и крышками навинчиваемыми из полиэтилена высокой плотности или низкой плотности, или смеси полиэтилена высокой плотности и низкой плотности

Каждый флакон/флакон-капельницу или флакон-роллер вместе с листком-вкладышем помещают в пачку картонную.

Упаковка для стационаров. По 20, 24, 40, 54, 66, 70, 80 или 120 флаконов/флаконов-капельниц без пачек с равным количеством листков-вкладышей помещают в групповую упаковку.

По 0,95 кг в бутылки оранжевого стекла с винтовой горловиной, укупоренные навинчиваемыми пластмассовыми крышками с уплотнительными прокладками;

или по 4,5 кг в бутылки из полиэтилентерефталата с винтовой горловиной, укупоренные навинчиваемыми пластмассовыми крышками с уплотнительными прокладками, две бутылки помещают в пачку картонную;

или по 4,5 кг или 10 кг в матовые канистры из полиэтилена низкого давления, укупоренные навинчиваемыми пластмассовыми крышками с уплотнительными прокладками.

Бутылки/канистры снабжают листками-вкладышами (наклеивают или вкладывают в специальный кармашек).

6.6. Особые меры предосторожности при утилизации использованного лекарственного препарата или отходов, полученных после применения лекарственного препарата, и другие манипуляции с препаратом

Особые требования отсутствуют.

7. ДЕРЖАТЕЛЬ РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ

Российская Федерация
ООО «ДАНСОН-РУ»
142100, Московская обл., г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 1, стр. 49, пом.1, ком. 220
Тел.: +7 (495) 580-30-60

7.1. Представитель держателя регистрационного удостоверения

Претензии потребителей направлять по адресу:
Российская Федерация
Акционерное общество «Ярославская фармацевтическая фабрика»
Адрес: Адрес: 150030, Ярославская область, г. Ярославль, ул. 1-я Путевая, д. 5
Телефон: +7 (4852) 44-38-56
Адрес электронной почты: farm_info@yarff.ru

Республика Армения
ООО «ФАРМ ТРАСТ»
Адрес: 0014, г. Ереван, ул. Мамиконянц, 48

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 27.01.2026 № 1279
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0004)

Телефон/факс: +374 10 20-34-14
Адрес электронной почты: asan-jalalyan@yandex.ru

Республика Беларусь
ООО «ДАНСОН-БГ»
Адрес: 220126, г. Минск, пр. Победителей, д.31, корпус 1, пом. 416, 418
Телефон: +375-17-367-85-88
Адрес электронной почты: hulaknatalya@gmail.com

Республика Казахстан
ООО «ДАНСОН-БГ»
Адрес: 050026, г. Алматы, ул. Айтиева 46-18
Телефон: +7 (727) 395 91 13
Адрес электронной почты: layka16@mail.ru

Кыргызская Республика
ОсОО «DasMed»
Адрес: 720043, Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Садыгалиева, 1
Телефон/факс: +996 312 35-75-42
Адрес электронной почты: pv@dasmed.kg

8. НОМЕР (НОМЕРА) РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ

9. КАТЕГОРИЯ ОТПУСКА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Лекарственный препарат относится к категории отпуска без рецепта.

Общая характеристика лекарственного препарата Йод доступна в едином реестре зарегистрированных лекарственных средств Евразийского экономического союза и на официальном сайте уполномоченного органа (экспертной организации) (https://lk.regmed.ru/Register/EAEU_SmPC).