ЛП-№(014101)-(РГ-RU) от 25.03.2026

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 23.03.2026 № 5887
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

# ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

## 1. НАИМЕНОВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

ГРИППФЕРОН АЭРО, 100 000 МЕ, аэрозоль для местного применения.

## 2. КАЧЕСТВЕННЫЙ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ

Действующее вещество: интерферон альфа-2b.

1 баллон с 10 мл препарата содержит 100 000 МЕ интерферона альфа-2b человеческого рекомбинантного*.

* получено с использованием клеток *Escherichia coli* по технологии рекомбинантной ДНК.

Вещества, наличие которых надо учитывать в составе лекарственного препарата: бензалкония хлорид, бензойная кислота (см раздел 4.4).

Полный перечень вспомогательных веществ приведен в разделе 6.1.

## 3. ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА

Аэрозоль для местного применения.

Прозрачная бесцветная жидкость.

## 4. КЛИНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### 4.1. Показания к применению

ГРИППФЕРОН АЭРО показан к применению у взрослых для профилактики и лечения гриппа и других острых респираторных вирусных заболеваний (ОРВИ).

### 4.2. Режим дозирования и способ применения

Режим дозирования

*Взрослые*

Разовая доза препарата составляет приблизительно 2 000 – 3 000 МЕ.

Для лечения гриппа и ОРВИ препарат ГРИППФЕРОН АЭРО вводят 7 раз в день, через каждые 2 часа (суточная доза – до 20 000 МЕ) в первые два дня заболевания, затем 3 раза в день (суточная доза – до 10 000 МЕ) в течение пяти дней. Необходимо предупредить пациента о том, что в случае сохранения симптомов заболевания более 5-ти дней следует проконсультироваться у врача. Интерферонотерапия проводится на фоне традиционной симптоматической терапии.

С целью профилактики ОРВИ и гриппа: при контакте с больным и при переохлаждении препарат применяют в разовой дозировке 2 раза в день в течение 5 – 7 дней. При необходимости профилактические курсы повторяют; при сезонном повышении заболеваемости препарат вводят утром через 1 – 2 дня.

Способ применения

Местно.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 23.03.2026 № 5887
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

Перед использованием с баллона снимают предохранительный колпачок, надевают распылительную насадку, свободный конец которой вводят поочередно в общие носовые ходы и коротко нажимают на распылительную насадку (менее 1 сек).

После каждого введения рекомендуется помассировать пальцами крылья носа в течение нескольких минут для равномерного распределения препарата в носовой полости.

**4.3. Противопоказания**

- гиперчувствительность к интерферону альфа-2b или к любому из вспомогательных веществ, перечисленных в разделе 6.1;

- тяжелые формы аллергических заболеваний;

- аутоиммунные заболевания;

- детский возраст до 18 лет;

- беременность (см. раздел 4.6);

- период грудного вскармливания (см. раздел 4.6).

**4.4. Особые указания и меры предосторожности при применении**

Особые указания

Баллон не вскрывать, содержимое находится под давлением.

Предохранять от падений, ударов и воздействия прямых солнечных лучей.

Вспомогательные вещества

ГРИППФЕРОН АЭРО содержит в своем составе бензалкония хлорид, который может вызывать раздражение или отек в носу, особенно при длительном применении.

ГРИППФЕРОН АЭРО содержит в своем составе бензойную кислоту, которая может вызывать местное раздражение.

Данный лекарственный препарат содержит 40 мг спирта этилового (этанола) в каждых 10 мл препарата, что эквивалентно 4 мг/мл (0,4 % м/об). Количество в 10 мл данного лекарственного препарата эквивалентно менее чем 1 мл пива или 0,4 мл вина. Небольшое количество спирта в данном лекарственном препарате не будет оказывать заметного действия.

**4.5. Взаимодействия с другими лекарственными препаратами и другие виды взаимодействия**

Не рекомендуется одновременное применение интраназальных сосудосуживающих препаратов (способствует дополнительному высушиванию слизистой оболочки носа).

**4.6. Фертильность, беременность и лактация**

Беременность

Применение препарата во время беременности противопоказано.

Лактация

Применение препарата в период грудного вскармливания противопоказано.

**4.7. Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с**

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 23.03.2026 № 5887
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

**механизмами**

Препарат не оказывает влияния на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами.

### 4.8. Нежелательные реакции

Резюме нежелательных реакций

Легкое жжение, зуд в носу, чихание.

Сообщение о подозреваемых нежелательных реакциях

Важно сообщать о подозреваемых нежелательных реакциях после регистрации лекарственного препарата с целью обеспечения непрерывного мониторинга соотношения «польза-риск» лекарственного препарата. Медицинским работникам рекомендуется сообщать о любых подозреваемых нежелательных реакциях лекарственного препарата через национальные системы сообщения о нежелательных реакциях государств - членов Евразийского экономического союза.

Российская Федерация:

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения.

Адрес: 109012, г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1.

Телефон: +7 800 550 99 03

Электронная почта: pharm@roszdravnadzor.gov.ru или npr@roszdravnadzor.gov.ru

Сайт: https://www.roszdravnadzor.gov.ru.

### 4.9. Передозировка

Случаи передозировки препарата не выявлены.

## 5. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

### 5.1. Фармакодинамические свойства

Фармакотерапевтическая группа: иммуностимуляторы; интерфероны.

Код АТХ: L03AB05

Фармакодинамические эффекты

Активное вещество препарата ГРИППФЕРОН АЭРО представляет собой интерферон альфа-2b человеческий рекомбинантный, синтезированный штаммом *Escherichia coli* BL 21 (DE 3) [pAYC-ET-(hIFN-α2b)-lacI], в генетический аппарат которого встроен ген человеческого лейкоцитарного интерферона альфа-2b. Как и все интерфероны, ГРИППФЕРОН АЭРО обладает антивирусной, противоопухолевой, иммуномодулирующей активностью.

### 5.2. Фармакокинетические свойства

Проникает в системный кровоток через слизистую оболочку респираторного тракта, в организме подвергается распаду, частично выводится в неизменном виде, главным образом через почки. Местное применение для терапии вирусных инфекций обеспечивает высокую концентрацию интерферона в очаге воспаления.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 23.03.2026 № 5887
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

## 6. ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

### 6.1. Перечень вспомогательных веществ

Натрия гидрофосфата додекагидрат

натрия дигидрофосфата дигидрат

натрия хлорид

динатрия эдетат

декстран [ср.мол.масса 50000 – 70000]

полисорбат-80

альфа-токоферола ацетат

бензалкония хлорид

бензойная кислота

этанол (спирт этиловый 95 %)

вода очищенная

азот

### 6.2. Несовместимость

Не применимо.

### 6.3. Срок годности (срок хранения)

2 года.

### 6.4. Особые меры предосторожности при хранении

Хранить при температуре от 2 °С до 8 °С.

### 6.5. Характер и содержание упаковки

По 10 мл в баллонах аэрозольных алюминиевых, снабженных клапаном непрерывного действия, с колпачком предохранительным.

Один баллон вместе с распылительной насадкой и инструкцией по медицинскому применению в пачке из картона.

### 6.6. Особые меры предосторожности при утилизации использованного лекарственного препарата или отходов, полученных после применения лекарственного препарата, и другие манипуляции с препаратом

Особые требования отсутствуют.

## 7. ДЕРЖАТЕЛЬ РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ

Российская Федерация

ООО «Фирн М»

108804, г. Москва, вн.тер.г. м.о. Внуково, дп. Кокошкино, ул. Дзержинского, д. 4А

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 23.03.2026 № 5887
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

Тел.: +7 (495) 956-15-43

e-mail: firnm@grippferon.ru

**7.1. Представитель держателя регистрационного удостоверения**

*Претензии потребителей направлять по адресу:*

Российская Федерация

ООО «Фирн М»

108804, г. Москва, вн.тер.г. м.о. Внуково, дп. Кокошкино, ул. Дзержинского, д. 4А

Тел.: +7 (495) 956-15-43

e-mail: firnm@grippferon.ru

## 8. НОМЕР (НОМЕРА) РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ

## 9. КАТЕГОРИЯ ОТПУСКА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Лекарственный препарат относится к категории отпуска без рецепта.

Общая характеристика лекарственного препарата ГРИППФЕРОН АЭРО доступна в едином реестре зарегистрированных лекарственных средств Евразийского экономического союза и на официальном сайте уполномоченного органа (экспертной организации) https://lk.regmed.ru/Register/EAEU_SmPC