

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА**1. НАИМЕНОВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА**

Биапенем, 300 мг, порошок для приготовления раствора для инфузий
Биапенем, 600 мг, порошок для приготовления раствора для инфузий

2. КАЧЕСТВЕННЫЙ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ

Действующее вещество: биапенем

Биапенем, 300 мг, порошок для приготовления раствора для инфузий:

Каждый флакон содержит 300 мг биапенема.

1 мл раствора после восстановления содержит 3 мг биапенема.

Биапенем 600 мг, порошок для приготовления раствора для инфузий:

Каждый флакон содержит 600 мг биапенема.

1 мл раствора после восстановления содержит 6 мг биапенема.

3. ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА

Порошок для приготовления раствора для инфузий.

Мелкокристаллический порошок белого или белого с желтоватым оттенком цвета.

4. КЛИНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**4.1. Показания к применению**

Препарат Биапенем показан к применению у взрослых для лечения следующих заболеваний, вызванных чувствительными к биапенему микроорганизмами:

- пневмония;
- инфекции мочевыводящей системы (осложненный цистит, пиелонефрит);
- перитонит;
- хронические респираторные заболевания.

4.2. Режим дозирования и способ примененияРежим дозирования

Доза и продолжительность терапии должны устанавливаться в зависимости от типа и тяжести инфекции и состояния пациента.

Обычно суточная доза препарата составляет 600 мг, разделенная на 2 введения каждые 12 часов, внутривенно капельно в течение 30-60 минут. При тяжелых инфекциях доза может быть увеличена. Максимальная суточная доза не должна превышать 1200 мг. Продолжительность терапии препаратом не должна превышать минимально необходимый срок для лечения заболевания.

Особые группы пациентовПациенты с нарушением функции почек

У пациентов с тяжелой почечной недостаточностью препарат следует применять с осторожностью, тщательно контролируя состояние пациента; при необходимости уменьшить дозу или увеличить интервал между введениями. Пациентам, находящимся на гемодиализе, рекомендуется введение 1 раз в сутки (см. раздел 5.2.).

Пациенты пожилого возраста

Пожилым пациентам препарат Биапенем следует применять с осторожностью. Необходим контроль за состоянием пациента и адекватный подбор дозы и интервала между введениями препарата (см. разделы 5.2. и 4.4.).

Дети

Безопасность и эффективность препарата у детей в возрасте от 0 до 18 лет не установлены. Данные отсутствуют.

Способ применения

Биапенем предназначен только для внутривенного инфузионного введения.

Восстановленный раствор представляет собой прозрачную жидкость от бесцветного до светло-желтого цвета.

Инструкции по приготовлению лекарственного препарата перед введением приведены в разделе 6.6.

4.3. Противопоказания

- Гиперчувствительность к биапенему, другим препаратам группы карбапенемов в анамнезе или к любому из вспомогательных веществ, перечисленных в разделе 6.1.
- Выраженная гиперчувствительность (анафилактические реакции, тяжелые кожные реакции) к любому антибактериальному средству, имеющему бета-лактамную структуру (т.е. к пенициллинам, цефалоспорином).
- Одновременное применение с препаратами вальпроевой кислоты.

4.4. Особые указания и меры предосторожности при применении

Реакции повышенной чувствительности

Перед началом лечения следует установить наличие в анамнезе у пациента аллергических реакций на биапенем, другие карбапенемовые антибиотики и другие бета-лактамы антибиотики, а также других форм аллергии (аллергический ринит, бронхиальная астма, крапивница). Имеются данные о частичной перекрестной аллергии между карбапенемами и другими бета-лактамами антибиотиками – пенициллинами и цефалоспорином. Перед применением препарата необходимо приготовить средства экстренной помощи, необходимые в случае развития аллергических реакций. Пациент должен находиться в состоянии покоя от начала до окончания процедуры инфузии. При этом необходимо тщательно контролировать состояние пациента, особенно непосредственно после начала введения препарата. В случае развития аллергической реакции (включая такие симптомы как, дискомфорт, неприятные ощущения во рту, свистящее дыхание, головокружение, позывы к дефекации, шум в ушах, потоотделение) введение препарата прекращают и принимают соответствующие меры. Серьезные анафилактические реакции требуют незамедлительного введения адреналина. При необходимости следует применить кислород, глюкокортикостероиды и поддерживать дыхательную функцию (включая интубацию).

При применении карбапенемов сообщалось о случаях развития буллезных поражений кожи, таких как синдром Стивенса-Джонсона, токсический эпидермальный некролиз и острый конъюнктивально-слизистокожный синдром. В случае возникновения таких симптомов как лихорадка, эритема, зуд, гиперемия глаз, стоматит и другие, следует прекратить применение препарата и назначить соответствующее лечение.

При наличии у пациента или его ближайших родственников бронхиальной астмы, предрасположенности к аллергическим реакциям (сыпь, крапивница т.д.) препарат следует применять с осторожностью.

Интерстициальная пневмония

Во время лечения необходим тщательный контроль за состоянием пациента. В случае возникновения таких симптомов как лихорадка, кашель, одышка при физической нагрузке, затрудненное дыхание следует как можно скорее провести рентгенографию органов грудной клетки. При наличии признаков интерстициальной пневмонии, эозинофильной инфильтрации легких следует прекратить применение препарата, назначить соответствующее лечение, включая глюкокортикостероиды.

Clostridium difficile – ассоциированная диарея

При применении практически всех антибактериальных препаратов широкого спектра действия возможно возникновение диареи, ассоциированной с *Clostridium difficile* (CDAD – *Clostridium difficile* – associated diarrhea), которая может протекать как в легкой форме, так и в тяжелой, вплоть до летального исхода.

При возникновении диареи во время лечения препаратом необходимо подтвердить диагноз CDAD. Следует тщательно наблюдать за пациентом на предмет развития CDAD, поскольку

регистрировались случаи ее возникновения спустя более двух месяцев после прекращения применения антибактериальных препаратов. При подозрении или подтверждении CDAD необходимо прекратить применение антибактериальных препаратов, кроме тех, которые назначены для подавления *Clostridium difficile*. Применение препаратов, тормозящих перистальтику кишечника, противопоказано.

Развитие бактериальной резистентности и суперинфекции

С целью профилактики развития резистентности и поддержания эффективности биапенема, в клинической практике препарат следует использовать только для лечения инфекций, вызванных доказано чувствительными к биапенему микроорганизмами, и применение препарата должно быть ограничено минимальным курсом, необходимым для лечения заболевания.

Следует тщательно контролировать состояние пациентов на предмет возможности развития суперинфекции и предпринимать соответствующие меры в случае ее развития.

Центральная нервная система

На фоне применения карбапенемов, в том числе биапенема, сообщалось о возникновении судорог и других симптомов со стороны центральной нервной системы. Следует соблюдать осторожность при применении биапенема у пациентов с заболеваниями центральной нервной системы, предрасполагающими к возникновению судорог и снижающими порог судорожной активности, с эпилепсией в анамнезе, у пациентов с нарушениями функции почек. В период лечения необходим тщательный контроль за состоянием пациента. В случае возникновения симптомов со стороны ЦНС следует немедленно прекратить применение препарата и принять соответствующие меры.

Нарушение функции печени

Вследствие риска развития нарушения функции печени (повышение активности трансаминаз, гипербилирубинемия, желтуха, фульминантный гепатит) при применении препарата необходимо контролировать состояние пациента и периодически проводить лабораторные исследования функции печени. В случае возникновения данных симптомов следует немедленно прекратить применение препарата и назначить соответствующее лечение.

Нарушение функции почек

В период лечения необходим тщательный контроль за состоянием пациента и периодическое проведение лабораторных исследований функции почек. У пациентов с тяжелой почечной недостаточностью препарат применяется с осторожностью, при необходимости следует уменьшить дозу или увеличить интервал между введениями. Пациентам, находящимся на гемодиализе, рекомендуется введение 1 раз в сутки. В случае обнаружения отклонений (острая почечная недостаточность и другие тяжелые нарушения функции почек) следует немедленно прекратить применение препарата и назначить соответствующее лечение.

Нарушения со стороны системы кроветворения

В период лечения необходим тщательный контроль состояния пациента и периодическое проведение лабораторных исследований крови. В случае обнаружения отклонений (агранулоцитоз, панцитопения, лейкопения, тромбоцитопения, гемолитическая анемия) следует прекратить применение препарата и назначить соответствующее лечение.

Пожилые пациенты

У пожилых пациентов препарат следует применять с осторожностью, тщательно наблюдая за состоянием. Требуется адекватный подбор дозы и интервала между введениями препарата. Необходимо учитывать повышенный риск возникновения побочных эффектов (так как у пожилых людей многие физиологические функции организма снижены) и повышенную склонность к кровотечениям в результате дефицита витамина К.

У пациентов с затрудненным глотанием, находящихся на парентеральном питании, у пациентов с неудовлетворительным общим состоянием здоровья препарат применяется с

осторожностью. Требуется тщательный мониторинг состояния пациента (могут возникнуть симптомы дефицита витамина К).

Влияние на лабораторные показатели

При применении препарата возможно получение ложноположительных результатов при определении концентрации глюкозы в моче при использовании реактивов Бенедикта, Фелинга или Клинитеста.

При применении биापенема возможно выявление ложноположительной пробы Кумбса.

4.5. Взаимодействие с другими лекарственными препаратами и другие виды взаимодействия

Одновременное применение карбапенемов, включая биापенем, с вальпроевой кислотой приводит к снижению концентрации вальпроевой кислоты в плазме крови до субтерапевтического значения, что увеличивает риск развития судорожного припадка. Механизм этого взаимодействия неизвестен. Одновременное применение биापенема и препаратов вальпроевой кислоты противопоказано.

4.6. Фертильность, беременность и лактация

Беременность

Безопасность применения биापенема у женщин во время беременности не изучалась. Поэтому применение препарата во время беременности допустимо только в том случае, если возможная польза от лечения для матери превышает потенциальный риск для плода.

Лактация

В доклинических исследованиях было установлено, что биапенем проникает в грудное молоко. В случае необходимости применения препарата следует прекратить грудное вскармливание.

4.7. Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами

Не проводилось исследований влияния биапенема на способность управлять транспортными средствами, механизмами. Тем не менее, следует принимать во внимание, что при применении препарата могут наблюдаться нежелательные реакции, которые могут влиять на скорость психомоторных реакций, способность управления транспортным средством и работу с механизмами.

4.8. Нежелательные реакции

Резюме профиля безопасности

В ходе клинических исследований биапенема с участием 2348 пациентов побочные эффекты были зарегистрированы у 64 пациентов (2,7%). Наиболее частые побочные эффекты включали сыпь (1,0%), диарею или неоформленный стул (0,7%). Отклонения в результатах лабораторных анализов среди 2287 пациентов наблюдались в 304 случаях (13,3%). Наиболее частыми из них были повышение активности аланинаминотрансферазы (АЛТ) в 114 случаях, повышение активности аспартатаминотрансферазы (АСТ) в 93 случаях, эозинофилия в 77 случаях.

В ходе пострегистрационного исследования было зарегистрировано 208 случаев возникновения побочных эффектов (включая отклонения результатов лабораторных анализов) среди 1700 пациентов, участвовавших в исследовании (12,2%). Наиболее частыми из них были нарушение функции печени в 77 случаях (4,5%), повышение активности АЛТ в 45 случаях (2,6%), повышение активности АСТ в 40 случаях (2,4%), повышение активности щелочной фосфатазы (ЩФ) в 13 случаях (0,8%), повышение активности лактатдегидрогеназы (ЛДГ) в 12 случаях (0,7%).

Табличное резюме нежелательных реакций

Нежелательные явления, представленные ниже, перечислены в зависимости от анатомофизиологической классификации, частоты встречаемости и степени тяжести. Частота встречаемости определяется следующим образом: очень часто ($\geq 1/10$), часто

($\geq 1/100$ и $< 1/10$), нечасто ($\geq 1/1000$ и $< 1/100$), редко ($\geq 1/10\,000$ и $< 1/1000$), очень редко ($< 1/10\,000$), частота неизвестна (на основании имеющихся данных оценить невозможно).

Таблица 1. Табличное резюме нежелательных реакций

Системно-органный класс	Частота	Нежелательные реакции
Инфекции и инвазии	частота неизвестна	стоматит, грибковые суперинфекции
Нарушения со стороны крови и лимфатической системы	нечасто	базофилия, тромбоцитоз, эритроцитопения, снижение гематокрита, нейтрофилия, снижение содержания гемоглобина, лимфоцитоз, моноцитоз
	редко	увеличение протромбинового времени;
	частота неизвестна	агранулоцитоз, панцитопения, лейкопения, тромбоцитопения.
Нарушения со стороны иммунной системы	нечасто	эозинофилия
	редко	шок
	частота неизвестна	анафилактический шок
Нарушения метаболизма и питания	частота неизвестна	симптомы дефицита витамина К (гипопротромбинемия, склонность к кровотечениям), симптомы дефицита витамина группы В (глоссит, стоматит, снижение аппетита, неврит)
Нарушения со стороны нервной системы	редко	ощущение онемения
	частота неизвестна	судороги, нарушение сознания
Нарушение со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения	редко	приступ астмы, интерстициальная пневмония
Желудочно-кишечные нарушения	нечасто	тошнота, диарея, повышение активности амилазы
	редко	рвота, сниженный аппетит, боль в животе
	частота неизвестна	псевдомембранозный колит, тяжелый колит, сопровождающийся кровавым стулом
Нарушения со стороны печени и желчевыводящих путей	нечасто	повышение активности АЛТ, АСТ, ЛДГ, гамма-глутамилтрансферазы, ЩФ, лейцинаминопептидазы (ЛАП); желтуха, повышение концентрации билирубина
Нарушения со стороны кожи и подкожных тканей	нечасто	зуд, сыпь
	редко	крапивница
Нарушения со стороны почек и мочевыводящих путей	нечасто	повышение концентрации азота мочевины в крови, повышение концентрации креатинина в крови
	редко	повышение в моче концентрации N-ацетил- β -D-глюкозаминидазы (NAG) и β 2- микроглобулина, протеинурия, острая почечная недостаточность
	нечасто	гиперкалиемия, лихорадка

Общие нарушения и реакции на месте введения	редко	головная боль, боль в груди, общее недомогание
	Частота неизвестна	отек

Реакции характерные для антибиотиков-карбапенемов: мультиформная эритема, токсический эпидермальный некролиз, острый конъюнктивально-слизистокожный синдром (oculomucocutaneous syndrome), синдром Стивенса-Джонсона, гемолитическая анемия, тромбофлебит, эозинофильная инфильтрация легких, фульминантный гепатит.

Сообщение о подозреваемых нежелательных реакциях

Важно сообщать о подозреваемых нежелательных реакциях после регистрации препарата с целью обеспечения непрерывного мониторинга соотношения «польза – риск» лекарственного препарата. Медицинским работникам рекомендуется сообщать о любых подозреваемых нежелательных реакциях лекарственного препарата через национальные системы сообщения о нежелательных реакциях государств – членов Евразийского экономического союза:

Российская Федерация

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)

Адрес: 109012, г. Москва, Славянская площадь, д. 4, строение 1

Тел.: +7 800 550-99-03

Адрес эл. почты: pharm@roszdravnadzor.gov.ru

Веб сайт: www.roszdravnadzor.gov.ru

4.9. Передозировка

Симптомы

Случаев передозировки не зарегистрировано. Риск возникновения передозировки возможен у пациентов с нарушением функции почек. При этом возможно развитие одной или нескольких побочных реакций (см. раздел 4.8.)

Лечение

В случае передозировки следует ориентироваться на клиническую картину и проводить симптоматическую поддерживающую терапию. Около 90% биापенема выводится из крови во время гемодиализа.

5. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

5.1. Фармакодинамические свойства

Фармакотерапевтическая группа: антибактериальные средства системного действия, другие бета-лактамы антибактериальные средства, карбапенемы.

Код АТХ: J01DH05.

Механизм действия

Биапинем, как и другие бета-лактамы антибиотиков, ингибирует синтез муреина (пептидогликана), формирующего клеточную стенку бактерий, и вызывает гибель бактериальной клетки.

Биапинем – антибиотик класса карбапенемов, предназначен для парентерального применения, имеет большую устойчивость к дегидропептидазе-1 (ДГП-1) человека за счет 1β-метильной группы в положении C1.

Фармакодинамические эффекты

Биапинем оказывает бактерицидное действие в отношении широкого спектра аэробных грамположительных, грамотрицательных и анаэробных бактерий, включая *Pseudomonas aeruginosa*, устойчивую к имипенему, меропенему, цефтазидиму, офлоксацину, гентамицину, и *Bacteroides fragilis*.

Биапенем имеет высокую аффинность к различным пенициллинсвязывающим белкам (ПСБ): ПСБ1 и ПСБ4 метициллинрезистентного *Staphylococcus aureus* (MRSA), а также ПСБ2 и ПСБ4 *E. coli* и *P. aeruginosa*. Биапенем продемонстрировал выраженный постантибиотический эффект т.е. подавление микробного роста после того, как концентрации лекарственного средства снизились ниже МПК (минимальная подавляющая концентрация) в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий.

Резистентность

Механизм развития резистентности к биапенему не изучался.

Критерии чувствительности

Национальный Комитет по Клиническим Лабораторным Стандартам (NCCLS) не установил МПК для биапенема. Однако были предложены МПК ≤ 4 мг/л и 8 мг/л для чувствительных и резистентных аэробных бактерий соответственно.

Таблица 2. Значения MIC90 (минимальная концентрация, подавляющая 90% штаммов микроорганизмов) полученные в исследованиях in vitro

Микроорганизм	MIC90, мг/л
Грамотрицательные аэробные микроорганизмы	
<i>Escherichia coli</i>	0,03 – 0,12
<i>Klebsiella pneumoniae</i>	0,12 – 0,78
<i>Morganella morganii</i>	1,56 – 2
<i>Proteus mirabilis</i>	0,39 – 3,13
<i>Citrobacter freundii</i>	0,12 – 0,78
<i>Serratia spp.</i> , включая <i>S. marcescens</i>	0,5 – 8 мг/л
<i>Providencia rettgeri</i>	свыше 8 мг/л
<i>Moraxella catarrhalis</i>	$\leq 0,06$ – 0,12
<i>Haemophilus influenzae</i>	1 – 8
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	1,5 – 16 (медианное значение: 8)
<i>Acinetobacter baumannii</i>	0,5
Грамположительные аэробные микроорганизмы	
<i>Streptococcus pneumoniae</i>	$\leq 0,06$ – 0,5
<i>Streptococcus pyogenes</i>	$\leq 0,006$ – 0,03
<i>Staphylococcus aureus</i> метициллин-чувствительные штаммы (MSSA)	$\leq 0,06$ – 0,5
<i>Staphylococcus aureus</i> метициллин-резистентные штаммы (MRSA)	32 – 118
<i>Staphylococcus epidermidis</i>	$\leq 0,12$ – 1
<i>Streptococcus spp.</i> метициллин-чувствительные коагулазоотрицательные	$\leq 0,5$ – 2
<i>Enterococcus faecalis</i>	3,1 – 16
<i>Enterococcus faecium</i>	выше 128
Анаэробные микроорганизмы	
<i>Bacteriodes fragilis</i>	8
<i>Prevotella spp.</i>	8
<i>Fusobacterium spp.</i>	8
<i>Clostridium spp.</i>	8
<i>Peptostreptococcus spp.</i>	8

В следующей таблице приведены данные по бактериологической эффективности, полученные в ходе клинических исследований.

Таблица 3. Бактериологическая эффективность по результатам клинических исследований

Патогены		Уровень эрадикации	
		Кол-во штаммов	%
<i>Staphylococcus spp.</i>	<i>S. aureus</i>	17/22	77,3
	<i>S. epidermidis</i>	13/15	86,7
	Коагулазонегативные стафилококки	18/18	100
<i>Streptococcus spp.</i>		46/46	100
<i>Streptococcus pneumoniae</i>		25/25	100
<i>Enterococcus spp.</i>	<i>E. faecium</i>	39/47	83,0
	<i>E. avium</i>	4/4	--
	Прочие энтерококки	1/1	--
<i>Moraxella spp.</i>		6/6	100
<i>E. coli</i>		63/67	94,0
<i>Citrobacter spp.</i>		7/7	100
<i>Klebsiella spp.</i>		18/18	100
<i>Enterobacter spp.</i>		14/15	93,3
<i>Serratia spp.</i>		12/12	100
<i>Proteus spp.</i>		7/8	87,5
<i>H. influenzae</i>		16/21	76,2
<i>P. aeruginosa</i>		40/55	72,7
<i>Acinetobacter spp.</i>		3/3	--
<i>Peptostreptococcus spp.</i>		14/14	100
<i>Bacteroides spp.</i>		22/22	100
<i>Prevotella spp.</i>		23/24	95,8
<i>Fusobacterium spp.</i>		8/9	88,9

Эффективность препарата в отношении патогенов, перечисленных ниже, подтверждена опытом клинического применения:

Грамположительные аэробы: *Staphylococcus spp.* (за исключением *MRSA*), *Streptococcus spp.*, включая *Streptococcus pneumoniae*, *Enterococcus spp.* (за исключением *E. faecium*).

Грамотрицательные аэробы: *Moraxella spp.*, *E. coli*, *Citrobacter spp.*, *Klebsiella spp.*, *Enterobacter spp.*, *Serratia spp.*, *Proteus spp.*, *H. influenzae*, *P. aeruginosa*, *Acinetobacter spp.*

Грамположительные анаэробы: *Peptostreptococcus spp.*

Грамотрицательные анаэробы: *Bacteroides spp.*, *Prevotella spp.*, *Fusobacterium spp.*

5.2. Фармакокинетические свойства

Абсорбция

Концентрация биопенема в плазме крови здоровых добровольцев (n=5) после однократной внутривенной инфузии в дозе 150 мг, 300 мг и 600 мг в течение 60 минут пропорционально зависела от дозы и была практически линейной.

Таблица 4. Фармакокинетические параметры биапенема у здоровых добровольцев (среднее $\pm$ стандартное отклонение, $n = 5$).

Доза \ Параметр	C _{max} (мкг/мл)	T _{1/2β} (ч)	AUC (мкг/мл.ч)
150 мг	8,8 $\pm$ 0,9	0,97 $\pm$ 0,06	14,7 $\pm$ 0,8
300 мг	17,3 $\pm$ 2,2	1,03 $\pm$ 0,10	29,2 $\pm$ 4,8
600 мг	32,4 $\pm$ 2,3	1,04 $\pm$ 0,07	55,4 $\pm$ 6,0

C_{max} – максимальная концентрация; T_{1/2} -- период полувыведения, AUC – площадь под фармакокинетической кривой «концентрация – время».

Аналогично, AUC возрастала с увеличением дозы практически линейным образом.

При повторной внутривенной инфузии препарата фармакокинетика практически полностью соответствовала такой при однократной инфузии; кумуляция не наблюдалась.

Распределение

Биапенем демонстрирует минимальное связывание с белками плазмы (3,7% после однократной дозы 300 мг). После внутривенного введения биапенем быстро и хорошо распределяется и проникает в большинство тканей (например, ткань легких, матка (миометрий, эндометрий), яичники) и жидкостей организма (например, мокрота, плевральный выпот, перитонеальная жидкость). Концентрация биапенема в мокроте в течение 6 часов после применения препарата составляла от 0,1 до 2,5 мкг/г. Максимальная концентрация биапенема при однократной внутривенной инфузии в дозе 300 мг (в промежутке от 0,5 до 2 ч после введения) составила: в экссудате малого таза – 9,6 мкг/мл, в перитонеальной жидкости – от 9 до 24 мг/л, в плевральном выпоте – от 4,4 до 9,5 мг/л, в интерстициальной жидкости – до 9,6 мг/л.

Биотрансформация

Метаболиты биапенема в плазме крови здоровых добровольцев не были обнаружены ни в одном из пяти случаев при однократной внутривенной инфузии в дозах 150 мг, 300 мг и 600 мг, а также при повторном введении в дозах 300 мг и 600 мг. При однократном и повторном введении, общее содержание метаболитов, выведенных почками, составило 9,7 – 23,4%.

Антибактериальной активностью данные метаболиты не обладали.

Элиминация

Биапенем выводится преимущественно почками путем клубочковой фильтрации и незначительное количество выводится кишечником. Почечный клиренс 6,63 л/ч. Средняя концентрация биапенема в моче здоровых добровольцев ($n=5$) через 0~2 часа после однократной внутривенной инфузии в дозах 150 мг, 300 и 600 мг в течение 60 минут составила 325,5 мкг/мл, 584,8 мкг/мл и 1105,1 мкг/мл, соответственно; через 8-12 часов – 2,4 мкг/мл, 4,7 мкг/мл и 21,4 мкг/мл, соответственно. Выведение биапенема почками в течение 0-12 часов составило 62,1%, 63,4% и 64,0%, соответственно.

Почечная недостаточность

Исследование фармакокинетики при однократной внутривенной инфузии в дозе 300 мг в течение 60 минут у пациентов с нарушением функции почек ($n=3$) выявили задержку элиминации биапенема из плазмы крови.

Таблица 5. Фармакокинетические параметры у пациентов с нарушенной функцией почек

Параметр \ Случай	C _{max} (мкг/мл)	T _{1/2} (ч)	AUC (мкг/мл.ч)
КК 23,1 мл/мин	25,6	2,28	68,0
КК 40,6 мл/мин	24,0	1,82	61,1
КК 49,4 мл/мин	12,8	1,95	46,6

КК – клиренс креатинина; T_{1/2} – период полувыведения

У пациентов с нарушением функции почек средней степени тяжести (КК 50 мл/мин), получавших 300 мг биапенема в течение 30 минут ежедневно два раза в сутки в течение 7 дней, кумуляция биапенема в плазме крови и моче не наблюдалась. У пяти пациентов с

нарушением функции почек, требующих проведения гемодиализа, получавших перед началом проведения гемодиализа 300 мг биапенема внутривенно инфузионно в течение 60 минут, наблюдалась задержка элиминации биапенема из плазмы крови. Отмечалось влияние гемодиализа на профиль выведения препарата: в ходе гемодиализа отмечено двухфазное полувыведение биапенема с $T_{1/2} = 1,16$ и $3,33$ час. И напротив, при введении биапенема тем же пациентам в день, когда гемодиализ не проводился, отмечено моноэкспоненциальное выведение биапенема.

Таблица 6. Фармакокинетические параметры у пациентов, находящихся на гемодиализе

Параметр Процедура	C_{max} (мкг/мл)	T_{max} (ч)	$T_{1/2}$ (ч)	AUC (мкг/мл.ч)
В ходе гемодиализа	$24,8 \pm 4,7$	$1,0 \pm 0,0$	$3,33 \pm 0,91$	$52,7 \pm 8,7$
Между процедурами гемодиализа	$19,0 \pm 4,7$	$1,2 \pm 0,4$	$3,92 \pm 1,09$	120 ± 29

T_{max} – время достижения максимальной концентрации

Около 90% биапенема выводится из крови во время гемодиализа.

Печеночная недостаточность

Фармакокинетика биапенема у пациентов с нарушением функции печени не изучалась.

Лица пожилого возраста

Сообщалось о связанных с возрастом изменениях фармакокинетического профиля биапенема после внутреннего введения однократных доз 300 мг и 600 мг у здоровых пожилых добровольцев (возраст от 65 до 75 лет и старше, $n = 10$). У пяти пожилых добровольцев в возрасте старше 75 лет (средний возраст 77,8 лет) величина AUC биапенема после каждого внутривенного введения препарата была значительно выше (44,6 и 91,9 мкг/мл.ч), чем величина AUC биапенема у молодых здоровых мужчин добровольцев (средний возраст 23 года) (26,6 и 66,1 мкг/мл.ч). Также сообщалось о связанных с возрастом изменением величины почечного клиренса биапенема. Такие изменения фармакокинетики объясняются комбинацией сниженной функции почек и снижением массы тела у пожилых добровольцев. Важно, что связанные с возрастом измененные отдельные фармакокинетические параметры незначительно отличались от таковых у пожилых добровольцев, имеющих нормальную почечную функцию для своего возраста.

Дети

Фармакокинетика биапенема у детей не изучалась

6. ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

6.1. Перечень вспомогательных веществ

Отсутствуют

6.2. Несовместимость

Фармацевтически несовместим со следующими растворами: вода для инъекций; растворы аминокислот, содержащие L-цистеин и L-цистин. Данный лекарственный препарат не следует смешивать с другими лекарственными препаратами, за исключением упомянутых в разделе 6.6

6.3. Срок годности (срок хранения)

3 года.

Восстановленный раствор не предназначен для хранения и должен использоваться непосредственно сразу после разведения.

6.4. Особые меры предосторожности при хранении

При температуре не выше 25°C .

Условия хранения после восстановления лекарственного препарата см. в разделе 6.3.

6.5. Характер и содержание первичной упаковки

По 300 мг или 600 мг препарата во флаконы из прозрачного стекла первого гидролитического класса, укупоренные пробками резиновыми (на основе бутилкаучука, хлорбутилкаучука, бромбутилкаучука) медицинскими, обжатые алюминиевыми колпачками или колпачками комбинированными (алюминиевый колпачок с предохранительной пластмассовой крышкой).

По 1 флакону вместе с листком-вкладышем в пачку картонную.

Для стационаров:

От 10 до 50 флаконов с препаратом и равным количеством листков-вкладышей в картонную коробку.

6.6. Особые меры предосторожности при уничтожении использованного лекарственного препарата или отходов, полученных после применения лекарственного препарата и другие манипуляции с препаратом

Приготовление раствора для инфузий

Перед применением препарат во флаконе растворяют в 10 мл (для дозировки 300 мг) или 20 мл (для дозировки 600 мг) растворителя (0,9% раствор натрия хлорида или 5% раствор декстрозы). Затем в асептических условиях переносят полученный раствор в инфузионный флакон, содержащий 90 мл (или 80 мл) аналогичного инфузионного растворителя для получения раствора концентрацией 3 мг/мл или 6 мг/мл.

Восстановленный раствор представляет собой прозрачную жидкость от бесцветного до светло-желтого цвета.

Не рекомендуется использовать растворы биापенема с концентрацией, превышающей 6 мг/мл.

Раствор для инфузий рекомендуется готовить непосредственно перед применением.

Нет особых требований к утилизации.

7. ДЕРЖАТЕЛЬ РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ

Российская Федерация

ООО «Джодас Экспоим»

140200, Московская обл., Воскресенский р-он, г. Воскресенск, ул. Московская, д.45м, офис 4.

Тел.: +7 (499) 503-01-92

E-mail: info@jodas.ru

7.1. Представитель держателя регистрационного удостоверения

Претензии потребителей направлять по адресу:

Российская Федерация

ООО «Джодас Экспоим»

140200, Московская обл., Воскресенский р-он, г. Воскресенск, ул. Московская, д.45м, офис 4.

Тел.: +7 (499) 503-01-92, +7 (980) 194-89-33

E-mail: info@jodas.ru

8. НОМЕР РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ

9. ДАТА ПЕРВИЧНОЙ РЕГИСТРАЦИИ (ПОДТВЕРЖДЕНИЯ РЕГИСТРАЦИИ, ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ)

Дата первой регистрации

10. ДАТА ПЕРЕСМОТРА ТЕКСТА

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 31.05.2024 № 10882
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0005)

Общая характеристика лекарственного препарата Биापенем доступна на информационном портале Евразийского экономического союза в информационно-коммуникационной сети «Интернет» <http://eec.eaeunion.org/>.