

МИНЗДРАВ РОССИИ
ЛП-006704-120421
СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Тримедат®

порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 152,5 г

АО «Валента Фарм», Россия

Изменение № 1

120421

Дата внесения Изменения «___» 20___ г.

Старая редакция	Новая редакция
<p>Способ применения и дозы</p> <p>Внутрь.</p> <p>Перед использованием порошок для приготовления суспензии следует разбить питьевой водой комнатной температуры до риски на флаконе, тщательно взболтать до получения однородной суспензии, повторно добавить питьевой воды комнатной температуры до риски. Перед каждым приемом препарата содержимое флакона необходимо тщательно взбалтывать до получения однородной суспензии.</p> <p>Необходимую дозу отмеряют с помощью мерного стаканчика, вложенного в упаковку, на котором имеются специальные деления, цена которых соответствует количеству препарата в миллиграммах (от 25 мг до 100 мг). После использования мерный стаканчик промывают проточной водой, сушат и хранят вместе с флаконом.</p> <p>Взрослым и детям с 12 лет по 100-200 мг 3 раза в сутки.</p> <p>Детям 5-12 лет: по 50 мг 3 раза в сутки.</p> <p>Детям 3-5 лет: по 25 мг 3 раза в сутки.</p> <p>Для предупреждения рецидива синдрома раздраженного кишечника после проведенного курса лечения (4 недели) в период ремиссии рекомендуется продолжить прием препарата в дозе 300 мг в сутки в течение 12 недель.</p>	<p>Способ применения и дозы</p> <p>Внутрь.</p> <p>Перед использованием порошок для приготовления суспензии следует разбить питьевой водой комнатной температуры до риски на флаконе, тщательно взболтать до получения однородной суспензии, повторно добавить питьевой воды комнатной температуры до риски. Перед каждым приемом препарата содержимое флакона необходимо тщательно взбалтывать до получения однородной суспензии.</p> <p>Необходимую дозу отмеряют с помощью мерного стаканчика, вложенного в упаковку, на котором имеются специальные деления, цена которых соответствует количеству препарата в миллиграммах (от 25 мг до 100 мг). После использования мерный стаканчик промывают проточной водой, сушат и хранят вместе с флаконом.</p> <p>Взрослым и детям с 12 лет по 100-200 мг 3 раза в сутки. Для предупреждения рецидива синдрома раздраженного кишечника после проведенного курса лечения (4 недели) в период ремиссии рекомендуется продолжить прием препарата в дозе 300 мг в сутки в течение 12 недель.</p>

Изменение № 1 к Инструкции по медицинскому применению С. 2

Старая редакция	Новая редакция
миссии рекомендуется продолжить прием препарата в дозе 300 мг в сутки в течение 12 недель.	Детям 5-12 лет: по 50 мг 3 раза в сутки. Детям 3-5 лет: по 25 мг 3 раза в сутки.

Руководитель дирекции
по регистрации ЛС и БАД
АО «Валента Фарм»



Н.В. Прилипухова