



ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ
ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

ВИПИДИЯ®

торговое наименование лекарственного препарата

таблетки, покрытые пленочной оболочкой,
12,5 мг, 25 мг

лекарственная форма, дозировка

Такеда Айлэнд Лимитед, Ирландия

наименование производителя, страна

Изменение № 1

230119

Дата внесения Изменения « ___ » _____ 20__ г.

Старая редакция	Новая редакция
Побочное действие	Побочное действие
Частота побочных эффектов препарата расценивается следующим образом:	Частота побочных эффектов препарата расценивается следующим образом:
Очень частые: $\geq 1/10$	Очень частые: $\geq 1/10$
Частые: $\geq 1/100, < 1/10$	Частые: $\geq 1/100, < 1/10$
Нечастые: $\geq 1/1000, < 1/100$	Нечастые: $\geq 1/1000, < 1/100$
Редкие: $\geq 1/10\ 000, < 1/1000$	Редкие: $\geq 1/10\ 000, < 1/1000$
Очень редкие: $< 1/10\ 000$	Очень редкие: $< 1/10\ 000$
Частота не установлена (данные постмаркетинговых наблюдений)	Частота не установлена (данные постмаркетинговых наблюдений)
<u>Нарушения со стороны нервной системы:</u>	<u>Нарушения со стороны нервной системы:</u>
Часто: головная боль.	Часто: головная боль.

Старая редакция	Новая редакция
<p><u>Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта:</u></p> <p>Часто: боль в эпигастральной области, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь.</p> <p>Частота не установлена: острый панкреатит.</p>	<p><u>Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта:</u></p> <p>Часто: боль в эпигастральной области, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, диарея.</p> <p>Частота не установлена: острый панкреатит.</p>
<p><u>Нарушения со стороны печени и желчевыводящих путей:</u></p> <p>Частота не установлена: нарушение функции печени, в том числе печеночная недостаточность.</p>	<p><u>Нарушения со стороны печени и желчевыводящих путей:</u></p> <p>Частота не установлена: нарушение функции печени, в том числе печеночная недостаточность.</p>
<p><u>Нарушения со стороны кожи и подкожных тканей:</u></p> <p>Часто: зуд, сыпь.</p> <p>Частота не установлена: эксфолиативные кожные заболевания, включая синдром Стивенса-Джонсона, полиморфная эритема, ангионевротический отек, крапивница.</p>	<p><u>Нарушения со стороны кожи и подкожных тканей:</u></p> <p>Часто: зуд, сыпь.</p> <p>Частота не установлена: эксфолиативные кожные заболевания, включая синдром Стивенса-Джонсона, полиморфная эритема, ангионевротический отек, крапивница.</p>
<p><u>Инфекционные или паразитарные заболевания</u></p> <p>Часто: инфекции верхних дыхательных путей, назофарингит.</p>	<p><u>Инфекционные или паразитарные заболевания:</u></p> <p>Часто: инфекции верхних дыхательных путей, назофарингит.</p>
<p><u>Нарушения со стороны иммунной системы</u></p> <p>Частота не установлена: реакции</p>	<p><u>Нарушения со стороны иммунной системы:</u></p> <p>Частота не установлена: реакции</p>

Старая редакция	Новая редакция
гиперчувствительности, включая анафилактическую реакцию.	гиперчувствительности, включая анафилактическую реакцию. <u>Нарушения со стороны обмена веществ и питания:</u> Часто: гипогликемия в случае совместного применения с производными сульфонилмочевины или препаратами инсулина.

Менеджер по фармаконадзору, СНГ/

Уполномоченное лицо по фармаконадзору в ЕАЭС _____ Марчук В.А.

