

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата
МЕТЕОСПАЗМИЛ

Регистрационный номер:
Торговое название МЕТЕОСПАЗМИЛ
Лекарственная форма: капсулы

Состав на 1 капсулу

Действующие вещества:

Альверина цитрат.....60 мг

Симетикон300 мг

Вспомогательные вещества: соевый лецитин, триглицериды средней плотности.

Состав оболочки: желатин, глицерол, титана диоксид, очищенная вода.

Описание: мягкие, продолговатые, светло-желтого цвета блестящие капсулы размер 6, содержащие густую суспензию белого цвета

Код АТХ: [A03AX58]

Фармакотерапевтическая группа
Спазмолитическое средство.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Комбинированный препарат. Оказывает спазмолитическое действие, уменьшает газообразование в кишечнике.

Альверин - миотропный спазмолитик, действие которого не сопровождается атропиноподобным эффектом или ганглиоблокирующей активностью. Снижает повышенный тонус гладкой мускулатуры кишечника.

Симетикон - гидрофобное полимерное вещество с низким поверхностным натяжением, снижающее газообразование в кишечнике и покрывающее защитной пленкой стенки пищеварительного канала.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Функциональные расстройства желудочно-кишечного тракта, проявляющиеся болями в животе, повышенным газообразованием, отрыжкой, тошнотой, запорами, поносами или их чередованием.

Подготовка к рентгенологическому, ультразвуковому или инструментальному исследованию органов брюшной полости.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.
Дети до 14 лет.

Laboratoires MAYOLY SPINDLER

Division Internationale/International Department

1, Avenue de L'Europe B.P. 51

78401 CHATOU CEDEX-FRANCE

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

Внутрь. По 1 капсуле 2-3 раза в сутки перед едой.

При подготовке к исследованиям органов брюшной полости – по 1 капсуле 2-3-раза накануне исследования и 1 капсула утром в день исследования.

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

В редких случаях возможны аллергические реакции.

ПЕРЕДОЗИРОВКА

В случае передозировки необходимо обратиться к врачу.

БЕРЕМЕННОСТЬ И ГРУДНОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ

Не рекомендуется применение в период беременности и грудного вскармливания.

ЛЕКАРСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Не известно.

ФОРМА ВЫПУСКА

Капсулы.

По 10 капсул в блистере (ПВХ/алюминий), 2, 3, 4 блистера с инструкцией по применению в картонной пачке.

СРОК ГОДНОСТИ

3 года. Не использовать по окончании срока годности, указанного на упаковке.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

При температуре не выше 25°C в недоступном для детей месте.

УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК

Без рецепта.

Производитель:

Лаборатории МАЙОЛИ-СПИНДЛЕР,
6, авеню де Л'Европ 78400 ШАТУ, Франция

Все претензии по качеству препарата направлять:

РОССИЯ 123610 Москва,
Краснопресненская наб.12,
ЦМТ, «Международная-2», офис 742
тел.: (495) 258 20 06, факс (495) 258 20 07

Директор ИДКЛС

Представитель фирмы



С.В. Буданов

Laboratoires MAYOLY SPINDLER

Division Internationale / International Department Laboratoires MAYOLY SPINDLER

6, Avenue de L'Europe B.P. 51
78401 CHATOU CEDEX-FRANCE

Л.В. Кривова
Division Internationale / International Department
6, Avenue de L'Europe B.P. 51
78401 CHATOU CEDEX-FRANCE