

ИНСТРУКЦИЯ  
 ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

**ЭНЗИКС**

таблеток набор: индапамид, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2,5 мг +

эналаприл, таблетки 10 мг

Хемофарм А.Д., Сербия

ООО «Хемофарм», Россия

Изменение № 2

Дата внесения Изменения « 141119 » 20\_\_ г.

| Старая редакция  | Новая редакция   |
|--|--|
| <p><b>Побочное действие</b></p> <p>Частота развития неблагоприятных побочных реакций приведена в соответствии с классификацией Всемирной организации здравоохранения: очень часто (<math>\geq 1/10</math>), часто (<math>\geq 1/100</math> и <math>&lt; 1/10</math>), нечасто (<math>\geq 1/1000</math> и <math>&lt; 1/100</math>), редко (<math>\geq 1/10000</math> и <math>&lt; 1/1000</math>), очень редко (<math>&lt; 1/10000</math>), неизвестно (частота не может быть оценена по доступным данным).</p> | <p><b>Побочное действие</b></p> <p>Частота развития неблагоприятных побочных реакций приведена в соответствии с классификацией Всемирной организации здравоохранения: очень часто (<math>\geq 1/10</math>), часто (<math>\geq 1/100</math> и <math>&lt; 1/10</math>), нечасто (<math>\geq 1/1000</math> и <math>&lt; 1/100</math>), редко (<math>\geq 1/10000</math> и <math>&lt; 1/1000</math>), очень редко (<math>&lt; 1/10000</math>), неизвестно (частота не может быть оценена по доступным данным).</p> |
| <p><u>Нарушения со стороны крови и лимфатической системы:</u></p>  | <p><u>Нарушения со стороны крови и лимфатической системы:</u></p>  |
| <p><i>Нечасто:</i> анемия<sup>2)</sup>, гемолитическая анемия<sup>2)</sup>, апластическая анемия<sup>2)</sup></p>  | <p><i>Нечасто:</i> анемия<sup>2)</sup>, гемолитическая анемия<sup>2)</sup>, апластическая анемия<sup>2)</sup></p>  |
| <p><i>Редко:</i> нейтропения<sup>2)</sup>, снижение гемоглобина<sup>2)</sup>, снижение гематокрита<sup>2)</sup>, тромбоцитопения<sup>2)</sup>,</p>   | <p><i>Редко:</i> нейтропения<sup>2)</sup>, снижение гемоглобина<sup>2)</sup>, снижение гематокрита<sup>2)</sup>, тромбоцитопения<sup>2)</sup>,</p>   |

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
|  | агранулоцитоз <sup>2)</sup> , угнетение костномозгового кроветворения <sup>2)</sup> , панцитопения <sup>2)</sup> , лимфаденопатия <sup>2)</sup>                   |  | агранулоцитоз <sup>2)</sup> , угнетение костномозгового кроветворения <sup>2)</sup> , панцитопения <sup>2)</sup> , лимфаденопатия <sup>2)</sup>                   |
| <i>Очень редко:</i>                              | тромбоцитопения <sup>1)</sup> , лейкопения <sup>1)</sup> , агранулоцитоз <sup>1)</sup> , апластическая анемия <sup>1)</sup> , гемолитическая анемия <sup>1)</sup> | <i>Очень редко:</i>                              | тромбоцитопения <sup>1)</sup> , лейкопения <sup>1)</sup> , агранулоцитоз <sup>1)</sup> , апластическая анемия <sup>1)</sup> , гемолитическая анемия <sup>1)</sup> |
| <u>Нарушения со стороны иммунной системы:</u>    |   | <u>Нарушения со стороны иммунной системы:</u>    |   |
| <i>Часто:</i>                                    | реакции гиперчувствительности <sup>2)</sup>   | <i>Часто:</i>                                    | реакции гиперчувствительности <sup>2)</sup>   |
| <i>Редко:</i>                                    | аутоиммунные заболевания <sup>2)</sup>  | <i>Редко:</i>                                    | аутоиммунные заболевания <sup>2)</sup>  |
| <u>Нарушения со стороны эндокринной системы:</u> |   | <u>Нарушения со стороны эндокринной системы:</u> |   |
| <i>Нечасто:</i>                                  | гипогликемия (у пациентов с сахарным диабетом) <sup>2)</sup>  | <i>Нечасто:</i>                                  | гипогликемия (у пациентов с сахарным диабетом) <sup>2)</sup>  |
| <i>Неизвестно:</i>                               | гипергликемия (у пациентов с сахарным диабетом <sup>1)</sup> , синдром неадекватной секреции антидиуретического гормона <sup>2)</sup>                             | <i>Неизвестно:</i>                               | гипергликемия (у пациентов с сахарным диабетом) <sup>1)</sup> , синдром неадекватной секреции антидиуретического гормона <sup>2)</sup>                            |
| <u>Нарушения со стороны нервной системы:</u>     |   | <u>Нарушения со стороны нервной системы:</u>     |   |
| <i>Очень часто:</i>                              | головокружение <sup>2)</sup>  | <i>Очень часто:</i>                              | головокружение <sup>2)</sup>  |
| <i>Часто:</i>                                    | головная боль <sup>2)</sup> , обморок <sup>2)</sup> , нарушения вкусовых ощущений <sup>2)</sup> , депрессия <sup>2)</sup>   | <i>Часто:</i>                                    | головная боль <sup>2)</sup> , обморок <sup>2)</sup> , нарушения вкусовых ощущений <sup>2)</sup> , депрессия <sup>2)</sup>   |
| <i>Нечасто:</i>                                  | спутанность сознания <sup>2)</sup> ,  | <i>Нечасто:</i>                                  | спутанность сознания <sup>2)</sup> ,  |

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
|   | нервозность <sup>2)</sup> ,<br>бессонница <sup>2)</sup> , сонливость <sup>2)</sup> ,<br>парестезия <sup>2)</sup> , вертиго <sup>2)</sup> ,<br>инсульт <sup>2)</sup> (обычно связано<br>с выраженным снижением<br>АД у пациентов групп<br>высокого сердечного<br>риска) |   | нервозность <sup>2)</sup> ,<br>бессонница <sup>2)</sup> , сонливость <sup>2)</sup> ,<br>парестезия <sup>2)</sup> , вертиго <sup>2)</sup> ,<br>инсульт <sup>2)</sup> (обычно связано<br>с выраженным снижением<br>АД у пациентов групп<br>высокого сердечного<br>риска) |
| <i>Редко:</i>   | головокружение <sup>1)</sup> ,<br>головная боль <sup>1)</sup> ,<br>парестезия <sup>1)</sup> ,<br>«кошмарные»<br>сновидения <sup>2)</sup> , нарушения<br>сна <sup>2)</sup>  | <i>Редко:</i>   | головокружение <sup>1)</sup> ,<br>головная боль <sup>1)</sup> ,<br>парестезия <sup>1)</sup> ,<br>«кошмарные»<br>сновидения <sup>2)</sup> , нарушения<br>сна <sup>2)</sup>  |
| <i>Неизвестно:</i>  | обморок <sup>1)</sup>  | <i>Неизвестно:</i>  | обморок <sup>1)</sup>  |
| <u>Нарушения со стороны органа зрения:</u>                            |  | <u>Нарушения со стороны органа зрения:</u>                            |  |
| <i>Очень<br/>часто:</i>   | нарушения зрения <sup>2)</sup>   | <i>Очень<br/>часто:</i>   | нарушения зрения <sup>2)</sup>   |
| <u>Нарушения со стороны органа слуха и<br/>лабиринтные нарушения:</u> |  | <u>Нарушения со стороны органа слуха и<br/>лабиринтные нарушения:</u> |  |
| <i>Нечасто:</i>   | шум в ушах <sup>2)</sup>   | <i>Нечасто:</i>   | шум в ушах <sup>2)</sup>   |
| <u>Нарушения со стороны сердца:</u>                                   |  | <u>Нарушения со стороны сердца:</u>                                   |  |
| <i>Часто:</i>   | нарушения сердечного<br>ритма <sup>2)</sup> , стенокардия <sup>2)</sup> ,<br>тахикардия <sup>2)</sup>  | <i>Часто:</i>   | нарушения сердечного<br>ритма <sup>2)</sup> , стенокардия <sup>2)</sup> ,<br>тахикардия <sup>2)</sup>  |
| <i>Нечасто:</i>   | ощущение сердцебиения <sup>2)</sup> ,<br>инфаркт миокарда <sup>2)</sup><br>(обычно связано с<br>выраженным снижением<br>АД у пациентов групп<br>высокого сердечного<br>риска)  | <i>Нечасто:</i>   | ощущение сердцебиения <sup>2)</sup> ,<br>инфаркт миокарда <sup>2)</sup><br>(обычно связано с<br>выраженным снижением<br>АД у пациентов групп<br>высокого сердечного<br>риска)  |
| <i>Очень<br/>редко:</i>   | аритмия <sup>1)</sup>  | <i>Очень<br/>редко:</i>   | аритмия <sup>1)</sup>  |
| <i>Неизвестно:</i>  | полиморфная  | <i>Неизвестно:</i>  | полиморфная  |

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
|   | желудочковая тахикардия типа «пируэт» <sup>1)</sup> (возможно со смертельным исходом), увеличение интервала QT на ЭКГ <sup>1)</sup> |   | желудочковая тахикардия типа «пируэт» <sup>1)</sup> (возможно со смертельным исходом), увеличение интервала QT на ЭКГ <sup>1)</sup> |
| <u>Нарушения со стороны сосудов:</u>  |   | <u>Нарушения со стороны сосудов:</u>  |   |
| <i>Часто:</i>   | выраженное снижение АД <sup>2)</sup> , ортостатическая гипотензия <sup>2)</sup>   | <i>Часто:</i>   | выраженное снижение АД <sup>2)</sup> , ортостатическая гипотензия <sup>2)</sup>   |
| <i>Нечасто:</i>   | «приливы» крови к коже лица <sup>2)</sup>   | <i>Нечасто:</i>   | «приливы» крови к коже лица <sup>2)</sup>   |
| <i>Редко:</i>   | синдром Рейно <sup>2)</sup>   | <i>Редко:</i>   | синдром Рейно <sup>2)</sup>   |
| <i>Очень редко:</i>   | выраженное снижение АД <sup>1)</sup>  | <i>Очень редко:</i>   | выраженное снижение АД <sup>1)</sup>  |
| <u>Нарушения со стороны дыхательной системы органов грудной клетки и средостения:</u> |   | <u>Нарушения со стороны дыхательной системы органов грудной клетки и средостения:</u> |   |
| <i>Очень часто:</i>   | кашель <sup>2)</sup>  | <i>Очень часто:</i>   | кашель <sup>2)</sup>  |
| <i>Часто:</i>   | боль в грудной клетке <sup>2)</sup> , одышка <sup>2)</sup>  | <i>Часто:</i>   | боль в грудной клетке <sup>2)</sup> , одышка <sup>2)</sup>  |
| <i>Нечасто:</i>   | ринорея <sup>2)</sup> , боль в горле <sup>2)</sup> , бронхоспазм <sup>2)</sup> , дисфония <sup>2)</sup>                             | <i>Нечасто:</i>   | ринорея <sup>2)</sup> , боль в горле <sup>2)</sup> , бронхоспазм <sup>2)</sup> , дисфония <sup>2)</sup>                             |
| <i>Редко:</i>   | легочные инфильтраты <sup>2)</sup> , ринит <sup>2)</sup> , аллергический альвеолит/ эозинофильная пневмония <sup>2)</sup>           | <i>Редко:</i>   | легочные инфильтраты <sup>2)</sup> , ринит <sup>2)</sup> , аллергический альвеолит/ эозинофильная пневмония <sup>2)</sup>           |
| <u>Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта:</u>                               |   | <u>Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта:</u>                               |   |
| <i>Очень часто:</i>   | тошнота <sup>2)</sup>   | <i>Очень часто:</i>   | тошнота <sup>2)</sup>   |
| <i>Часто:</i>   | диарея <sup>2)</sup> , боль в животе <sup>2)</sup>  | <i>Часто:</i>   | диарея <sup>2)</sup> , боль в животе <sup>2)</sup>  |
| <i>Нечасто:</i>   | кишечная непроходимость <sup>2)</sup> , панкреатит <sup>2)</sup> , рвота <sup>1),2)</sup> ,   | <i>Нечасто:</i>   | кишечная непроходимость <sup>2)</sup> , панкреатит <sup>2)</sup> , рвота <sup>1),2)</sup> ,   |

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
|   | диспепсия <sup>2)</sup> , запор <sup>2)</sup> ,<br>анорексия <sup>2)</sup> , синдром<br>«раздраженного<br>желудка» <sup>2)</sup> , сухость<br>слизистой оболочки<br>полости рта <sup>2)</sup> , пептические<br>язвы <sup>2)</sup>      |   | диспепсия <sup>2)</sup> , запор <sup>2)</sup> ,<br>анорексия <sup>2)</sup> , синдром<br>«раздраженного<br>желудка» <sup>2)</sup> , сухость<br>слизистой оболочки<br>полости рта <sup>2)</sup> , пептические<br>язвы <sup>2)</sup>      |
| <i>Редко:</i>   | тошнота <sup>1)</sup> , запор <sup>1)</sup> , сухость<br>слизистой оболочки<br>полости рта <sup>1)</sup>   | <i>Редко:</i>   | тошнота <sup>1)</sup> , запор <sup>1)</sup> , сухость<br>слизистой оболочки<br>полости рта <sup>1)</sup>   |
| <i>Очень<br/>редко:</i>   | панкреатит <sup>1)</sup> ,<br>стоматит/афтозное<br>изъязвление <sup>2)</sup> , глоссит <sup>2)</sup> ,<br>интестинальный отек <sup>2)</sup>  | <i>Очень<br/>редко:</i>   | панкреатит <sup>1)</sup> ,<br>стоматит/афтозное<br>изъязвление <sup>2)</sup> , глоссит <sup>2)</sup> ,<br>интестинальный отек <sup>2)</sup>  |
| <u><i>Нарушения со стороны печени и<br/>желчевыводящих путей:</i></u> |  | <u><i>Нарушения со стороны печени и<br/>желчевыводящих путей:</i></u> |  |
| <i>Редко:</i>   | нарушение функции<br>печени и<br>желчевыделения <sup>2)</sup> , гепатит<br>(гепатоцеллюлярный или<br>холестатический) <sup>2)</sup> ,<br>включая печеночный<br>некроз <sup>2)</sup> , холеста <sup>2)</sup> ,<br>желтуха <sup>2)</sup> | <i>Редко:</i>   | нарушение функции<br>печени и<br>желчевыделения <sup>2)</sup> , гепатит<br>(гепатоцеллюлярный или<br>холестатический) <sup>2)</sup> ,<br>включая печеночный<br>некроз <sup>2)</sup> , холеста <sup>2)</sup> ,<br>желтуха <sup>2)</sup> |
| <i>Очень<br/>редко:</i>   | нарушение функции<br>печени <sup>1)</sup>  | <i>Очень<br/>редко:</i>   | нарушение функции<br>печени <sup>1)</sup>  |
| <i>Неизвестно:</i>  | гепатит <sup>1)</sup> , печеночная<br>энцефалопатия на фоне<br>исходных нарушений<br>функции печени <sup>1)</sup>  | <i>Неизвестно:</i>  | гепатит <sup>1)</sup> , печеночная<br>энцефалопатия на фоне<br>исходных нарушений<br>функции печени <sup>1)</sup>  |
| <u><i>Нарушения со стороны кожи и<br/>подкожных тканей:</i></u>       |  | <u><i>Нарушения со стороны кожи и<br/>подкожных тканей:</i></u>       |  |
| <i>Часто:</i>   | макулопапулезная сыпь <sup>1)</sup> ,<br>ангионевротический отек<br>(лица, конечностей, губ,   | <i>Часто:</i>   | макулопапулезная сыпь <sup>1)</sup> ,<br>ангионевротический отек<br>(лица, конечностей, губ,   |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  | языка, голосовых складок и/или гортани) <sup>2)</sup> , кожная сыпь <sup>2)</sup>  |  | языка, голосовых складок и/или гортани) <sup>2)</sup> , кожная сыпь <sup>2)</sup>  |
| <i>Нечасто:</i>  | пурпура <sup>1)</sup> , геморрагический васкулит <sup>1)</sup> , кожный зуд <sup>2)</sup> , крапивница <sup>2)</sup> , алопеция <sup>2)</sup>  | <i>Нечасто:</i>  | пурпура <sup>1)</sup> , геморрагический васкулит <sup>1)</sup> , кожный зуд <sup>2)</sup> , крапивница <sup>2)</sup> , алопеция <sup>2)</sup>  |
| <i>Редко:</i>  | мультиформная эритема <sup>2)</sup> , синдром Стивенса-Джонсона <sup>2)</sup> , эксфолиативный дерматит <sup>2)</sup> , токсический эпидермальный некролиз <sup>2)</sup> , пемфигус <sup>2)</sup> , эритродермия <sup>2)</sup> | <i>Редко:</i>  | мультиформная эритема <sup>2)</sup> , синдром Стивенса-Джонсона <sup>2)</sup> , эксфолиативный дерматит <sup>2)</sup> , токсический эпидермальный некролиз <sup>2)</sup> , пемфигус <sup>2)</sup> , эритродермия <sup>2)</sup> |
| <i>Очень редко:</i>  | ангионевротический отек <sup>1)</sup> , крапивница <sup>1)</sup> , токсический эпидермальный некролиз <sup>1)</sup> , синдром Стивенса-Джонсона <sup>1)</sup>  | <i>Очень редко:</i>  | ангионевротический отек <sup>1)</sup> , крапивница <sup>1)</sup> , токсический эпидермальный некролиз <sup>1)</sup> , синдром Стивенса-Джонсона <sup>1)</sup>  |
| <i>Неизвестно:</i>   | фотосенсибилизация <sup>1),2)</sup> (включая зуд, сыпь) <sup>2)</sup>  | <i>Неизвестно:</i>   | фотосенсибилизация <sup>1),2)</sup> (включая зуд, сыпь) <sup>2)</sup>  |
| <u><i>Нарушения со стороны скелетно-мышечной и соединительной ткани:</i></u> |  | <u><i>Нарушения со стороны скелетно-мышечной и соединительной ткани:</i></u> |  |
| <i>Нечасто:</i>  | мышечные подергивания (судороги) <sup>2)</sup>   | <i>Нечасто:</i>  | мышечные подергивания (судороги) <sup>2)</sup>   |
| <u><i>Нарушения со стороны почек и мочевыводящих путей:</i></u>              |  | <u><i>Нарушения со стороны почек и мочевыводящих путей:</i></u>              |  |
| <i>Нечасто:</i>  | нарушение функции почек <sup>2)</sup> , острая почечная недостаточность <sup>2)</sup> , протеинурия <sup>2)</sup>  | <i>Нечасто:</i>  | нарушение функции почек <sup>2)</sup> , острая почечная недостаточность <sup>2)</sup> , протеинурия <sup>2)</sup>  |
| <i>Редко:</i>  | олигурия <sup>2)</sup>   | <i>Редко:</i>  | олигурия <sup>2)</sup>   |
| <i>Очень</i>   | почечная   | <i>Очень</i>   | почечная   |

|  |   |
|--|---|
| <i>редко:</i>  | недостаточность <sup>1)</sup>   |
| <u>Нарушения со стороны половых органов и молочной железы:</u> |   |
| <i>Нечасто:</i>  | эректильная дисфункция <sup>2)</sup>  |
| <i>Редко:</i>  | гинекомастия <sup>2)</sup>  |
| <u>Общие расстройства и нарушения в месте введения:</u>        |   |
| <i>Очень часто:</i>  | астения <sup>2)</sup>   |
| <i>Часто:</i>  | повышенная утомляемость <sup>2)</sup>   |
| <i>Нечасто:</i>  | слабость <sup>2)</sup> , лихорадка <sup>2)</sup>  |
| <i>Редко:</i>  | астения <sup>1)</sup>   |
| <i>Неизвестно:</i>   | обострение системной красной волчанки <sup>1)</sup> , симптомокомплекс, включающий в различных сочетаниях лихорадку, серозит, васкулит, миозит/миалгию, артралгию/артрит, эозинофилию, лейкоцитоз, увеличение скорости оседания эритроцитов (СОЭ), положительный тест на антиядерные антитела <sup>2)</sup> |
| <u>Лабораторные и инструментальные данные:</u>                 |   |
| <i>Часто:</i>  | гиперкалиемия <sup>2)</sup> , гиперкреатининемия <sup>2)</sup>  |
| <i>Нечасто:</i>  | повышение концентрации мочевины в крови <sup>2)</sup> , гипонатриемия <sup>2)</sup>   |
| <i>Редко:</i>  | повышение активности  |

|  |   |
|--|---|
| <i>редко:</i>  | недостаточность <sup>1)</sup>   |
| <u>Нарушения со стороны половых органов и молочной железы:</u> |   |
| <i>Нечасто:</i>  | эректильная дисфункция <sup>2)</sup>  |
| <i>Редко:</i>  | гинекомастия <sup>2)</sup>  |
| <u>Общие расстройства и нарушения в месте введения:</u>        |   |
| <i>Очень часто:</i>  | астения <sup>2)</sup>   |
| <i>Часто:</i>  | повышенная утомляемость <sup>2)</sup>   |
| <i>Нечасто:</i>  | слабость <sup>2)</sup> , лихорадка <sup>2)</sup>  |
| <i>Редко:</i>  | астения <sup>1)</sup>   |
| <i>Неизвестно:</i>   | обострение системной красной волчанки <sup>1)</sup> , симптомокомплекс, включающий в различных сочетаниях лихорадку, серозит, васкулит, миозит/миалгию, артралгию/артрит, эозинофилию, лейкоцитоз, увеличение скорости оседания эритроцитов (СОЭ), положительный тест на антиядерные антитела <sup>2)</sup> |
| <u>Лабораторные и инструментальные данные:</u>                 |   |
| <i>Часто:</i>  | гиперкалиемия <sup>2)</sup> , гиперкреатининемия <sup>2)</sup>  |
| <i>Нечасто:</i>  | повышение концентрации мочевины в крови <sup>2)</sup> , гипонатриемия <sup>2)</sup>   |
| <i>Редко:</i>  | повышение активности  |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  | «печеночных»<br>ферментов <sup>2)</sup> ,<br>гипербилирубинемия <sup>2)</sup>  |  | «печеночных»<br>ферментов <sup>2)</sup> ,<br>гипербилирубинемия <sup>2)</sup>  |
| <i>Очень<br/>редко:</i>  | гиперкальциемия <sup>1)</sup>  | <i>Очень<br/>редко:</i>  | гиперкальциемия <sup>1)</sup>  |
| <i>Неизвестно:</i>   | гипокалиемия <sup>1)</sup> ,<br>гипонатриемия <sup>1)</sup> ,<br>гипохлоремический<br>алкалоз <sup>1)</sup> , повышение<br>активности «печеночных»<br>трансаминаз <sup>1)</sup> ,<br>гиперурикемия (у<br>пациентов с подагрой) <sup>1)</sup> | <i>Неизвестно:</i>   | гипокалиемия <sup>1)</sup> ,<br>гипонатриемия <sup>1)</sup> ,<br>гипохлоремический<br>алкалоз <sup>1)</sup> , повышение<br>активности «печеночных»<br>трансаминаз <sup>1)</sup> ,<br>гиперурикемия (у<br>пациентов с подагрой) <sup>1)</sup> |
| 1 - нежелательные реакции, связанные с применением индапамида.<br>2 - нежелательные реакции, связанные с применением эналаприла.   |  | 1 - нежелательные реакции, связанные с применением индапамида.<br>2 - нежелательные реакции, связанные с применением эналаприла.                                     |  |
| <b>Производитель</b><br><b>Хемофарм А.Д., Сербия</b><br>26300 г. Вршац, Београдский путь бб,<br>Сербия<br>Тел.: 13/803100, факс: 13/803424.<br>или<br><b>ООО «Хемофарм», Россия</b><br>249032, Калужская обл., г. Обнинск,<br>Киевское шоссе, д. 62<br>Тел.: (48439) 90-500, факс: (48439) 90-525. |  | <b>Производитель</b><br><b>ООО «Хемофарм», Россия</b><br>249032, Калужская обл., г. Обнинск,<br>Киевское шоссе, д. 62<br>Тел.: (48439) 90-500, факс: (48439) 90-525. |  |

По доверенности АО «Нижфарм»



О.Э. Петрушина