

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА
ГИОКСИЗОН

Регистрационный номер ЛП-000818 от 06.10.2011

МИНЗДРАВ РОССИИ

14.07.22
СОГЛАСОВАНО

Торговое наименование Гиоксизон

Международное непатентованное или группировочное наименование
гидрокортизон + окситетрациклин

Лекарственная форма Мазь для наружного применения

Состав

1г препарата содержит:

Действующие вещества: гидрокортизона ацетат - 10,0 мг,
окситетрациклина гидрохлорид - 25800 ЕД (30,0 мг);

Вспомогательные вещества: метилпарагидроксибензоат, парафин жидкий,
вазелин.

Описание

Однородная мазь желтого цвета.

Фармакотерапевтическая группа

Глюкокортикоид для местного применения + антибиотик-тетрациклин.

Код АТХ: D07CA01

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Комбинированный препарат для наружного применения.

Гидрокортизон - глюкокортикоид, оказывает противовоспалительный, противоаллергический, антиэксудативный и противозудный эффекты. Тормозит фагоцитоз. Уменьшает образование арахидоновой кислоты из фосфолипидов клеточных оболочек за счет угнетения активности фосфолипазы А2. Угнетает высвобождение интерлейкинов и других цитокинов, обладающих противовоспалительным действием; тормозит высвобождение гистамина и возникновение местных аллергических реакций. Снижает синтез белков и отложение коллагена в коже, препятствует развитию соединительной ткани, ослабляет пролиферативные процессы.

Окситетрациклин-антибиотик из группы тетрациклических, оказывает бактериостатическое действие. Активен в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, *Rickettsia spp.*, *Treponema spp.*, *Chlamydia spp.*, *Mycoplasma spp.*

Фармакокинетика

При наружном применении препарата в терапевтических дозах трансдермальное всасывание действующих веществ в кровь очень незначительное. Применение окклюзионных повязок повышает трансдермальное всасывание гидрокортизона и окситетрациклина, что может приводить к увеличению риска развития системных побочных эффектов.

Показания к применению

Заболевания кожи, поддающиеся терапии глюокортикоидами и осложненные вторичной бактериальной инфекцией, вызванной чувствительными к окситетрациклину микроорганизмами: дерматит (в том числе аллергический, контактный, себорейный, солнечный, атопический), экзема, многоформная экссудативная эритема, поверхностные ожоги и отморожения, укусы насекомых.

Противопоказания

Гиперчувствительность к компонентам препарата, туберкулез кожи, опухоли кожи, предраковые заболевания кожи, дерматомикоз, вирусные заболевания кожи (герпес, ветряная оспа), розацеа и периоральный дерматит, сифилитические поражения кожи, постvakцинальные кожные реакции; беременность, период грудного вскармливания, детский возраст до 2 лет.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания противопоказано.

Способ применения и дозы

Наружно. Мазь наносят тонким слоем 0,5-1 г 1-3 раза в сутки на пораженные участки или на стерильную марлю, которой прикрывают кожу, перевязав бинтом. Длительность лечения индивидуальна и зависит от степени поражения и локализации. Курс лечения не должен превышать 2 недель.

При применении препарата на коже лица мазь наносится один раз в сутки тонким слоем или точечно на элементы, избегая нанесения на периорбитальную область. При этом курс лечения не должен превышать 7-10 дней.

У детей старше 2-х лет применяют на ограниченных участках кожи коротким курсом (в течение 5-7 дней).

Побочное действие

Раздражение кожи, зуд, сыпь; суперинфекция, аллергические реакции. При применении на коже лица: телеангиэкзазии, атрофия подкожной клетчатки в области рта. При длительном применении и/или нанесении на большие поверхности - системные побочные эффекты глюокортикоидов.

Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

Симптомы: при длительном применении и/или в высоких дозах возможно подавление функции надпочечников с развитием вторичной надпочечниковой недостаточности и симптомов гиперкортицизма, включая синдром Иценко-Кушинга.

Длительное лечение окситетрациклином в повышенных дозах может привести к росту нечувствительной микрофлоры.

Лечение: отмена препарата. Соответствующая симптоматическая терапия. При необходимости – коррекция электролитных нарушений.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Не изучалось.

Особые указания

Во время лечения глюкокортикоидами не следует проводить вакцинацию против оспы и планировать другие виды иммунизации в связи с иммунодепрессивным эффектом глюкокортикоидов.

Следует избегать попадания мази в глаза и на слизистые оболочки.

У детей следует избегать нанесения препарата на обширные поверхности кожи и под окклюзионные повязки.

При необходимости применения препарата на коже лица, лечение должно быть коротким, в связи с повышенным всасыванием и возможностью появления побочного действия.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Препарат не влияет на способность управлять транспортом или заниматься другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Форма выпуска

Мазь для наружного применения 10 мг/г + 30 мг/г. По 10 г в тубы алюминиевые с навинчивающимися бушонами из полиэтилена низкого давления. Каждую тубу вместе с инструкцией по применению помещают в картонную пачку.

Срок годности

3 года. Не применять после истечения срока годности.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Условия отпуска

Отпускают по рецепту.

Владелец регистрационного удостоверения/Производитель/Организация, принимающая претензии потребителей

Акционерное общество "Муромский приборостроительный завод"
(АО «МПЗ»), Россия

602205, Владимирская обл., г. Муром, ул. 30 лет Победы, д. 1а,
факс (49234) 6-02-52, тел. 6-34-71

Представитель АО «МПЗ»,
и.о начальника ОЛС



И.М. Шашуркина