

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению лекарственного препарата

Терафлекс® Адванс

наименование лекарственного препарата

Глюкозамин + Ибупрофен + Хондроитина сульфат**капсулы 250 мг + 100 мг + 200 мг**

лекарственная форма, дозировка

произведено Контракт Фармакал Корпорейшн, США

наименование производителя, страна

Изменение № 6Дата внесения Изменения « » 20 г.

Старая редакция	Новая редакция
Способ применения и дозы Внутрь. Взрослым применять по 2 капсулы 3 раза в сутки после еды. Капсулы принимают внутрь, запивая небольшим количеством воды. Длительность приема без консультации врача не должна превышать 3 недели. Дальнейшее применение препарата следует согласовывать с врачом.	Способ применения и дозы Внутрь. Взрослым применять по 2 капсулы 3 раза в сутки после еды. Капсулы принимают внутрь, запивая небольшим количеством воды. Длительность приема без консультации врача не должна превышать 3 недели. Суточная дозировка 6 капсул содержит глюкозамина сульфат 1500 мг, ибупрофен 600 мг, хондроитина сульфат натрия 1200 мг. Не следует превышать рекомендуемую суточную дозу. Дальнейшее применение препарата следует согласовывать с врачом. После применения Терафлекс® Адванс и

Старая редакция	Новая редакция
	лечения обострения, рекомендуется перейти на длительное применение препарата Терафлекс® (Глюкозамин + Хондроитина сульфат) для дальнейшего восстановления хрящевой ткани суставов.

Менеджер по регистрации

Олейник

Олейник Е.Ф.