

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

АЦИЛАКТ

Регистрационный номер:

Торговое наименование: Ацилакт.

МИНЗДРАВ РОССИИ

290922

СОГЛАСОВАНО

Международное непатентованное или группировочное наименование:

Лактобактерии ацидофильные.

Лекарственная форма: Лиофилизат для приготовления суспензии для местного применения и приема внутрь.

Состав:

1 (доза) содержит:

Действующее вещество: живые лактобактерии ацидофильные не менее 10^7 КОЕ;

Вспомогательные вещества: молоко(*) – 20 %, сахар(*) – 8 %, желатин(*) – 1 %.

Описание

Кристаллическая или пористая масса различных оттенков бежевого или беловато-серого цвета со специфическим запахом.

Характеристика препарата:

Препарат представляет собой микробную массу живых, антагонистически активных лактобактерий ацидофильных штаммов *Lactobacillus acidophilus* 100 аш, *NK₁*; *K₃Ш₂₄*, лиофилизированную в среде культивирования с добавлением сахарозо-желатино-молочной среды.

Фармакотерапевтическая группа: эубиотик.

Код АТХ: A07FA

Фармакологические свойства:

Живые микробные клетки лактобактерий ацидофильных обладают высокой антагонистической активностью в отношении широкого спектра патогенных и условно-патогенных микроорганизмов, что определяет корректирующее

(*) Содержание компонентов защитной среды высушивания в готовом препарате не определяют

действие препарата при нарушениях бактериоценоза ротовой полости, кишечника и женских гениталий.

Показания к применению

Лечение заболеваний полости рта:

- воспалительные заболевания слизистой оболочки полости рта (глоссит, афтозный стоматит, язвенно-некротический гингивит);
- патологические изменения слизистой полости рта, сопровождающие системные заболевания (красный плоский лишай, мультиформная эксудативная эритема, болезнь Шэгрена);
- другие заболевания полости рта, связанные с дисбактериозом (гальванизм, множественные поражения зубов кариесом, пародонтит), подготовка к плановым челюстнолицевым операциям с целью профилактики гнойно-воспалительных осложнений.

Лечение заболеваний желудочно-кишечного тракта:

- острые кишечные инфекции, пищевые токсициоинфекции, вызванные условнопатогенными микроорганизмами или неустановленной этиологии, ротавирусный гастроэнтерит;
- длительные кишечные расстройства, особенно у детей раннего возраста;
- затяжные и хронические колиты и энтероколиты инфекционной и неинфекционной этиологии, сопровождающиеся нарушением микрофлоры;
- среднетяжелая и легкая форма неспецифического язвенного колита у взрослых;
- ослабленные часто болеющие дети и взрослые с явлениями дисбактериоза, в том числе сопровождающегося иммунодефицитным состоянием;
- комплексная терапия атопического дерматита у детей с явлением дисбактериоза кишечника.

Лечение больных с вагинальными дисбиозами и неспецифическими воспалительными процессами влагалища:

- кольпиты (за исключением случаев гонококковой, трихомонадной и кандидозной этиологии) - ацилакт назначают как самостоятельное средство после окончания курса антибактериальной терапии
- дисбактериозы влагалища, сопровождающие воспалительные процессы шейки, тела и придатков матки - после окончания курса антибактериальной терапии;
- подготовка к плановым гинекологическим операциям с целью профилактики послеоперационных инфекционных осложнений;
- предродовая подготовка беременных групп риска по развитию гнойно-септических осложнений.

Рекомендуется сочетанное применение различных лекарственных форм Ацилакта.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам Ацилакта. Не рекомендуется применять при вульвовагинальных кандидозах.

С осторожностью

Прежде чем начать лечение, необходимо проконсультироваться с врачом.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Лактобактерии являются представителями нормальной микрофлоры человека. Препараты, изготовленные на их основе, рекомендованы к применению во время беременности и в период кормления грудью.

Способ применения и дозы

В зависимости от заболевания ацилакт применяют внутрь, местно и интравагинально.

Содержимое флакона растворить кипяченой водой комнатной температуры из расчета 5 мл (чайная ложка) воды на 1 дозу препарата.

Растворение осуществить следующим образом: в стакан налить необходимое количество воды (в соответствии с количеством доз, указанных на флаконе); вскрыть флакон, удалив колпачок и пробку; из стакана перенести во флакон небольшое количество воды; после растворения (препарат растворяется не

более 5 мин с образованием гомогенной суспензии бежевого или беловато-серого цвета) содержимое флакона перенести в тот же стакан, перемешать. Одна чайная ложка растворенного таким образом препарата составляет 1 дозу. Растворенный препарат хранению не подлежит.

Суточную дозу и продолжительность курса лечения определяет врач в зависимости от клинической формы заболевания и выраженности дисбактериоза.

При заболеваниях слизистой оболочки полости рта ацилакт применяют после еды в виде водной взвеси для полосканий.

При глоссите назначают по 5 доз 2-3 раза в сутки, курс лечения составляет 14-15 дней. При рецидивирующем афтозном стоматите и язвенно-некротическом гингивите лечение проводят по такой же схеме двумя курсами с перерывом в 7 дней.

При патологических процессах в полости рта, обусловленных системными заболеваниями (красный плоский лишай, мультиформная экссудативная эритема, болезнь Шэгрена), назначают по 10 доз в день в 4 приема двумя курсами 14-15 дней каждый с перерывом в 7 дней.

Больным с кишечными расстройствами в возрасте до 6 месяцев назначают по 5 доз в сутки в 2 приема, детям старше 6 месяцев и взрослым - по 5 доз в 2-3 раза в сутки за 30-40 мин до еды.

При острых воспалительных процессах кишечника курс лечения составляет 7-8 дней, при затяжных и рецидивирующих формах заболевания - 14-21 день.

При нарушениях нормальной микрофлоры кишечника у детей с атопическим дерматитом по 5 доз в сутки курсами 20-25 дней, с перерывами в 1,5 - 2 месяца. Количество курсов определяется состоянием кожного покрова и нормализацией микрофлоры кишечника.

При необходимости врач назначает повторный курс лечения.

При воспалительных процессах женских гениталий назначают интравагинально по 5 доз 2 раза в сутки, путем орошения водной взвесью препарата или введением пропитанного ею тампона. С целью профилактики гнойно-

септических осложнений применяют по 5 доз 1 раз в сутки в течение 5-7 дней до предполагаемой операции или родоразрешения.

Побочное действие

Не выявлены.

Передозировка

Случаи передозировки препарата не наблюдались.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Клинически значимое взаимодействие препарата с другими лекарственными средствами не установлено. Ацилакт можно применять одновременно с антибактериальной, противовирусной и иммуномодулирующей терапией. Корrigирующую терапию ацилактом можно назначить после курса лечения специфическими бактериофагами, предназначенными для элиминации условно-патогенных бактерий.

Влияние лекарственного препарата на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Препарат не влияет на способность управлять транспортом или заниматься другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Форма выпуска

Лиофилизат для приготовления суспензии для местного применения и приема внутрь. По 5 доз в бесцветные стеклянные флаконы. По 10 флаконов с препаратом вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

Хранить при температуре от 2 до 8 °C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Транспортирование

При температуре от 2 до 8 °C.

Срок годности

1 год. Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

**Владелец регистрационного удостоверения/ производитель/ организация,
принимающая претензии потребителей**

ООО Фирма «ФЕРМЕНТ», Россия

Московская обл., г.о. Красногорск, пос. Мечниково, владение 11, стр. 1.

Тел.: (495) 635-00-28.

Генеральный директор
ООО «УК Фармаклон» -
управляющий организацией
ООО Фирма «ФЕРМЕНТ»



Саулин А.И.