

## МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ  
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА  
АЦИЛАКТ

Внимательно прочитайте эту инструкцию перед тем, как начать применение этого препарата, так как она содержит важную для Вас информацию.

- Сохраняйте инструкцию, она может понадобиться вновь.
- Если у Вас возникли вопросы, обратитесь к врачу.
- Лекарственное средство, которым Вы лечитесь, предназначено лично Вам, и его не следует передавать другим лицам, поскольку оно может причинить им вред даже при наличии тех же симптомов, что и у Вас.

**Регистрационный номер:** P N000283/01

**Торговое наименование:** Ацилакт.

**Международное непатентованное или группировочное наименование:**

Лактобактерии ацидофильные.

**Лекарственная форма:** Суппозитории вагинальные.

**Состав:**

1 суппозиторий содержит:

*Действующее вещество:* живые лактобактерии ацидофильные - не менее  $10^7$ ;

*вспомогательные вещества:* сахароза - 0,7-0,75 %; желатин - 0,12-0,13 %; молоко обезжиренное (обрат) - 1,2-1,3 %; жир кондитерский или жир твердый импортный - 75-80 %; парафин нефтяной твердый - 5-10 %; эмульгатор Т-2 - 5-10 %.

**Описание:** суппозитории от желтовато-серого до светло-бежевого цвета, конусообразной или цилиндрической формы со специфическим запахом жира; допускается неоднородность окраски в виде вкраплений или «мраморности», потемнение светло-коричневого цвета на конусообразном конце суппозитория.

**Характеристика препарата:** Ацилакт представляет собой микробную массу живых антагонистически активных лактобактерий ацидофильных штаммов *Lactobacillus acidophilus* 100аш, NK<sub>1</sub> K<sub>3</sub>Ш<sub>24</sub>, лиофилизированную в среде культивирования с добавлением защитной (сахарозо-желатино-молочной) среды высушивания, сформованную в суппозитории.

**Фармакотерапевтическая группа:** эубиотик.

**Код АТХ:** [G01AX14]

**Фармакологические свойства:** Ацилакт обладает высокой антагонистической активностью в отношении патогенных и условно-патогенных микробов, включая *Staphylococcus* spp, *Escherichia coli*, *Proteus* spp, что определяет корректирующее действие препарата при нарушениях микробиоценоза влагалища.

**Показания к применению:**

- кольпиты, вызванные условно-патогенными микроорганизмами. Назначают как самостоятельное средство или после окончания курса антибактериальной терапии;
- дисбиозы влагалища, в том числе бактериальный вагиноз. Назначают как самостоятельное средство или в комплексной терапии;
- подострые и хронические инфекционные заболевания влагалища. Назначают после окончания курса антибактериальной терапии с целью реабилитации;
- гормонально зависимые кольпиты, сенильные и др. Назначают на фоне специфической гормональной терапии;
- подготовка к плановым гинекологическим операциям с целью профилактики послеоперационных инфекционных осложнений;
- предродовая подготовка беременных группы риска по развитию воспалительных заболеваний с целью профилактики и лечения дисбиоза влагалища;
- в качестве вспомогательного средства в сочетании со специфической антимикробной, противовирусной и иммуномодулирующей терапией при лечении урогенитальных инфекций и заболеваний, передающихся половым путем (гонореи, урогенитального хламидиоза, урогенитального герпеса и др).

Возможно сочетанное применение суппозиториев и одной из пероральных форм лактобактерий ацидофильных по рекомендации врача.

**Противопоказания:**

Повышенная чувствительность к компонентам Ацилакта.

Не рекомендуется применять при вульвовагинальных кандидозах.

Детский возраст с учетом анатомо-физиологических особенностей.

**Меры предосторожности при применении:**

Прежде чем, начать лечение необходимо проконсультироваться с врачом.

**Применение при беременности и в период кормления грудью:**

Лактобактерии являются представителями нормальной микрофлоры человека. Препараты, изготовленные на их основе, рекомендованы к применению во время беременности и в период кормления грудью (см. «Показания к применению»).

**Способ применения и дозы:**

Ацилакт применяют вагинально:

- при лечении кольпитов, вызванных условно-патогенными микроорганизмами Ацилакт назначают вагинально по 1 суппозиторию 2 раза в сутки в течение 5-10 дней.
- при лечении дисбиозов влагалища, в том числе бактериального вагиноза Ацилакт назначают вагинально по 1 суппозиторию 2 раза в сутки в течение 5-10 дней.
- при лечении сенильных кольпитов гормональной природы Ацилакт назначают вагинально по 1 суппозиторию 2 раза в сутки в течение 5-10 дней на фоне специфической гормональной терапии.
- при лечении подострых и хронических инфекционных заболеваний влагалища, с целью реабилитации после окончания курса антибактериальной терапии, Ацилакт назначают вагинально по 1 суппозиторию 1-2 раза в сутки в течение 10 дней. Курс повторяют по назначению врача через 10-20 дней.
- для профилактики послеоперационных инфекционных осложнений при подготовке к плановым гинекологическим операциям Ацилакт назначают вагинально по 1 суппозиторию 1-2 раза в день в течение 5-10 дней до предполагаемой операции или родов разрешения.
- во время предродовой подготовке беременных «группы риска» при нарушении чистоты вагинального секрета до III-IV степени Ацилакт назначают вагинально по 1 суппозиторию 1-2 раза в сутки в течение 5 - 10 и более дней под контролем восстановления чистоты вагинального секрета до I-II степени и исчезновения клинических симптомов.

- в качестве вспомогательного средства для лечения урогенитальных инфекций Ацилакт назначают вагинально по 1 суппозиторию 1-2 раза в сутки в течение 10 дней.

Если после проведенного курса лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом.

Применяйте Ацилакт только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

#### **Побочное действие:**

Препарат может вызывать аллергические реакции.

Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

#### **Передозировка:**

Не выявлена.

#### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Применение Ацилакта возможно сочетать с одновременным назначением антимикробной, противовирусной и иммуномодулирующей терапии.

Не рекомендуется сочетать с одновременным местным назначением антибактериальных препаратов.

#### **Особые указания:**

Перед вагинальным введением с суппозитория удаляют упаковочный материал.

#### **Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами:**

Ацилакт не влияет на выполнение видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций (управление транспортными средствами, машинным оборудованием и т.п.).

#### **Форма выпуска:**

Суппозитории вагинальные. По 5 суппозитория в ячейковой контурной упаковке из пленки ПВХ/ПЭ или ПВХ, или ЭП-73С отечественного или импортного производства для суппозиторных контейнеров. По 2 ячейковые контурные упаковки в пачке из картона с

Инструкцией по применению.

**Условия хранения:**

Препарат хранят при температуре не выше 10 °С в недоступном для детей месте.

**Срок годности:** 1 год. Препарат с истекшим сроком годности применению не подлежит.

**Условия отпуска:**

Без рецепта.

**Производитель:**

ООО «ЛАНАФАРМ», 127299, Москва, ул. К. Цеткин, 4. Тел. (499) 159-59-55.


**Наименование и адрес организации для принятия претензий от потребителя:**

Претензии потребителя на препарат следует направлять в адрес предприятия - изготовителя: ООО «ЛАНАФАРМ», 127299, Москва, ул. К. Цеткин, 4. Тел. (499) 159-59-55.

Генеральный директор  
ООО «ЛАНАФАРМ»



Сорокин С.В.



102900