

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ИНСТРУКЦИЯ**

**по применению лекарственного препарата для медицинского применения**

**Ацилакт, таблетки 1 доза, 5 доз**

**Регистрационный номер:**

**Торговое название препарата:** Ацилакт

**Международное непатентованное название:** лактобактерии ацидофильные&

**Лекарственная форма:** таблетки 1 доза, 5 доз

Препарат представляет собой микробную массу живых лактобактерий ацидофильных, антагонистически активных штаммов *Lactobacillus acidophilus* 100аш, NK<sub>1</sub>, K<sub>3</sub>Ш<sub>24</sub>, лиофилизированную в среде культивирования с добавлением защитной сахарозо-желатино-молочной среды и спрессованную в таблетку.

Одна таблетка содержит не менее 10<sup>7</sup> живых лактобактерий ацидофильных в 1 дозе, вспомогательные вещества - лактоза, кальция стеарат, тальк.

Таблетки желтовато-серого или разных оттенков бежевого цвета, допускается «мраморность» окраски, имеют круглую форму с плоскими или слегка выпуклыми гладкими поверхностями со специфическим запахом.

**Фармакотерапевтическая группа:** МИБП-эубиотик

**Код АТХ:** A07FA01

**Биологические свойства:** препарат обладает высокой антагонистической активностью в отношении патогенных и условно-патогенных микроорганизмов, включая стафилококки, шигеллы, энтеропатогенные кишечные палочки, протей, что определяет коррегирующее действие препарата при нарушениях бактериоценоза ротовой полости и кишечника.

**Назначение:** лечение заболеваний полости рта и желудочно-кишечного тракта, сопровождающихся нарушениями нормальной микрофлоры у детей с 3-летнего возраста и взрослых.

**Показания к применению:**

*При заболеваниях полости рта:*

- воспалительные заболевания слизистой оболочки полости рта (глоссит, афтозный стоматит, язвенно-некротический гингивит);

- патологические изменения слизистой полости рта, сопровождающие системные заболевания (красный плоский лишай, мультиформная экссудативная эритема, болезнь Шэгрена);
- другие заболевания полости рта, связанные с дисбактериозом (гальванизм, множественные поражения зубов кариесом, пародонтит), подготовка к плановым челюстно-лицевым операциям с целью профилактики гнойно-воспалительных осложнений.

*При заболеваниях желудочно-кишечного тракта:*

- острые кишечные инфекции, пищевые токсикоинфекции, вызванные условно-патогенными микроорганизмами или неустановленной этиологии; ротавирусный гастроэнтерит;
- длительные кишечные расстройства, особенно у детей раннего возраста;
- затяжные и хронические колиты и энтероколиты инфекционной и неинфекционной этиологии, сопровождающиеся нарушением микрофлоры;
- среднетяжелая и легкая форма неспецифического язвенного колита у взрослых;
- ослабленные, часто болеющие дети и взрослые с явлениями дисбактериоза, в том числе сопровождающегося иммунодефицитным состоянием;
- комплексная терапия атопического дерматита у детей с явлениями дисбактериоза кишечника.

Корректирующую терапию ацилактом можно назначить после курса лечения бактериофагами.

**Противопоказания:** не установлены.

**Способ применения и дозировка:** в зависимости от заболевания препарат применяют через рот, без предварительного растворения, запивая кипяченой водой комнатной температуры или рассасывая.

Суточную дозу и продолжительность курса лечения определяет врач в зависимости от клинической формы заболевания и выраженности дисбактериоза.

*При заболеваниях полости рта:*

При заболеваниях слизистой оболочки препарат применяют после еды, рассасывая таблетку.

При глоссите назначают 5 доз в сутки в 2-3 приема, курс лечения составляет 14-15 дней.

При рецидивирующем афтозном стоматите и язвенно-некротическом гингивите лечение проводят по такой же схеме двумя курсами с перерывом в 7 дней.

При патологических процессах в полости рта, обусловленных системными заболеваниями, назначают по 10 доз в сутки в 4 приема двумя курсами по 14-15 дней каждый с перерывом в 7 дней.

*При заболеваниях желудочно-кишечного тракта:*

Таблетированный препарат принимают внутрь не позднее, чем за 20-30 мин до еды, запивая водой.

Больным с кишечными расстройствами назначают по 5 доз 2-3 раза в сутки.

При острых воспалительных процессах кишечника курс лечения составляет 7-8 дней, при затяжных и рецидивирующих формах заболевания – 14-21 день.

При необходимости врач назначает повторные курсы под контролем лабораторных показателей.

При нарушениях нормальной микрофлоры кишечника у детей с атопическим дерматитом по 5 доз в сутки курсами 20 - 25 дней, с перерывами в 1,5 - 2 мес. Количество курсов определяется состоянием кожного покрова и нормализацией микрофлоры кишечника.

**Побочные действия:** не выявлены.

**Взаимодействие с другими лекарственными препаратами:** применение таблеток возможно сочетать с одновременным проведением антибактериальной, противовирусной и иммуномодулирующей терапии.

**Применение во время беременности и лактации:** лактобактерии являются представителями нормальной микрофлоры человека. Поэтому, препараты, изготовленные на их основе, могут применяться при беременности и в период лактации.

**Особые указания:** препарат не влияет на выполнение видов деятельности требующих особого внимания и быстрых реакций (управление транспортными средствами, машинным оборудованием и т.п.).

**Форма выпуска:** 1 доза, 5 доз в таблетке.

По 20, 30, 60 таблеток в банке пропиленовой с крышкой из пропилена с контролем первого вскрытия. 1 банка в пачке из картона с инструкцией по применению.

**Условия отпуска из аптек:** без рецепта.

**Срок годности препарата:** 1 год.

**Условия хранения:** препарат хранят в соответствии с СП 3.3.2.1248-03 при температуре от 2 до 10 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

**Условия транспортирования:** препарат транспортируют в соответствии с СП 3.3.2.1248-03 при температуре от 2 до 10 °С.

**Препарат не пригоден для применения:**

- с истекшим сроком годности;

- без маркировки;
- целостность упаковки которого нарушена;
- с деформированными таблетками в банке.

**Рекламации на препарат направлять в ФГБУ «ГИСК им. Л.А.Тарасевича»**

Минздравсоцразвития России: 119002, г. Москва, пер. Сивцев Вражек, д. 41

тел (499) 241-39-22 и в адрес предприятия производителя ЗАО «ФИРМА «ВИТАФАРМА»  
125124, г. Москва, ул. Ямского поля 1-я, д. 17, корп. 15, тел/факс: (499) 257-10-90.

Генеральный директор  
ЗАО «ФИРМА «ВИТАФАРМА»



Ю.И. Мордвинцев

