

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Налоксон

торговое наименование лекарственного препарата

Налоксон

международное непатентованное, или группировочное, или химическое наименование

раствор для инъекций, 0,4 мг/мл





лекарственная форма, дозировка

Федеральное государственное унитарное предприятие**«Московский эндокринный завод», Россия**

наименование производителя, страна

Изменение № 7Дата внесения Изменения « » **191021** 20 г.

Старая редакция	Новая редакция
<p>Способ применения и дозы ... (далее по тексту).</p> <p><i>Введение препарата в шприц-тюбике (внутримышечно)</i></p> <p>1. Одной рукой взяться за ребристый ободок канюли, другой – за корпус. По часовой стрелке накрутить каню- лю на горловину корпуса до упора.</p> <div data-bbox="593 1377 790 1473" data-label="Image"> </div> <p>Рисунок 1</p>	<p>Способ применения и дозы ... (далее по тексту).</p> <p><i>Введение препарата в шприц-тюбике (внутримышечно)</i></p> <p>1. Одной рукой взяться за ребристый ободок канюли, другой – за корпус. По часовой стрелке накрутить каню- лю на горловину корпуса до упора.</p> <div data-bbox="1232 1377 1428 1473" data-label="Image"> </div> <p>Рисунок 1</p>

Старая редакция	Новая редакция
<p>Слегка повернуть канюлю против часовой стрелки и повторно повернуть ее до упора (рисунок 1).</p> <p>2. Снять защитный колпачок, закрывающий иглу, держа шприц-тюбик за ребристый ободок канюли (рисунок 2).</p> <p>3. Удерживая шприц-тюбик за ребристый ободок канюли, не сжимая пальцами корпуса и не касаясь руками или другими предметами иглы, ввести иглу в мягкие ткани бедра, ягодицы или плеча (можно</p>	<p>Слегка повернуть канюлю против часовой стрелки и повторно повернуть ее до упора (рисунок 1).</p> <p>2. Придерживая ребристое основание канюли, повернуть защитный колпачок вокруг своей оси и снять его (рисунок 2).</p> <p>3. Удерживая шприц-тюбик за ребристый ободок канюли, не сжимая пальцами корпуса и не касаясь руками или другими предметами иглы, ввести иглу в мягкие ткани бедра, ягодицы или плеча (можно</p>
	
<p>Рисунок 2</p>	<p>Рисунок 2</p>
	
<p>Рисунок 3</p>	<p>Рисунок 3</p>

Старая редакция	Новая редакция
<p>через одежду) до канюли (рисунок 3).</p> <p>4. Сильно сжать пальцами корпус, одним движением выдавив его содержимое (рисунок 4).</p> <p>5. <i>Не разжимая пальцев!</i>, извлечь иглу (рисунок 5).</p>	<p>через одежду) до канюли (рисунок 3).</p> <p>4. Сильно сжать пальцами корпус, одним движением выдавив его содержимое (рисунок 4).</p> <p>5. <i>Не разжимая пальцев!</i>, извлечь иглу (рисунок 5).</p>




Рисунок 4



Рисунок 5



Рисунок 4



Рисунок 5

Заместитель Генерального директора
по развитию лекарственных препаратов
ФГУП «Московский эндокринный завод»



Е.А. Ежова