

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению лекарственного препарата

ПИРАЛГИН

(торговое наименование лекарственного препарата)

таблетки

(лекарственная форма, дозировка)

РУП «Белмедпрепараты», Республика Беларусь

(наименование фирмы производителя, страна)

ИЗМЕНЕНИЕ № 1


Дата внесения Изменения « ____ » 180522 20__ г.

Старая редакция	Новая редакция
<p>Противопоказания</p> <ul style="list-style-type: none"> – повышенная чувствительность к компонентам препарата; – тяжелые нарушения функции печени или почек (КК < 30 мл/мин); – дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы; – язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения; – бронхоспазм; – заболевания крови (сопровождающиеся агранулоцитозом, тромбоцитопенией; наследственная гемолитическая анемия, связанная с дефицитом глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы); – состояния, сопровождающиеся угнетением дыхания; – повышенное внутричерепное давление, черепно-мозговая травма; – острый инфаркт миокарда; нарушения 	<p>Противопоказания</p> <ul style="list-style-type: none"> – повышенная чувствительность к компонентам препарата; – тяжелые нарушения функции печени или почек (КК < 30 мл/мин); – дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы; – язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения; – бронхоспазм; – заболевания крови (сопровождающиеся агранулоцитозом, тромбоцитопенией; наследственная гемолитическая анемия, связанная с дефицитом глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы); – состояния, сопровождающиеся угнетением дыхания; – повышенное внутричерепное давление, черепно-мозговая травма; – острый инфаркт миокарда; нарушения

145973



Старая редакция	Новая редакция
<p>сердечного ритма;</p> <ul style="list-style-type: none"> – повышенное артериальное давление; – глаукома; – алкогольное опьянение; – высокая активность ферментов цитохрома P450 (CYP2D6); – детский возраст до 18 лет; – тяжелые заболевания сердца; – множественные травмы или обширные хирургические вмешательства. – злоупотребление опиоидами, транквилизаторами, седативными препаратами в анамнезе; – печеночная порфирия; – полное или неполное сочетание бронхиальной астмы, рецидивирующего полипоза носа и околоносовых пазух и непереносимости ацетилсалициловой кислоты или других нестероидных противовоспалительных препаратов. – беременность и период грудного вскармливания. 	<p>сердечного ритма;</p> <ul style="list-style-type: none"> – повышенное артериальное давление; – глаукома; – алкогольное опьянение; – высокая активность ферментов цитохрома P450 (CYP2D6); – детский возраст до 12 лет; – дети и подростки в возрасте от 12 до 18 лет при наличии патологии органов дыхания (например, бронхиальная астма и другие хронические заболевания дыхательных путей), после перенесенной тонзиллэктомии и/или аденоидэктомии с нарушением респираторной функции, включая нейромышечные нарушения; – тяжелые заболевания сердца; – множественные травмы или обширные хирургические вмешательства. – злоупотребление опиоидами, транквилизаторами, седативными препаратами в анамнезе; – печеночная порфирия; – полное или неполное сочетание бронхиальной астмы, рецидивирующего полипоза носа и околоносовых пазух и непереносимости ацетилсалициловой кислоты или других нестероидных противовоспалительных препаратов. – беременность и период грудного вскармливания.



Заместитель генерального директора
по инновационному развитию



С.И. Марченко

С.И. Марченко

145973