

## ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению препарата  
(информация для специалистов)

### ПРОКСОФЕЛИН

**Регистрационный номер:** ЛСР-002629/07

**Торговое название препарата:** Проксофелин

**Группировочное название:** Бутиламиногидроксипропоксифеноксиметил метилоксадиазол+Клонидин.

**Лекарственная форма:** капли глазные.

**Состав.** 1 мл раствора содержит:

Действующие вещества:

бутиламиногидроксипропоксифеноксиметил метилоксадиазола - 10,00 мг,  
гидрохлорид  
клонидина гидрохлорид (клофелин) - 2,50 мг

Вспомогательные вещества:

бензетония хлорид - 0,10 мг,  
натрия хлорид - 6,00 мг,  
лимонной кислоты моногидрат (или лимонная кислота - 0,33 мг,  
в пересчете на лимонной кислоты моногидрат)  
натрия цитрата дигидрат - 5,34 мг,  
эквивалентный 6,49 мг натрия цитрата пентасесквигидрата,  
вода для инъекций - до 1 мл.

**Описание:** Прозрачная бесцветная или слегка окрашенная жидкость

**Фармакотерапевтическая группа:** противоглаукомное средство.

**Код АТХ:** S01EX.

#### **Фармакологические свойства**

Комбинированный препарат, оказывает противоглаукомное действие. Клонидин и бутиламиногидроксипропоксифеноксиметил метилоксадиазол снижают внутриглазное давление за счет уменьшения продукции водянистой влаги и увеличения ее оттока. Эффект наступает через 15-30 мин после инстилляций, достигает максимума через 2-6 часов и сохраняется 24 часа. Не оказывает влияния на аккомодацию, рефракцию и величину зрачка.

#### **Показания к применению**

Проксофелин применяют для снижения внутриглазного давления у больных различными формами глаукомы (открытоугольной, закрытоугольной, вторичной) в случае недостаточного эффекта монотерапии проксодололом или клофелином. При закрытоугольной глаукоме препарат применяют в комбинации с миотиками.

### **Противопоказания**

- индивидуальная повышенная чувствительность к компонентам препарата;
- бронхиальная астма;
- хроническая обструктивная болезнь легких;
- хроническая сердечная недостаточность;
- брадикардия;
- атриовентрикулярная блокада II-III ст.;
- артериальная гипотензия;
- беременность;
- детский возраст (достаточного опыта применения препарата у детей нет).

### **С осторожностью**

Сахарный диабет 1 типа, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки.

### **Применение при беременности и в период лактации**

В период беременности необходимо сопоставлять пользу для матери и риск для плода и новорожденного. Неизвестно, проникает ли препарат в грудное молоко, поэтому в период лактации, на время лечения, рекомендуется отменить грудное вскармливание.

### **Способ применения и дозы:**

Препарат закапывают в конъюнктивальный мешок глаза по 1 капле 2 раза в сутки. Применяют в виде монотерапии и в сочетании с пилокарпином, который закапывают 1-3 раза в сутки.

### **Побочное действие:**

В единичных случаях возможны: снижение артериального давления, замедление сердечного ритма, сухость во рту, сонливость, слабость, головокружение, но в меньшей степени, чем от применения одного клофелина.

### **Взаимодействие с другими лекарственными препаратами**

Сочетанное применение с 1 % раствором пилокарпина вызывает дополнительный гипотензивный эффект на уровень внутриглазного давления (ВГД).

При одновременном назначении системных альфа или бета-блокаторов возможно усиление гипотензивного действия.

### **Особые указания:**

В период лечения препаратом не рекомендуется ношение мягких контактных линз. При использовании жёстких линз следует снять их перед закапыванием и вновь надеть через 15-20 минут после инстилляцией препарата.

Пациентам, у которых после инстилляцией временно теряется чёткость зрения, не рекомендуется водить машину или работать со сложной техникой, станками или каким-либо другим сложным оборудованием, требующим чёткости зрения сразу после закапывания препарата.

Тюбик-капельницы необходимо закрывать после каждого использования. Не следует прикасаться кончиком тюбик-капельницы к глазу.

### **Форма выпуска**

Капли глазные.

1,5 мл или 5 мл в тюбик-капельницы полимерные.

По 1, 2, 4, 5 или 10 тюбик-капельниц с инструкцией по применению препарата помещают в пачку из картона.

На пачку наносят текст и графическое изображение (пиктограммы) инструкции по применению тюбик-капельницы.

5 мл или 10 мл во флакон-капельницы полимерные.

По 1 или 2 флакон-капельницы с инструкцией по применению препарата помещают в пачку из картона.

На пачку наносят текст и графическое изображение (пиктограммы) инструкции по применению флакон-капельницы.

### **Условия хранения**

В защищенном от света месте при температуре не выше 15 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

**Срок годности** 2 года.

Срок годности препарата после вскрытия - 1 месяц.

Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.

### **Условия отпуска**

Отпускают по рецепту.

### **Производитель:**

Федеральное государственное унитарное предприятие «Московский эндокринный завод»

*Производство готовой лекарственной формы:*

г. Москва, ул. Новохоловская, д. 25, стр. 2

*Выпускающий контроль качества:*

г. Москва, ул. Новохоловская, д. 25, стр. 1

**Владелец регистрационного удостоверения/наименование, адрес организации, принимающей претензии потребителя:**

Федеральное государственное унитарное предприятие «Московский эндокринный завод»

Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 25

Тел./факс: (495) 678-00-50/911-42-10

<http://www.endopharm.ru>