

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Прозерин

раствор для внутривенного и подкожного введения, 0,5 мг/мл

ОАО «Новосибхимфарм», Россия

Изменение № 2

Дата внесения Изменения « » **080414** 20 г.

Старая редакция	Новая редакция
<p>Лекарственная форма: раствор для внутривенного и подкожного введения</p> <p>Способ применения и дозы</p> <p>Препарат обычно назначают подкожно. Взрослым под кожу вводят по 0,5 мг (1 мл 0,05% раствора) 1-2 раза в день, максимальная разовая доза - 2 мг, суточная - 6 мг.</p> <p>При развитии миастенического криза у взрослых препарат вводят внутривенно (с 0,9 % раствором натрия хлорида) - 0,5-1 мл раствора 0,5 мг/мл, затем под кожу в обычных</p>	<p>Лекарственная форма: раствор для инъекций</p> <p>Способ применения и дозы</p> <p>Подкожно, внутримышечно, внутривенно.</p> <p>Взрослым обычно назначают под кожу по 0,5 мг (1 мл раствора) Прозерина 1-2 раза в день, максимальная разовая доза - 2 мг, суточная - 6 мг.</p> <p>При развитии миастенического криза у взрослых препарат вводят внутривенно (с 0,9 % раствором натрия хлорида) - 0,25-0,5 мг</p>

Старая редакция	Новая редакция
<p>дозах с небольшими интервалами.</p> <p>Для потенцирования действия неостигмина метилсульфата иногда вводят под кожу дополнительно эфедрин – 1 мл 5 % раствора.</p> <p>Лечение миастении проводят длительно. При других заболеваниях курс лечения продолжается 25-30 дней, при необходимости курс лечения повторяют после 3-4 недельного перерыва.</p> <p>При слабости родовой деятельности можно вводить препарат под кожу по 0,5 мг (1 мл раствора 0,5 мг/мл) 1-2 раза с промежутками 1 час, одновременно с первой инъекцией вводят однократно под кожу 1 мг (1 мл 0,1 % раствора) атропина. При применении препарата для купирования действия миорелаксантов предварительно вводят атропина сульфат внутривенно в дозе 0,5-0,7 мг (0,5-0,7 мл 0,1 % раствора), ожидают учащения пульса и через 1,5-2 минуты вводят внутривенно 1,5 мг (3 мл раствора 5 мг/мл) препарата.</p>	<p>(0,5-1 мл раствора) Прозерина, затем под кожу в обычных дозах с небольшими интервалами.</p> <p>Лечение миастении проводят длительно.</p> <p>При других заболеваниях курс лечения продолжается 25-30 дней, при необходимости курс лечения повторяют после 3-4 недельного перерыва.</p> <p>Для стимулирования родов можно вводить под кожу по 0,5 мг (1 мл раствора) Прозерина 1-2 раза с промежутками 1 час, одновременно с первой инъекцией вводят однократно под кожу 1 мг (1 мл 0,1 % раствора) атропина.</p> <p>При применении препарата для купирования действия недеполяризующих миорелаксантов предварительно вводят атропин внутривенно в дозе 0,5-0,7 мг (0,5-0,7 мл 0,1 % раствора), ожидают учащения пульса и через 1,5-2 минуты вводят внутривенно 1,5 мг (3 мл раствора 0,5 мг/мл) препарата. Если эффект этой дозы</p>

Старая редакция	Новая редакция
<p>Если эффект этой дозы оказался недостаточным, вводят повторную такую же дозу препарата (при появлении брадикардии делают дополнительную инъекцию атропина). Всего можно ввести 5-6 мг (10-12 мл раствора 0,5 мг/мл) препарата в течение 20-30 минут.</p> <p>Лечение задержки мочи - подкожно 0.5 мг (1 мл раствора) 1-3 раза с промежутками час, если в течение часа моча не отходит, проводят катетеризацию и после опорожнения мочевого пузыря вводят каждые 3 часа, всего 5 инъекций. Для профилактики послеоперационной атонии кишечника и мочевого пузыря подкожно вводят по 0,25 мг (0,5 мл раствора).</p> <p>У детей применяют только при миастении gravis (только в условиях стационара!) подкожно по 0,05 мг (0,1 мл 0,05% раствора) на 1 год жизни в день, но не более 3,75 мг (0,75 мл 0,05% раствора) на одну инъекцию.</p> <p>Обычно детям препарат назначают</p>	<p>оказался недостаточным, вводят повторную такую же дозу препарата (при появлении брадикардии делают дополнительную инъекцию атропина). Всего можно ввести 5-6 мг (10-12 мл раствора 0,5 мг/мл) препарата в течение 20-30 минут.</p> <p>При послеоперационной атонии кишечника, мочевого пузыря: для профилактики, в т.ч. послеоперационной задержки мочи – подкожно или внутримышечно по 0,25 мг (0,5 мл раствора) Прозерина, как можно раньше после операции, и повторно каждые 4-6 часов в течение 3 дней; лечение задержки мочи – подкожно или внутримышечно 0,5 мг (1 мл раствора) Прозерина; если в течение 1 ч диурез не восстанавливается, проводят катетеризацию и после опорожнения мочевого пузыря вводят каждые 3 ч, всего 5 инъекций.</p> <p>У детей применяют только при миастении gravis (только в условиях стационара!) подкожно или внутримышечно по 0,05 мг</p>

Старая редакция	Новая редакция
<p>один раз в сутки, однако при необходимости суточную дозу можно разделить на два-три приема.</p>	<p>(0,1 мл 0,5 мг/мл раствора) на 1 год жизни в день, но не более 3,75 мг (0,75 мл 0,5 мг/мл раствора) на одну инъекцию.</p> <p>Обычно детям препарат назначают один раз в сутки, однако при необходимости суточную дозу можно разделить на два-три приема.</p>
<p>Форма выпуска</p> <p>Раствор для внутривенного и подкожного введения 0,5 мг/мл.</p> <p>По 1 мл в ампулы нейтрального стекла.</p> <p>По 10 ампул с инструкцией по применению и ножом для вскрытия ампул или скарификатором ампульным помещают в коробку из картона.</p> <p>По 5 или 10 ампул помещают в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной или ленты полиэтилентерефталатной и фольги алюминиевой или бумаги с полиэтиленовым покрытием, или без фольги, или без бумаги.</p> <p>По 1 или 2 контурных ячейковых упаковки с инструкцией по</p>	<p>Форма выпуска</p> <p>Раствор для инъекций 0,5 мг/мл.</p> <p>По 1 мл в ампулы нейтрального стекла.</p> <p>По 10 ампул с инструкцией по применению и ножом для вскрытия ампул или скарификатором ампульным помещают в коробку из картона.</p> <p>По 5 или 10 ампул помещают в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной или ленты полиэтилентерефталатной и фольги алюминиевой или бумаги с полиэтиленовым покрытием, или без фольги, или без бумаги.</p> <p>По 1 или 2 контурные ячейковые упаковки с инструкцией по</p>

Старая редакция	Новая редакция
<p>применению и ножом для вскрытия ампул или скарификатором ампульным помещают в пачку из картона.</p> <p>При упаковке ампул с кольцом излома или точкой надлома нож для вскрытия ампул или скарификатор ампульный не вкладывают.</p>	<p>ампул или скарификатором ампульным помещают в пачку из картона.</p> <p>При упаковке ампул с кольцом излома или точкой надлома нож для вскрытия ампул или скарификатор ампульный не вкладывают.</p>

Генеральный директор
ОАО «Новосибхимфарм»



Шкатов С.Н

