

МИНЗДРАВ РОССИИ  
ЛСР-007080/08- 200122  
СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ  
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Доксициклин-Ферейн®

(торговое наименование лекарственного препарата)

Доксициклин

(международное непатентованное, или группировочное, или химическое наименование)

лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 100 мг

(лекарственная форма, дозировка)

ПАО «Брынцалов-А», Россия

(наименование фирмы-производителя, страна)

Изменение № 4

Дата внесения Изменения « \_\_\_ » 200122 20\_\_ г.

Старая редакция 1	Новая редакция 2
<p><b>Показания к применению</b></p> <p>Инфекционно- воспалительные заболевания, вызванные чувствительными к препарату микроорганизмами:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- инфекции дыхательных путей – бронхит острый и хронический, бронхопневмония, долевая пневмония, абсцесс легкого, эмпиема плевры;</li><li>- инфекции ЛОР-органов – отит, синусит;</li><li>- инфекции мочеполовой системы – цистит, пиелонефрит, простатит, уретрит, уретроцистит, эндометрит, эндоцервицит, острый орхидидимит;</li><li>- инфекции кожи и мягких тканей – флегмоны, абсцессы, фурункулез, инфициро-</li></ul>	<p><b>Показания к применению</b></p> <p>Инфекционно - воспалительные заболевания, вызванные чувствительными к доксициклину микроорганизмами:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- инфекции дыхательных путей, в том числе фарингит, бронхит острый, обострение хронической обструктивной болезни легких, трахеит, бронхопневмония, долевая пневмония, внебольничная пневмония, абсцесс легкого, эмпиема плевры;</li><li>- инфекции ЛОР-органов, в том числе отит, синусит, тонзиллит;</li><li>- инфекции мочеполовой системы: цистит, пиелонефрит, бактериальный про-</li></ul>

Старая редакция	Новая редакция
1	2
<p>ванные ожоги, раны;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- инфекционные заболевания глаз, сифилис, фрамбезия, иерсиниоз, легионеллез, риккетсиоз, хламидиоз различной локализации (в том числе простатит и проктит), лихорадка Ку, пятнистая лихорадка скалистых гор, тиф (в том числе сыпной, клещевой, возвратный), актиномикоз, малярия, лептоспироз, трахома, пситтакоз, орнитоз, гранулоцитарный эрлихиоз, дизентерия; бруцеллез, остеомиелит; сепсис, подострый септический эндокардит, перитонит;</li> <li>- профилактика послеоперационных гнойных осложнений.</li> </ul>	<p>статит, уретрит, уретроцистит, урогенитальный микоплазмоз, острый орхидидимит, эндометрит, эндоцервицит и сальпингоофорит в составе комбинированной терапии; в том числе инфекции, передающиеся половым путем: урогенитальный хламидиоз, сифилис у пациентов с непереносимостью пенициллинов, неосложненная гонорея (как альтернативная терапия), паховая гранулема, венерическая лимфогранулема;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- инфекции желудочно-кишечного тракта и желчевыводящих путей (холера, иерсиниоз, холецистит, холангит, гастроэнтероколит, бациллярная и амебная дизентерия);</li> <li>- инфекции кожи и мягких тканей (включая раневые инфекции после укуса животных);</li> <li>- другие заболевания: фрамбезия, легионеллез, хламидиоз различной локализации (в том числе простатит и проктит), риккетсиоз, лихорадка Ку, пятнистая лихорадка Скалистых гор, тиф (в том числе сыпной, клещевой возвратный), болезнь Лайма (I ст. – <i>erythema migrans</i>), туляремия, чума, актиномикоз, малярия; инфекционные заболевания глаз, в составе комбинированной терапии - лептоспироз, трахома, пситтакоз, орнитоз, сибирская язва (в том числе легочная фор-</li> </ul>
<p><b>Противопоказания</b></p>	
<p>Гиперчувствительность, порфирия, тяжелая печеночная недостаточность, лейкопения, беременность (II-III триместры), период лактации, детский возраст, (до 12 лет – возможность образования нерастворимых комплексов с кальцием с отложением в костном скелете, эмали и дентине зубов), миастения.</p>	
<p><b>С осторожностью</b></p>	
<p>Раздел отсутствовал.</p>	



Старая редакция	Новая редакция
1	2
	<p>ма), бартонеллез, гранулоцитарный эрлихиоз; коклюш; бруцеллез, остеомиелит; сепсис, подострый септический эндокардит, перитонит;</p> <p>- профилактика послеоперационных гнойных осложнений.</p> <p><b>Противопоказания</b></p> <p>Гиперчувствительность к доксициклину, другим тетрациклинам или другим компонентам препарата; беременность; период грудного вскармливания; порфирия, тяжелые нарушения функции печени и/или почек; лейкопения, детский возраст до 8 лет (возможность образования нерастворимых комплексов с ионами кальция (Ca<sup>2+</sup>) с отложением в костном скелете, эмали и дентине зубов).</p> <p><b>С осторожностью</b></p> <p>Печеночная и почечная недостаточность легкой и средней тяжести, одновременное применение с гепатотоксичными препаратами, псевдопаралитическая миастения (<i>Myasthenia gravis</i>).</p>

Начальник отдела регистрации  
лекарственных препаратов  
ПАО «Брынцалов-А»



Е.И. Осипова