


МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Дицинон
таблетки 250 мг
Лек д.д., Словения



Изменение № 1

Дата внесения Изменения « » 170214 20 г.


СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ	НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
С осторожностью Тромбоз, тромбоэмболия в анамнезе; кровотечения на фоне передозировки антикоагулянтов.	С осторожностью Тромбоз, тромбоэмболия в анамнезе; кровотечения на фоне передозировки антикоагулянтов, нарушение функции печени и почек (отсутствует клинический опыт применения).
Способ применения и дозы Внутрь. Оптимальная суточная доза этамзилата для взрослых составляет 10-20 мг/кг массы тела в сутки, разделенные на 3 - 4 приема. В большинстве случаев разовая доза составляет 250-500 мг (1-2 таблетки), при необходимости разовая доза может быть увеличена до 750 мг (3 таблетки).	Способ применения и дозы Внутрь. Оптимальная суточная доза этамзилата для взрослых составляет 10-20 мг/кг массы тела в сутки, разделенные на 3 - 4 приема. В большинстве случаев разовая доза составляет 250-500 мг (1-2 таблетки), при необходимости разовая доза может быть увеличена до 750 мг (3 таблетки).
<u>Взрослым и подросткам (старше 12 лет, весом более 40 кг)</u> <i>В предоперационном периоде 250 - 500 мг</i>	<u>Взрослым и подросткам (старше 12 лет, весом более 40 кг)</u> <i>В предоперационном периоде 250 - 500 мг</i>

(1-2 таблетки) за 1 час до операции. <i>В послеоперационном периоде</i> по 250 - 500 мг (1-2 таблетки) каждые 4-6 часов до исчезновения риска развития кровотечения. <i>Для остановки кровотечения</i> по 500 мг (2 таблетки) каждые 8-12 часов (1000 – 1500 мг в сутки) с едой или небольшим количеством воды. <i>При лечении метро- и меноррагий</i> по 500 мг (2 таблетки) 3 раза в сутки (1500 мг в сутки) в течение 5-10 дней. <u>Дети</u> Половина дозы для взрослых. Клинических исследований по применению препарата Дицинон у пациентов с нарушением функции печени и почек не проводилось, поэтому следует соблюдать осторожность при применении этамзилата у данной категории пациентов. Особые указания Перед началом лечения следует исключить другие причины кровотечения. Препарат не эффективен у больных с тромбоцитопениями. При геморрагических осложнениях, связанных с передозировкой антикоагулянтов, рекомендуется использовать специфические антидоты. Применение препарата Дицинон у пациентов с нарушенными показателями свертывающей системы крови возможно, но оно должно быть дополнено введением препаратов, устраняющих выявленный	(1-2 таблетки) за 1 час до операции. <i>В послеоперационном периоде</i> по 250 - 500 мг (1-2 таблетки) каждые 4-6 часов до исчезновения риска развития кровотечения. <i>Для остановки кровотечения</i> по 500 мг (2 таблетки) каждые 8-12 часов (1000 – 1500 мг в сутки) с едой или небольшим количеством воды. <i>При лечении метро- и меноррагий</i> по 500 мг (2 таблетки) 3 раза в сутки (1500 мг в сутки) в течение 5-10 дней. <u>Детям от 3 до 12 лет</u> Половина дозы для взрослых. Особые указания Перед началом лечения следует исключить другие причины кровотечения. Препарат не эффективен у больных с тромбоцитопениями. При геморрагических осложнениях, связанных с передозировкой антикоагулянтов, рекомендуется использовать специфические антидоты. Применение препарата Дицинон у пациентов с нарушенными показателями свертывающей системы крови возможно, но оно должно быть дополнено введением препаратов, устраняющих выявленный
--	---

Изменение №1 к Инструкции по применению С.3 из 3

дефицит или дефект факторов свертывающей системы крови. Специальных мер предосторожности при уничтожении неиспользованного лекарственного препарата не требуется.	дефицит или дефект факторов свертывающей системы крови. Клинических исследований по применению препарата Дицинон у пациентов с нарушением функции печени и почек не проводилось, поэтому следует соблюдать осторожность при применении этамзилата у данной категории пациентов. Специальных мер предосторожности при уничтожении неиспользованного лекарственного препарата не требуется.
--	---

Руководитель отдела регистрации



Мравинец Барбара