

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата
МИКОЗОН®

Регистрационный номер:

Торговое название препарата: Микозон®

Международное непатентованное название: Миконазол

Лекарственная форма: крем для наружного применения

Состав

В 1 г крема содержится:

Активное вещество: миконазола нитрат - 20 мг

Вспомогательные вещества: пропиленгликоль, парафин мягкий белый, цетостеарилловый спирт, цетомacroгол 1000, парафин светлый жидкий, динатрия эдетат, натрия гидрофосфат, хлорокрезол, вода очищенная.

Описание

Белый или почти белый однородный крем, со специфическим запахом, не содержащий инородных частиц.

Фармакотерапевтическая группа: Противогрибковое средство

Код АТХ: [D01AC02]

Фармакологические свойства

Миконазол оказывает противогрибковое действие. Тормозит синтез эргостерола, изменяет липидный состав и проницаемость клеточной стенки. Активен в отношении дерматофитов дрожжевых и других грибов. Проявляет противомикробную активность в отношении грамположительных микроорганизмов.

Фармакокинетика: При местных аппликациях в крови обнаруживается только незначительное число метаболитов. Быстро разрушается в печени, выводится через почки 14-22% дозы в виде неактивных производных.

Показания к применению

Дерматомикозы, вызванные грибами, чувствительными к препарату (в т.ч. при вторичном инфицировании грамположительными микроорганизмами).

Противопоказания

Гиперчувствительность к компонентам препарата.

С осторожностью - сахарный диабет, нарушение микроциркуляции.

Применение во время беременности и в период лактации.

При местном применении миконазол не всасывается. Препарат можно использовать во время беременности и в период грудного вскармливания.



Способ применения и дозы

Наружно. Крем наносят на вымытую и тщательно высушенную кожу, слегка втирая в пораженные участки 2 раза в день (утром и вечером). При необходимости применяют окклюзионную повязку.

Лечение продолжают до полного исчезновения симптомов и в течение нескольких последующих дней для предупреждения рецидивов. В процессе терапии проводят микологический контроль, результаты которого и определяют продолжительность лечения (обычно его длительность - 2-6 недели).

Побочное действие.

При гиперчувствительности к компонентам препарата, отмечаются местные аллергические реакции – покраснение кожи, ощущения жжения и покалывания на месте применения препарата; в редких случаях – крапивница, отек, сыпь, эритема.

Передозировка.

Применение препарата в повышенных дозах не вызывает каких-либо реакций и состояний, опасных для жизни.

В случае непредусмотренного применения препарата (внутри) возможны следующие симптомы: анорексия, тошнота, рвота, гастралгии, нарушение функции печени; редко – сонливость, галлюцинации, поллакиурия, кожные аллергические реакции.

Специфического антидота нет. Необходимо назначать внутрь активированный уголь. При необходимости лечение симптоматическое.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Усиливает действие непрямых антикоагулянтов, пероральных гипогликемических лекарственных средств, фенитоина.

Особые указания

В случае если у пациента наблюдается раздражение кожных покровов, либо развивается повышенная чувствительность (проявляются аллергические реакции) в ходе применения данного лекарственного средства, лечение следует прекратить и назначить курс соответствующей терапии.

Не рекомендуется применение крема свыше 4-х недель.

Только для наружного применения.

Не допускать попадания препарата в глаза.

Форма выпуска. *Крем для наружного применения 2%.*

По 15 г. крема в алюминиевой тубе, тубу вместе с инструкцией по применению помещают в картонную пачку.

Срок годности

3 года. Не использовать по истечении срока годности указанного на упаковке.

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.



Производитель

«Аджио Фармацевтикалз Лтд.»,

А-38, Найджиот Инд. Эстейт, Курла-Андхери Роуд, Сейфдпул, Мумбаи- 400 072, Индия

Претензии потребителей направлять по адресу:

117105, г.Москва, Нагорный проезд, 12 В,

Тел./факс (495)502-90-01; 514-18-11

Уполномоченный представитель
«Аджио Фармацестикалз Лтд.»



С.В.Журавлева

Директор ИДКЭЛС



С.В.Буданов