

МИНЗДРАВ РОССИИ

ЛП 000479-230920

СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ
ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Квинизол

торговое наименование лекарственного препарата

раствор для инфузий 5 мг/мл
лекарственная форма, дозировка

Ви-Эм-Джи Фармасьютикалз Pvt. Лтд, Индия
наименование производителя, страна

Изменение № 2

Дата внесения Изменения « _____ » 230920 20__ г.

Старая редакция	Новая редакция
ИНСТРУКЦИЯ По применению лекарственного препарата для медицинского применения КВИНИЗОЛ	ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА Квинизол
Описание: прозрачные бесцветный раствор	Описание: прозрачный бесцветный раствор
Способ применения и дозы Внутривенное введение орнидазола показано при тяжелом течении ин- фекции, а также при отсутствии возможности приема препарата внутри.	Способ применения и дозы Внутривенное введение орнидазола показано при тяжелом течении ин- фекции, а также при отсутствии возможности приема препарата внутри.

Старая редакция	Новая редакция
<p>Скорость внутривенного капельного введения 5 мл в минуту. Интервал между введениями – 12 часов.</p> <p>Длительность курса лечения определяется индивидуально, в зависимости от клинического состояния. По показаниям, в зависимости от характера инфекции, как можно раньше осуществляют переход на поддерживающую терапию пероральными формами орнидазола.</p> <p>При кишечном амебиазе и амебном абсцессе печени: взрослым – начальная доза 500 мг – 1 г, с последующим переходом на введение в дозе 500 мг каждые 12 часов. Детям: 2—30 мг/кг/сут. Курс лечения – 3-6 дней.</p> <p>Анаэробные бактериальные инфекции: взрослые – начальная доза 500 мг – 1 г, с последующим переходом на введение 500 мг каждые 12 часов. Детям: 10 мг/кг каждые 12 ч. Курс лечения 5-10 дней.</p> <p>Профилактика инфекции, вызванных анаэробными бактериями – 500</p>	<p>Скорость внутривенного капельного введения 5 мл в минуту. Интервал между введениями – 12 часов.</p> <p>Длительность курса лечения определяется индивидуально, в зависимости от клинического состояния. По показаниям, в зависимости от характера инфекции, как можно раньше осуществляют переход на поддерживающую терапию пероральными формами орнидазола.</p> <p>При кишечном амебиазе и амебном абсцессе печени: взрослым – начальная доза 500 мг – 1 г, с последующим переходом на введение в дозе 500 мг каждые 12 часов. Детям: 2—30 мг/кг/сут. Курс лечения – 3-6 дней.</p> <p>Анаэробные бактериальные инфекции: взрослые – начальная доза 500 мг – 1 г, с последующим переходом на введение 500 мг каждые 12 часов. Детям: 10 мг/кг каждые 12 ч. Курс лечения 5-10 дней.</p> <p>Профилактика инфекций, вызванных анаэробными бактериями – 500</p>

Старая редакция	Новая редакция
мг – 1 г за 30 мин до операции.	мг – 1 г за 30 мин до операции.
<p>Условия хранения</p> <p>В сухом, защищенно от света месте при температуре не выше 25°C.</p> <p>Хранить в недоступном для детей месте.</p>	<p>Условия хранения</p> <p>В сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25° С.</p> <p>Не замораживать.</p> <p>Хранить в недоступном для детей месте.</p>
<p>Претензии потребителей направлять по адресу:</p> <p>ООО «АРС», 127560, г. Москва, ул. Плещеева, д. 14а</p>	<p>Претензии потребителей направлять по адресу:</p> <p>ООО «АРС», Россия 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12, этаж 27, комната 17 тел. +7 (495) 374 62 84</p> <p><i>О развитии нежелательных реакций, связанных с приёмом препарата, сообщать:</i></p> <p>Тел.: 8-800-333-0435 Факс: +7 (499) 638 23 00</p>

Представитель компании



Куриленко М.П.