

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА  
**Интерфаст**

**Регистрационный номер:**

**Торговое наименование:** Интерфаст

**Международное непатентованное или группировочное наименование:** саквинавир

**Лекарственная форма:** таблетки, покрытые пленочной оболочкой

**Состав**

Состав на 1 таблетку

*Действующее вещество*

Саквинавир - 500,0 мг

(в виде саквинавира мезилата - 571,5 мг)

*Вспомогательные вещества*

Ядро: гипромеллоза - 4,0 мг, карбоксиметилкрахмал натрия (примогель) - 45,0 мг, коповидон - 38,0 мг, кремния диоксид коллоидный (аэросил марка А-300) - 10,0 мг, кроскармеллоза натрия - 38,0 мг, магния стеарат - 8,0 мг, полисорбат 80 (твин-80) - 3,5 мг, целлюлоза микрокристаллическая - 92,0 мг.

Готовая водорастворимая пленочная оболочка - 15,0 мг

(Состав оболочки: гидроксипропилметилцеллюлоза (гипромеллоза) - 11,13 мг, полиэтиленгликоль 6000 (макрогол 6000) - 2,145 мг, титана диоксид - 0,525 мг, тальк - 0,345 мг, краситель железа оксид красный - 0,21 мг, краситель железа оксид желтый - 0,645 мг).

**Описание**

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, двояковыпуклые, овальной формы, от светло-коричневого до коричневого цвета. На поперечном разрезе таблетка белого или белого с желтоватым оттенком цвета.

**Фармакотерапевтическая группа:** противовирусные средства системного действия; противовирусные средства прямого действия; ингибиторы протеаз.

**Код ATX:** J05AE01

**Фармакологические свойства**

**Фармакодинамика**

*Механизм действия*

Антиретровирусный препарат, ингибитор протеазы ВИЧ.

Протеаза ВИЧ является важнейшим вирусным ферментом, необходимым для процесса специфического расщепления вирусных структурных полипептидов Gag и Gag-Pol. Эти вирусные полипептиды содержат участок расщепления, который распознается только протеазой ВИЧ и близкородственными вирусными протеазами.

Саквинавир – пептидоподобный структурный аналог этих участков расщепления – является селективным и обратимым ингибитором протеазы ВИЧ, предотвращает образование полноценных инфекционных вирусных частиц.

#### *Антивирусная активность *in vitro**

Саквинавир проявляет антивирусную активность как в отношении лабораторных штаммов, так и клинических изолятов ВИЧ-1 с типичными значениями EC<sub>50</sub> и EC<sub>90</sub> (концентрации, подавляющие 50% и 90% активности протеазы ВИЧ), варьирующими от 1 до 10 нмоль/мл и от 5 до 50 нмоль/мл, соответственно. Антивирусная активность саквинавира *in vitro* оценивалась на инфицированной линии Т-клеток и первичных человеческих культурах лимфоцитов и моноцитов. Антивирусная активность *in vitro* наблюдалась применительно к набору изолятов ВИЧ-1 группы М, кроме клэдов В (A, AE, C, D, G, H) и ВИЧ-2 со значениями EC<sub>50</sub> 0,3–2,5 нмоль/мл. В присутствии 50% человеческой сыворотки крови или альфа<sub>1</sub>-кислого гликопротеина (1 мг/мл) антивирусная активность саквинавира уменьшается в среднем в 25 и 14 раз, соответственно.

#### *Резистентность к саквинавиру*

##### *Противовирусная активность относительно исходного генотипа и фенотипа*

Генотипические и фенотипические клинические критерии, прогнозирующие клиническую эффективность саквинавира, усиленного ритонавиром, были получены после проведения ретроспективных анализов клинических исследований, а также анализа большой группы госпитализированных пациентов.

Было показано, что исходный фенотип относительно саквинавира (изменение чувствительности относительно эталона; тест PhenoSense) является прогностическим фактором вирусологического ответа. Первое уменьшение вирусологического ответа наблюдалось при уменьшении чувствительности более чем в 2,3 раза. Положительный вирусологический ответ не наблюдался при снижении чувствительности более чем в 12 раз.

Выявлено 9 кодонов протеазы (L10F/I/M/R/V, I15A/V, K20I/M/R/T, L24I, I62V, G73S/T, V82A/F/S/T, I84V, L90M), связанных с уменьшением вирусологического ответа на терапию саквинавиром в комбинации с ритонавиром (1000/100 мг 2 раза в день), у пациентов, ранее не принимавших саквинавир. Наличие 3 и более мутаций обуславливала сниженный ответ на терапию саквинавиром/ритонавиром.

Взаимосвязь между количеством данных мутаций, обуславливающих резистентность к саквинавиру, и вирусологическим ответом была подтверждена в ходе независимого клинического исследования, включающего популяцию пациентов, которые ранее получали более интенсивную терапию, в том числе 54% пациентов ранее получали саквинавир ( $p=0,0133$ , см. Таблицу 1). Мутация G48V, которая ранее была определена *in vitro* как мутация, характерная для саквинавира, присутствовала изначально у 3 пациентов. У всех этих пациентов ответа на терапию получено не было.

Таблица 1. Вирусологический ответ на саквинавир/ритонавир, стратифицированный по количеству исходных мутаций, обуславливающих резистентность к саквинавиру

Количество исходных мутаций, обуславливающих резистентность к саквинавиру*	Госпитализированные пациенты		Ретроспективный анализ КИ	
	N=138	Количество пациентов, не получавших ранее лечение саквинавиром	N=114	Количество пациентов, не получавших/получавших ранее лечение саквинавиром
		Изменение концентрации ВИЧ-1 РНК в плазме крови на <u>12–20 неделях</u> по сравнению с исходной		Изменение концентрации ВИЧ-1 РНК в плазме крови на <u>4 неделе</u> по сравнению с исходной
0	35	-2,24	2	-2,04
1	29	-1,88	3	-1,69
2	24	-1,43	14	-1,57
3	30	-0,52	28	-1,41
4	9	-0,18	40	-0,75
5	6	-0,11	17	-0,44
6	5	-0,30	9	0,08
7	0	-	1	0,24

\* Шкала мутаций, ассоциированных с саквинавиром: L10F/I/M/R/V, I15A/V, K20I/M/R/T, L24I, I62V, G73S/T, V82A/F/S/T, I84V, L90M

### Эффективность

Проводилось сравнение эффективности и безопасности терапии саквинавиром в мягких желатиновых капсулах в комбинации с ритонавиром (1000 мг/100 мг 2 раза в день) и двумя нуклеозидными (НИОТ) или ненуклеозидными ингибиторами обратной транскриптазы (ННИОТ) и терапии индинавиром в комбинации с ритонавиром (800 мг/100 мг 2 раза в день) и двумя НИОТ/ННИОТ у более чем 300 пациентов (получавших/не получавших лечение ингибитором протеазы ВИЧ ранее). Комбинация саквинавира с ритонавиром характеризовалась большей вирусологической активностью по сравнению с комбинацией индинавира и ритонавира, при этом смена назначенного лечения рассматривалась в качестве вирусологической неудачи (исследование 1).

Проводилось сравнение эффективности и безопасности терапии саквинавиром в мягких желатиновых капсулах в комбинации с ритонавиром (1000 мг/100 мг 2 раза в день) и двумя НИОТ/ННИОТ и терапии лопинавиром в комбинации с ритонавиром (400 мг/100

мг 2 раза в день) и двумя НИОТ/ННИОТ у 324 пациентов (получавших/не получавших лечение ингибитором протеазы ВИЧ ранее). Ни один пациент из группы терапии лопинавиром/ритонавиром не принимал лопинавир перед рандомизацией, в то время как 16 пациентов из группы приема саквинавира/ритонавира принимали саквинавир ранее (исследование 2).

Таблица 2. Демографические характеристики пациентов из проведенных исследований <sup>†</sup>

	Саквинавир/ ритонавир	Индинашивир/ ритонавир	Саквинавир/ ритонавир	Лопинавир/ ритонавир
	N=148	N=158	N=161	N=163
Пол (мужской)	82%	74%	81%	76%
Раса (европеоидная/ негроидная/ монголоидная) (%)	86/9/1	82/12/4	75/19/1	74/19/2
Возраст, медиана, лет	39	40	40	40
Стадия С (классификация CDC) (%)	32%	28%	32%	31%
Пациенты, не принимавшие ранее антиретровирусные препараты (%)	28%	22%	31%	34%
Пациенты, не принимавшие ранее ингибиторы протеазы ВИЧ (%)	41%	38%	48%	48%
Медиана исходного значения ВИЧ-1 РНК, log <sub>10</sub> копий/мл (разброс)	4.0 (1.7–5.1)	3.9 (1.7–5.2)	4.4 (3.1–5.1)	4.6 (3.5–5.3)
Медиана исходного числа клеток CD4 <sup>+</sup> , клеток/мм <sup>3</sup> (разброс)	272 (135–420)	280 (139–453)	241 (86–400)	239 (95–420)

<sup>†</sup> Данные получены из отчета клинических исследований

Таблица 3. Результаты терапии в проведенных исследованиях <sup>1</sup> (через 48 недель).

Результаты	Саквинавир/ ритонавир	Индинашивир/ ритонавир	Саквинавир/ ритонавир	Лопинавир/ ритонавир
Начато назначенное лечение, n (%)	148 (94%)	158 (99%)	161 (94%)	163 (98%)
Отменено назначенное лечение, n (%)	40 (27%)	64 (41%)	48 (30%)	23 (14%)
P=0.01			P=0.001	
Вирусологическая неудача у пациентов ITT/e <sup>*3</sup>	36/148 (24%)	41/158 (26%)	53/161 (33%)	29/163 (18%)
P=0.76			P=0.002	
Показатель пациентов с вирусной нагрузкой <50 копий/мл через 48 недель, ITT/e <sup>3</sup>	97/144 (67%)	106/154 (69%)	90/158 (57%)	106/162 (65%)
P>0.05 <sup>2</sup>			P=0.12	
Показатель пациентов с вирусной нагрузкой <50 копий/мл через 48 недель, пациенты, находящиеся на лечении	82/104 (79%)	73/93 (78%)	84/113 (74%)	97/138 (70%)
P>0.05 <sup>2</sup>			P=0.48	

Медиана увеличения числа CD4 клеток через 48 недель (клеток/мм <sup>3</sup> )	85	73	116	106
---	----	----	-----	-----

<sup>1</sup> Данные получены из отчета клинических исследований.

<sup>2</sup> Данные публикации исследования 1.

<sup>3</sup>ITT/e = все пациенты, включенные в исследование/подвергнутые лечению.

\* Для обоих исследований: для пациентов, включенных в исследование с вирусной нагрузкой <200 копий/мл, вирусологическая неудача определялась как ≥200 копий/мл. Исследование 1: для пациентов, включенных в исследование с вирусной нагрузкой ≥200 копий/мл, вирусологическая неудача определялась как любое увеличение ≥0.5 log и/или вирусная нагрузка ≥50000 копий/мл через 4 недели, ≥5000 копий/мл через 12 недель, или вирусная нагрузка ≥200 копий/мл через 24 недели и т.д. Исследование 2: любое увеличение ≥0.5 log на отдельном визите; 0.5 log снижение, если вирусная нагрузка ≥200 копий/мл через 4 недели; 1.0 log снижение от начального значения, если вирусная нагрузка ≥200 копий/мл через 12 недель; и вирусная нагрузка ≥200 копий/мл через 24 недели.

#### *Влияние на показатели ЭКГ*

Влияние препарата Интерфаст в комбинации с ритонавиром в дозах 1000/100 мг 2 раза в сутки (терапевтические дозы) и 1500/100 мг 2 раза в сутки (дозы, превышающие терапевтические) на интервал QT через 20 ч на 3-й день приема препарата изучалось в двойном слепом исследовании с 4-компонентным перекрестным дизайном, плацебо и активным контролем (моксифлоксацин 400 мг ежедневно) при участии здоровых добровольцев (мужского и женского пола) в возрасте от 18 до 55 лет (N=59).

Учитывая данные предыдущего 14-дневного фармакокинетического исследования с применением многократных доз, в котором максимальная фармакокинетическая экспозиция достигалась на 3-й день приема препарата, в качестве точки для проведения оценки был выбран 3-й день. Средние значения C<sub>max</sub> при приеме препарата Интерфаст в комбинации с ритонавиром в дозах 1000/100 мг 2 раза в сутки и 1500/100 мг 2 раза в сутки на 3-й день исследования у здоровых добровольцев были примерно в 3 и 4 раза выше, соответственно, чем средние значения C<sub>max</sub> в равновесном состоянии при приеме препарата Интерфаст в комбинации с ритонавиром в дозе 1000/100 мг 2 раза в сутки у ВИЧ-инфицированных пациентов.

В проведенном исследовании для адекватной оценки изменений интервала QT в различных группах использовался специфичный для данного исследования показатель QTcS (интервал QT, скорректированный относительно исходных значений, полученных до начала приема препарата (dense predose-baseline correction), и в зависимости от ЧСС (подобно поправке Fridericia)).

На 3-й день верхняя граница одностороннего 95% доверительного интервала для максимального значения средней разницы показателей QTcS между обеими группами приема активного вещества (Интерфаст в комбинации с ритонавиром в терапевтических дозах и дозах, превышающих терапевтические) и группой плацебо составила >10

миллисекунд (мсек) (см. Таблицу 4). Было выявлено, что препарат Интерфаст в комбинации с ритонавиром в дозах, превышающих терапевтические, оказывает более значимое воздействие на интервал QT по сравнению с терапевтическими дозами. У большинства участников исследования (89% пациентов при приеме терапевтических доз и 80% пациентов, получавших препараты в дозах, превышавших терапевтические) QTcS был <450 мсек, и ни у одного участника интервал QTc не был >500 мсек (см. также раздел «Особые указания»).

Таблица 4. Показатель максимального среднего значения ddQTcS<sup>†</sup> (мсек) на 3-й день для терапии препаратом Интерфаст в комбинации с ритонавиром в терапевтических дозах, в дозах, превышающих терапевтические, и для активного контроля (моксифлоксацин) у здоровых добровольцев.

Лечение	Временная точка оценки после приема препарата	Показатель максимального среднего значения ddQTcS	Стандартная ошибка	Верхняя граница 95% ДИ для ddQTcS
Интерфаст/ритонавир 1000/100 мг 2 раза в сутки	12 ч	18.86	1.91	22.01
Интерфаст/ритонавир 1500/100 мг 2 раза в сутки	20 ч	30.22	1.91	33.36
Моксифлоксацин <sup>^</sup>	4 ч	12.18	1.93	15.36

<sup>†</sup>Выведенная разница между показателями QTcS (интервал QT, скорректированный относительно исходных значений, полученных до начала приема препарата, специфичный для данного исследования) в группе, получавших активное лечение, и в группе плацебо.

<sup>^</sup>Прием 400 мг только на 3-й день.

Примечание: в исследовании показатель QTcS для мужчин рассчитывался по формуле QT/RR<sup>0.319</sup>, а для женщин - QT/RR<sup>0.337</sup>, что соответствует поправке Fridericia (QTcF=QT/RR<sup>0.333</sup>).

В данном исследовании на 3-й день удлинение интервала PR>200 мсек наблюдалось у 40% пациентов, получавших препарат Интерфаст/ритонавир в дозе 1000/100 мг 2 раза в сутки, и у 47% пациентов, получавших препарат Интерфаст/ритонавир в дозе 1500/100 мг 2 раза в сутки. У 3% пациентов, получавших моксифлоксацин в качестве активного контроля, и у 5% пациентов из группы плацебо наблюдалось удлинение PR>200 мсек. Максимальное значение среднего изменения интервала PR по сравнению с показателем до начала приема препаратов составило 25 мсек в группе, получавших препарат Интерфаст/ритонавир в дозе 1000/100 мг 2 раза в сутки, и 34 мсек в группе, получавших препарат Интерфаст/ритонавир в дозе 1500/100 мг 2 раза в сутки (см. также раздел «Особые указания»).

Случаев «пирамидной» тахикардии (torsades de pointes) и удлинения интервала QT>500 мсек в исследовании не наблюдалось. У некоторых пациентов нельзя исключить связь между развитием синкопе или пресинкопального состояния и удлинением интервала PR.

Клиническое значение данных изменений, наблюдавшихся у здоровых добровольцев, не известно для ВИЧ-инфицированных пациентов, получающих препарат Интерфаст/ритонавир, однако следует избегать увеличения дозы препарата Интерфаст/ритонавир более 1000/100 мг 2 раза в сутки.

Результаты изучения влияния препарата Интерфаст на интервал QT, фармакокинетику и вирусную нагрузку у ВИЧ-инфицированных пациентов, ранее не получавших терапию и начинающих лечение препаратом Интерфаст/ритонавир с использованием модифицированного режима дозирования (препарат Интерфаст/ритонавир в дозе 500/100 мг 2 раза в сутки в комбинации с двумя нуклеозидными ингибиторами обратной транскриптазы в течение 7 дней с последующим увеличением дозы до 1000/100 мг 2 раза в сутки в комбинации с двумя нуклеозидными ингибиторами обратной транскриптазы в течение 7 дней), показали, что увеличение интервала QT менее выражен при условии изменения режима дозирования. Доля пациентов с удлинением интервала PR>200 мсек варьировалась от 14% на 3 день терапии до 38% на 14 день терапии. При приеме препарата Интерфаст с ритонавиром в модифицированном режиме дозирования благодаря эффекту улучшения фармакокинетики саквинавира в первую неделю экспозиция саквинавира достигала максимума на 3 день терапии и уменьшалась до минимального значения на 7 день.

Последовательное снижение уровня ВИЧ-РНК наблюдалось у всех пациентов, получавших препарат Интерфаст/ритонавир в модифицированном режиме дозирования в течение 2-х недельного периода лечения и ранее не получавших терапию, что свидетельствует о подавлении вируса. Долгосрочная эффективность при модифицированном режиме дозирования не изучалась.

#### *Доклинические данные по безопасности*

##### *Канцерогенность*

Не было выявлено никакой канцерогенной активности саквинавира при введении препарата крысам и мышам на протяжении 2-х лет. Экспозиция саквинавира в плазме (AUC) у этих особей равнялась примерно 37% и 85% экспозиции саквинавира у людей при приеме препарата Интерфаст и ритонавира в дозах 1000/100 мг 2 раза в день.

##### *Мутагенность*

В исследованиях *in vitro* на мутагенность и генотоксичность (при необходимости - с метаболической активацией) было показано, что саквинавир не оказывает мутагенной активности как на бактериальные клетки (тест Эймса), так и на клетки млекопитающих (клетки легких китайских хомячков V79/HPRT-тест с гипоксантингуанинфосфорибозилтрансферазой). Саквинавир не вызывает хромосомных

мутаций *in vivo* (микроядерный тест на мышах) или *in vitro* в человеческих лимфоцитах, а также не вызывает первичного повреждения ДНК *in vitro* (репаративный синтез ДНК).

#### *Влияние на фертильность*

В исследованиях на крысах не было обнаружено отрицательного влияния на репродуктивную функцию и фертильность при значениях экспозиции препарата (AUC), составляющих приблизительно 33% от экспозиции у людей при приеме саквинавира в комбинации с ритонавиром в рекомендованных дозах 1000/100 мг 2 раза в день.

#### *Тератогенность*

В исследованиях на крысах и кроликах не наблюдалось эмбриотоксического или тератогенного влияния саквинавира при значениях экспозиции препарата (AUC), составляющих приблизительно 32% от экспозиции у людей при приеме саквинавира в комбинации с ритонавиром в рекомендованных дозах 1000/100 мг 2 раза в день.

#### *Фармакокинетика*

##### *Всасывание*

При приеме однократной дозы препарата 600 мг после приема высококалорийной пищи абсолютная биодоступность саквинавира составляет 4%, варьируя от 1% до 9%. Скорее всего биодоступность лимитирована сочетанием эффекта неполного всасывания и выраженным метаболизмом «первого прохождения» через печень. Было показано, что значение pH не играет большой роли в значительном увеличении биодоступности, наблюдающемся после приема пищи.

В перекрестном исследовании у ВИЧ-инфицированных пациентов, получавших препарат Интерфаст в комбинации с ритонавиром 1000/100 мг 2 раза в день сначала натощак (три последовательных приема), а затем после приема высококалорийной пищи (46 г жиров, 1091 ккал) (три последовательных приема), AUC<sub>0-12</sub> саквинавира равнялось 10320 нг \* ч/мл и 34926 нг \* ч/мл, соответственно. У всех пациентов (кроме одного) отмечалось достижение значений минимальной равновесной концентрации препарата ( $C_{ssmin}$ ) выше нижних значений терапевтического диапазона при приеме натощак. Тем не менее, препарат Интерфаст в комбинации с ритонавиром следует принимать в течение 2 ч после еды.

У ВИЧ-инфицированных пациентов, получавших саквинавир 600 мг 3 раза в сутки после еды, AUC и максимальная концентрация в плазме ( $C_{max}$ ) примерно в два раза превосходили таковые у здоровых добровольцев при аналогичном режиме дозирования.

Саквинавир в мягких желатиновых капсулах 200 мг или саквинавир в таблетках, покрытых оболочкой, 500 мг в комбинации с ритонавиром в дозах 400/400 мг или 1000/100 мг дважды в день обеспечивают сходную или большую системную экспозицию

саквинавира на протяжении 24 ч, чем при увеличении дозы саквинавира в мягких желатиновых капсулах 200 мг до 1200 мг/три раза в сутки.

У ВИЧ-инфицированных пациентов, ранее не получавших терапию и начинающих получать терапию препаратом Интерфаст/ритонавир в модифицированном режиме дозирования (500/100 мг дважды в день в течение первых 7 дней терапии с последующим увеличением дозы до 1000/100 мг дважды в день в течение последующих 7 дней терапии), системная экспозиция препарата Интерфаст, как правило, достигала или превышала значения, наблюдавшиеся в равновесном состоянии при стандартном режиме дозирования препарата Интерфаст/ритонавир в дозе 1000/100мг дважды в день.

Диарея не влияет на всасывание саквинавира, а также и сам прием препарата не оказывает влияния на параметры желудочно-кишечной абсорбции.

Саквинавир является субстратом для белка множественной лекарственной устойчивости MDR1 (P-гликопротеина).

#### *Распределение*

Саквинавир хорошо распределяется в тканях. Средний объем распределения в равновесном состоянии после в/в введения 12 мг – 700 л (коэффициент вариации 39%). Связь с белками плазмы – 98%, не зависит от концентрации препарата (15–700 нг/мл). Саквинавир (при приеме 600 мг 3 раза в день) не определяется в спинномозговой жидкости.

#### *Метаболизм*

Подвергается значительному печеночному метаболизму. Быстрый метаболизм до моно- и ди- гидроксилированных неактивных производных опосредуется через систему цитохрома Р450 и осуществляется изоферментом CYP3A4, который отвечает за более чем 90% печеночного метаболизма (исследования *in vitro*). После в/в введения 66% циркулирующего саквинавира обнаруживается в неизмененном виде, остальная часть - в виде метаболитов, что соответствует экстенсивному метаболизму «первого прохождения» в печени.

Системный клиренс после в/в инфузии 6, 36 и 72 мг саквинавира высокий и составляет 1,14 л/ч/кг (коэффициент вариации 12%), что слегка превышает печеночный кровоток.

Период полувыведения препарата из организма составляет 7 ч.

#### *Выведение*

Через 4 дня после приема <sup>14</sup>C-саквинавира внутрь (600 мг) 88% и 1% радиоактивности обнаруживаются в кале и моче, соответственно.

Через 4 дня после внутривенного введения  $^{14}\text{C}$ -саквинавира (10,5 мг) 81% и 3% радиоактивности обнаруживаются в кале и моче, соответственно.

После приема внутрь 13% циркулирующего в плазме саквинавира было представлено в неизмененном виде, остальная часть – в виде метаболитов.

#### ***Фармакокинетика в особых клинических группах***

##### *Почекная недостаточность*

Фармакокинетика препарата Интерфаст у пациентов с почечной недостаточностью не изучалась.

##### *Печеночная недостаточность*

Влияние нарушения функции печени на равновесную фармакокинетику саквинавира в комбинации с ритонавиром изучалось при участии ВИЧ-инфицированных пациентов (N=7) с нарушением функции печени средней степени (класс В (7–9 баллов) по шкале Чайлд-Пью). Данное исследование включало в себя контрольную группу ВИЧ-инфицированных пациентов (N=7) с нормальной функцией печени, соответствующих исследуемым пациентам по возрасту, полу, массе тела и потреблению табака. У ВИЧ-инфицированных пациентов с нарушением функции печени средней степени тяжести средние (% коэффициент вариации) значения AUC<sub>0-12</sub> и C<sub>max</sub> саквинавира составляли 24,3 (102%) мг\*ч/мл и 3,6 (83%) мг/мл, соответственно. Соответствующие значения в контрольной группе составляли 28,5 (71%) мг\*ч/мл и 4,3 (68%) мг/мл. Относительно AUC<sub>0-12</sub> и C<sub>max</sub> среднее геометрическое фармакокинетических параметров у пациентов с нарушением функции печени к фармакокинетическим параметрам пациентов с нормальной функцией печени (90% доверительный интервал) составляло 0,7 (0,3–1,6), что позволяет предположить приблизительно 30% уменьшение фармакокинетической экспозиции у пациентов с нарушением функции печени средней степени. У ВИЧ-инфицированных пациентов с нарушением функции печени средней степени коррекции дозы саквинавира не требуется (см. раздел «Особые указания»).

##### *Пол*

Не выявлено влияния пола на фармакокинетику препарата Интерфаст при однократном пероральном приеме 600 мг у здоровых добровольцев. При исследовании биоэквивалентности саквинавира в капсулах 200 мг и таблетках, покрытых оболочкой, 500 мг в комбинации с ритонавиром обнаружена более высокая экспозиция саквинавира у женщин (AUC на 56%, C<sub>max</sub> на 26%), независимо от массы тела и возраста. Клинически значимых различий эффективности и безопасности зарегистрированного режима дозирования саквинавира у мужчин и женщин не выявлено. Терапия саквинавиром в

комбинации с ритонавиром в дозах 1000/100 мг была признана безопасной и эффективной у обоих полов.

#### *Расовая принадлежность*

Влияние расы на фармакокинетику саквинавира не изучалось.

#### *Возраст*

Изучение фармакокинетических параметров у детей до 16 лет и взрослых старше 65 лет не проводилось.

Равновесная экспозиция саквинавира, наблюдавшаяся в педиатрических исследованиях, была существенно выше по сравнению с предшествующими данными, полученными у взрослых (у которых наблюдалось дозависимое и экспозиционнозависимое удлинение интервалов QT и PQ).

#### **Показания к применению**

Лечение ВИЧ-1 инфицированных взрослых пациентов в составе комбинированной терапии с ритонавиром и другими антиретровирусными лекарственными препаратами.

#### **Противопоказания**

Для ознакомления с возможными противопоказаниями необходимо изучить инструкцию по медицинскому применению ритонавира, используемого в комбинации с саквинавиром.

- Гиперчувствительность к саквинавиру или любому другому компоненту препарата.
- Декомпенсированное заболевание печени.
- Одновременный прием терфенадина, астемизола, мизоластина, цизаприда, дифемамила, пимозида, амиодарона, флекаинида, пропафенона, атазанавира, лопинавира, бепридила, лидокаина (системно), хинидина, ибутилида, сotalола, амитриптилина, имипрамина, кломипрамина, мапротилина, кларитромицина, эритромицина, галофантрина, пентамицина, спарфлоксацина, метадона, силденафила, тадалафила, варденафила, клозапина, галоперидола, хлорпромазина, мезоридазина, фенотиазина, сертиндола, сультоприда, тиоридазина, зипрасидона, винкамина для внутривенного введения, дапсона, дизопирамида, хинина, фентанила, алфентанила, такролимуса, дофетилида (возможно развитие жизнеугрожающих аритмий); рифампицина (тяжелая гепатоцеллюлярная токсичность); алкалоидов спорыньи (например, дигидроэрготамина, эргоновина, эрготамина, метилэргоновина (острая токсичность)); симвастатина, ловастатина (рабдомиолиз); мидазолама для перорального применения (длительная седация); триазолама (продолжительная/чрезмерная седация и угнетение дыхания); кветиапина (увеличение токсичности кветиапина); алфузозина (возможно развитие

артериальной гипотензии); тразодона (потенциальное развитие жизнеугрожающих аритмий, артериальной гипотензии, тошноты, головокружения и обморока).

- Врожденное или документально подтвержденное приобретенное удлинение интервала QT.
- Электролитные нарушения, особенно нескорректированная гипокалиемия.
- Клинически значимая брадикардия.
- Клинически значимая сердечная недостаточность со сниженной фракцией выброса левого желудочка.
- Симптоматическая аритмия в анамнезе.
- Одновременное использование с препаратами, способными удлинять интервал QT и/или PR (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами»).
- Детский возраст до 18 лет.

### С осторожностью

Одновременный прием делавирдина (увеличение «печеночных» трансаминаз); колхицина (нейромышечные нарушения, в частности рабдомиолиз); нефазодона, хинупристина, далфопристина (возможно развитие аритмий); омепразола (увеличение концентрации саквинавира) и других ингибиторов протонного насоса; салметерола (риск сердечно-сосудистых осложнений, удлинения интервала QT, сердцебиения, синусовой тахикардии); фузидовой кислоты (увеличение токсичности); рифабутина (увеличение концентрации рифабутина); фитопрепаратов, содержащих зверобой продырявленный (*Hypericum perforatum*), лекарственных препаратов и биологически активных добавок (БАД), содержащих экстракт чеснока; типранавира, карбамазепина, фенобарбитала, фенитоина, дексаметазона (снижение концентрации саквинавира); алпразолама, дикалия клоразепата, диазепама, флурозепама (увеличение седативного эффекта); мидазолама парентерально; фелодипина, нифедипина, никардипина, дилтиазема, нимодипина, верапамила, амлодипина, низодипина, исрадипина, циклоспорина, сиролимуса (рапамицина) (увеличение концентрации препаратов); флутиказона; будесонида; аторвастатина, церивастатина (возможное развитие мышечной слабости, боли в мышцах, увеличения активности креатинфосфокиназы (КФК)); правастатина, флувастилина (возможное влияние на транспорт белков); дигоксина (увеличение концентрации дигоксина); этинилэстрадиола (снижение концентрации препарата); нелфинавира; индинавира (развитие нефролитиаза).

### Применение при беременности и в период грудного вскармливания

#### Беременность

Эксперименты на животных не свидетельствуют о прямом или косвенном повреждающем эффекте саквинавира на развитие эмбриона или плода, течение беременности, пери- и постнатальное развитие. Опыт клинического применения препарата у беременных женщин ограничен. При применении препарата Интерфаст в комбинации с другими антиретровирусными препаратами у беременных, редко сообщалось о врожденных пороках развития, врожденных аномалиях, а также других нарушениях, не сопровождавшихся врожденными аномалиями.

Во время беременности препарат Интерфаст следует применять только в том случае, если возможная польза для матери превышает потенциальный риск для плода.

#### *Период грудного вскармливания*

Данных, полученных на животных и у человека относительно возможного проникновения саквинавира в грудное молоко, нет. Оценить возможные побочные действия препарата Интерфаст у грудных детей не представляется возможным, следовательно, кормление грудью следует прекратить до начала лечения препаратом Интерфаст. ВИЧ-инфицированным женщинам не рекомендуется кормить грудью во избежание передачи вируса ВИЧ ребенку.

#### **Способ применения и дозы**

Препарат Интерфаст назначается только в комбинации с ритонавиром (усиленный режим)!

У пациентов, уже получающих ритонавир в составе антиретровирусной терапии, дополнительный прием ритонавира не требуется.

Рекомендуется строго соблюдать предписанный режим приема препаратов.

Внутрь, во время или не позднее 2 часов после приема пищи.

#### *Стандартный режим дозирования*

Взрослые:

- в комбинации с ритонавиром (усиленный режим): препарат Интерфаст 1000 мг 2 раза в сутки и ритонавир 100 мг 2 раза в сутки в комбинации с другими антиретровирусными препаратами; препарат Интерфаст и ритонавир принимают внутрь одновременно и не позднее 2 часов после приема пищи.

У пациентов, ранее не получавших терапию и начинающих лечение препаратом Интерфаст, рекомендованная начальная доза составляет 500 мг 2 раза в сутки в комбинации с ритонавиром в дозе 100 мг 2 раза в сутки в течение первых 7 дней терапии. Через 7 дней от начала терапии рекомендуется увеличение дозы препарата Интерфаст/ритонавира до 1000/100 мг 2 раза в сутки.

При переходе с терапии другими ингибиторами протеазы ВИЧ в комбинации с ритонавиром или ненуклеозидными ингибиторами обратной транскриптазы рекомендуется начать терапию препаратом Интерфаст в стандартной рекомендованной дозе 1000 мг 2 раза в сутки в комбинации с ритонавиром в дозе 100 мг 2 раза в сутки без периода вымывания;

- в комбинации с другими ингибиторами протеазы ВИЧ: для ознакомления с рекомендованными дозами и возможными побочными эффектами других антиретровирусных препаратов следует изучить инструкции по их применению.

#### ***Дозирование в особых случаях***

При возникновении тяжелых явлений токсичности лечение препаратом Интерфаст следует прервать. Вследствие возможного увеличения плазменных концентраций при комбинированной терапии с другими антиретровирусными препаратами (например, с ритонавиром) может потребоваться изменение доз ингибиторов протеазы ВИЧ.

#### ***Дозирование у особых групп пациентов***

##### ***Пациенты с печеночной недостаточностью***

У ВИЧ-инфицированных пациентов с нарушениями функции печени легкой и средней степеней тяжести коррекции дозы препарата Интерфаст не требуется. В связи с высокой вариабельностью экспозиции в данной популяции пациентов рекомендуется тщательное наблюдение за профилем безопасности (включая симптомы аритмии) и вирусологическим ответом. Декомпенсированное заболевание печени является противопоказанием к назначению препарата Интерфаст.

##### ***Пациенты с почечной недостаточностью***

У пациентов с легкой и умеренной степенью почечной недостаточности коррекции дозы препарата Интерфаст не требуется. При применении препарата Интерфаст у пациентов с тяжелой почечной недостаточностью следует соблюдать осторожность.

##### ***Детский возраст***

Эффективность и безопасность препарата Интерфаст у детей до 18 лет не установлены. Для данной популяции не установлены дозы препарата Интерфаст, не вызывающие удлинение интервалов QT и PR и одновременно отвечающие параметрам эффективности. Существует ограниченная информация об использовании препарата Интерфаст в мягких желатиновых капсулах (неусиленный режим) у детей. Информация о применении препарата Интерфаст без ритонавира (неусиленный режим) у детей отсутствует.

##### ***Пожилой возраст***

Опыт применения у пациентов старше 60 лет ограничен. Данные для рекомендации режима дозирования отсутствуют.

## Побочное действие

### *Данные клинических исследований*

Самыми частыми нежелательными явлениями с как минимум возможной связью с режимом, усиленным ритонавиром, были диарея, тошнота, утомляемость, рвота, метеоризм и боли в животе.

Для описания частоты побочных реакций, возникающих при применении саквинавира, усиленного ритонавиром, используются следующие категории: очень часто ( $\geq 1/10$ ), часто ( $\geq 1/100$ , но  $< 1/10$ ), нечасто ( $\geq 1/1\ 000$ , но  $< 1/100$ ), редко ( $\geq 1/10\ 000$ , но  $< 1/1\ 000$ ), очень редко ( $< 1/10\ 000$ ), частота неизвестна (на основании имеющихся данных оценить невозможно).

**Таблица 5.** Резюме нежелательных реакций

Система организма	Нежелательные реакции	
<i>Со стороны кожи и подкожной жировой клетчатки</i>	Часто	Приобретенная липодистрофия, алопеция, сухость кожи, экзема, липоатрофия, сыпь, зуд
	Нечасто	Синдром Стивенса-Джонсона, буллезный дерматит
<i>Со стороны нервной системы</i>	Часто	Головная боль, периферическая нейропатия, парестезия, головокружение, изменение вкусовых ощущений
	Нечасто	Сонливость, судороги
<i>Со стороны органа зрения</i>	Нечасто	Нарушение зрения
<i>Со стороны психической сферы</i>	Часто	Снижение либидо, нарушение сна
<i>Со стороны желудочно-кишечного тракта</i>	Очень часто	Диарея, тошнота
	Часто	Рвота, вздутие живота, метеоризм, абдоминальные боли, боль в верхних отделах живота, запор, сухость во рту, диспепсия, отрыжка, сухость губ, неоформленный стул
	Нечасто	Панкреатит
<i>Со стороны печени и желчевыводящих путей</i>	Нечасто	Гепатит, желтуха

<i>Со стороны костно-мышечной системы</i>	Часто	Мышечный спазм
	Частота неизвестна	Миалгия, миозит, рабдомиолиз
<i>Со стороны почек и мочевыводящих путей</i>	Нечасто	Нарушение функции почек
<i>Со стороны иммунной системы</i>	Часто	Реакции гиперчувствительности
<i>Нарушения питания и метаболизма</i>	Очень часто	Гиперхолестеринемия, гипертриглицеридемия
	Часто	Сахарный диабет, анорексия, повышение аппетита
	Нечасто	Снижение аппетита
	Частота неизвестна	Инсулинерезистентность, гиперлактатемия, гипергликемия, иногда сопровождающаяся кетоацидозом
<i>Со стороны дыхательной системы</i>	Часто	Одышка
<i>С стороны системы крови и органов кроветворения</i>	Очень часто	Снижение числа тромбоцитов
	Часто	Анемия, снижение уровня гемоглобина, снижение числа лимфоцитов, снижение числа лейкоцитов
	Нечасто	Нейтропения
	Частота неизвестна	Усиление кровотечений, в том числе спонтанное образование подкожных гематом и гемартрозов у пациентов с гемофилией типа А и В, получающих лечение ингибиторами протеазы ВИЧ
<i>Со стороны лабораторных показателей</i>	Очень часто	Повышение активности аланинаминотрансферазы и аспартатаминотрансферазы; повышение концентрации холестерина, липопротеидов низкой плотности и триглицеридов; тромбоцитопения
	Часто	Повышение активности амилазы,

		концентрации билирубина, креатинина, снижение гемоглобина; лимфоцитопения, лейкоцитопения
Прочее	Часто	Общая слабость (астения), утомляемость, недомогание, увеличение жировой ткани
	Нечасто	Изъявление слизистой оболочки

Ниже приведены нежелательные реакции, наблюдавшиеся при приеме саквинавира в неусиленном режиме.

*Со стороны нервной системы:* гипестезия, нарушение координации, внутричерепное кровоизлияние.

*Со стороны психики:* спутанность сознания, депрессия, тревога, попытка самоубийства, бессонница, нарушение либido.

*Со стороны кожи и подкожной-жировой клетчатки:* синдром Стивенса-Джонсона, буллезный дерматит, лекарственная сыпь, тяжелые кожные реакции, связанные с нарушением функции печени.

*Со стороны органов гепатобилиарной системы:* желтуха, портальная гипертензия, обострение хронических заболеваний печени (с нарушением функции печени 4-й степени).

*Со стороны организма в целом:* лихорадка, изъязвления слизистой оболочки, боль в грудной клетке.

*Со стороны костно-мышечной системы:* мышечная слабость и полиартрит.

*Со стороны системы крови и органов кроветворения:* гемолитическая анемия и нейтропения.

*Со стороны органов желудочно-кишечного тракта:* асцит, панкреатит и кишечная непроходимость.

*Нарушения питания и метаболизма:* сниженный аппетит.

*Добропачественные и злокачественные новообразования (включая кисты и полипы):* папилломы кожи, острый миелолейкоз.

*Со стороны мочевыделительной системы:* нефролитиаз.

*Со стороны сердечно-сосудистой системы:* спазм периферических сосудов.

*Со стороны лабораторных показателей:* повышение активности КФК, гипергликемия, гипогликемия.

#### **Постмаркетинговое наблюдение**

*Со стороны иммунной системы:* реакции гиперчувствительности.

*Нарушения питания и метаболизма:*

- сахарный диабет или гипергликемия, иногда сопровождающаяся кетоацидозом;
- липодистрофия: у ВИЧ-инфицированных пациентов комбинированная антиретровирусная терапия ассоциируется с перераспределением жировой ткани – липодистрофией, включающей атрофию подкожного жира на лице и конечностях, увеличение висцерального и интрабрюшного жира, увеличение молочных желез и отложение жира на дорзальной поверхности шеи и спины («бычий горб»);
- гипертриглицеридемия, гиперхолестеринемия, инсулинерезистентность, гипергликемия и гиперлактатемия.

*Со стороны нервной системы:* сонливость, судороги.

*Со стороны системы крови и органов кроветворения:* усиление кровотечений, в том числе спонтанное образование подкожных гематом и гемартрозов.

*Со стороны органов гепатобилиарной системы:* гепатит.

*Со стороны костно-мышечной и соединительной ткани:* повышение активности КФК, миалгия, миозит и редко рабдомиолиз. Зарегистрированы случаи остеонекроза.

*Со стороны почек и мочевыводящих путей:* нарушение функции почек.

#### ***Описание отдельных побочных эффектов***

##### ***Нарушение метаболизма***

В ходе антиретровирусной терапии возможно повышение уровня липидов, концентрации глюкозы в крови, а также увеличение массы тела.

У пациентов с гемофилией типа А и В, получающих лечение ингибиторами протеазы ВИЧ, сообщалось о случаях усиления кровотечения, включая спонтанное образование кожных гематом и гемартрозов.

У пациентов, получающих терапию ингибиторами протеазы ВИЧ (в частности, в комбинации с нуклеозидными аналогами), сообщалось о повышении активности КФК, миалгии, миозите и редко рабдомиолизе.

Отмечались случаи остеонекроза, особенно у пациентов с общепринятыми факторами риска, распространенной ВИЧ-инфекцией или при длительной комбинированной антиретровирусной терапии.

У ВИЧ-инфицированных пациентов с тяжелым иммунодефицитом на момент начала комбинированной антиретровирусной терапии может развиться воспалительный ответ на асимптомные или резидуальные оппортунистические инфекции (синдром иммунной реактивации). Синдром иммунной реактивации также может проявляться развитием аутоиммунных нарушений (например, болезнь Грейвса и аутоиммунный гепатит), которые развиваются в различные сроки терапии. Развитие аутоиммунных нарушений возможно также спустя много месяцев после начала терапии.

## Передозировка

В настоящее время клинический опыт передозировки саквинавира у людей ограничен. Острая или хроническая передозировка при монотерапии препаратом Интерфаст не приводит к серьезным осложнениям.

*В комбинации с другими ингибиторами протеазы ВИЧ возможны следующие симптомы:* общая слабость, утомляемость, диарея, тошнота, рвота, выпадение волос, сухость во рту, гипонатриемия, снижение веса, ортостатическая гипотензия.

*Лечение:* специфического антидота нет. Мероприятия, направленные на поддержание жизненно важных функций, включая контроль основных показателей жизнедеятельности, электрокардиография (ЭКГ), наблюдение за клиническим состоянием больного. Следует предотвратить последующее всасывание препарата. Так как саквинавир в высокой степени связывается с белками плазмы крови, применение диализа нецелесообразно.

## Взаимодействие с другими лекарственными средствами

В большинстве проведенных исследований по лекарственному взаимодействию изучалось применение препарата Интерфаст без ритонавира (неусиленный режим). Результаты, полученные в ходе исследований по применению препарата Интерфаст в неусиленном режиме, могут полностью не отражать эффекты применения саквинавира в комбинации с ритонавиром.

В данном разделе представлена полная информация о взаимодействии лекарственных препаратов, включая данные исследований, проводимых с применением саквинавира в мягких желатиновых капсулах, ранее представленного на рынке.

Саквинавир метаболизируется изоферментом CYP3A4 системы цитохрома P450 и является субстратом для Р-гликопротеина (P-gp). Препараты, которые метаболизируются изоферментом CYP3A4 или влияют на активность изофермента CYP3A4 и/или Р-гликопротеина, могут изменить фармакокинетику препарата Интерфаст. Аналогично саквинавир может изменить фармакокинетику других препаратов, являющихся субстратом изофермента CYP3A4 или Р-гликопротеина.

Ритонавир, как мощный ингибитор изофермента CYP3A4 и Р-гликопротеина, может оказывать влияние на фармакокинетику других препаратов. При назначении комбинированной терапии следует учитывать возможные взаимодействия с ритонавиром.

Учитывая результаты, полученные при применении препарата Интерфаст в комбинации с ритонавиром здоровыми добровольцами в отношении дозозависимого удлинения интервалов QT и PR (см. разделы «Противопоказания», «Особые указания»), аддитивные эффекты в отношении удлинения интервалов QT и PR могут возникать при применении препаратов следующих классов: антиаритмические средства IA или III класса,

нейролептики, трициклические антидепрессанты, ингибиторы фосфодиэстеразы 5-го типа (ИФДЭ-5), отдельные антибактериальные и антигистаминные препараты, а также другие лекарственные препараты (см. ниже). Эти аддитивные эффекты могут привести к увеличению риска возникновения желудочковых аритмий, особенно аритмии желудочковой тахисистолической типа «пируэт» (*torsades de pointes*). Таким образом, следует избегать совместного приема препарата Интерфаст в комбинации с ритонавиром и перечисленных лекарственных препаратах, при наличии других альтернативных терапевтических возможностей. Строго противопоказаны лекарственные препараты, одновременно обладающие фармакокинетическим взаимодействием с саквинавиром в комбинации с ритонавиром и способностью удлинять интервалы QT и PR. Не рекомендуется комбинировать препарат Интерфаст и ритонавир с другими лекарственными препаратами, обладающими известным пролонгирующим действием в отношении интервалов QT и PR. Следовательно, в случае крайней необходимости подобная комбинация должна использоваться с осторожностью.

Таблица 6. Примеры известных и потенциальных взаимодействий с другими лекарственными препаратами.

Лекарственный препарат и терапевтическая область применения (доза саквинавира, используемая в исследованиях)	Взаимодействие	Рекомендации относительно совместного применения
<b>Антиретровирусные препараты</b>		
<b>Нуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы</b>		
Залцитабин и/или зидовудин	<p>Завершенные исследования, изучающие фармакокинетическое взаимодействие, отсутствуют.</p> <p>Согласно результатам исследований у взрослых пациентов одновременное применение саквинавира (неусиленный режим) в комбинации с залцитабином и/или зидовудином не оказывает влияния на всасывание, распределение и выведение препаратов.</p>	<p>Взаимодействие с залцитабином маловероятно вследствие различных путей метаболизма и выведения.</p> <p>Коррекции дозы не требуется.</p>
Диданозин Однократный прием 400 мг	<p>AUC саквинавира <math>\downarrow</math> 30%</p> <p><math>C_{\max}</math> саквинавира <math>\downarrow</math> 25%</p> <p><math>C_{\min}</math> саквинавира <math>\leftrightarrow</math></p>	Изменения не имеют определенной клинической значимости.

(саквинавир/ритонавир 1600/100 мг 4 раза в день на протяжении 2 недель, 8 здоровых добровольцев)		Коррекции дозы не требуется.
Тенофовир 300 мг один раз в день (саквинавир/ритонавир 1000/100 мг 2 раза в день, 18 ВИЧ-инфицированных пациентов)	AUC саквинавира ↓ 1% $C_{max}$ саквинавира ↓ 7% $C_{min}$ саквинавира ↔	Отсутствует клинически значимое влияние на экспозицию саквинавира.  Коррекции дозы не требуется.
<b>Ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы</b>		
Делавирдин	<p>Взаимодействие с саквинавиром/ритонавиром не изучалось.</p> <p>Информация о безопасности применения такой комбинации лекарственных препаратов ограничена, данные по эффективности отсутствуют.</p> <p>AUC саквинавира ↑ 348% Согласно предварительным результатам исследований, увеличение «печеночных» трансамина наблюдалось у 13% добровольцев в течение первых недель применения комбинации саквинавир/делавирдин (у 6% 3 или 4 степени).</p>	<p>Необходимо тщательно контролировать функцию печени.</p> <p>Одновременный прием только в случае, если потенциальная польза превышает риск.</p>
Эфавиренз 600 мг 1 раз в день (саквинавир/ритонавир 1600/200 мг 1 раз в день или саквинавир/ритонавир 1000/100 мг 2 раза в день (n=32) или саквинавир/ритонавир 1200/100 мг 1 раз в день)	Саквинавир ↔ Эфавиренз ↔	Коррекции дозы не требуется. Необходимо контролировать функцию печени.
Невирапин	<p>Взаимодействие с препаратом Интерфаст/ритонавиром не изучалось.</p> <p>Неусиленный режим:</p>	<p>Изменения не являются клинически значимыми.</p> <p>Коррекции дозы не требуется.</p>

	AUC саквинавира ↓ 24% AUC невирапина ↔	
<b>Ингибиторы протеазы ВИЧ</b>		
Атазанавир 300 мг 1 раз в день (саквинавир/ритонавир 1600/100 мг 1 раз в день)	AUC саквинавира ↑ 60% $C_{\max}$ саквинавира ↑ 42% AUC ритонавира ↑ 41% $C_{\max}$ ритонавира ↑ 34% Атазанавир ↔  Клинические данные о применении атазанавира в комбинации с саквинавиром/ритонавиром 1000/100 мг 2 раза в день отсутствуют.	Одновременный прием саквинавира в комбинации с ритонавиром и атазанавиром противопоказан в связи с возможным развитием жизнеугрожающих аритмий.
Фосампренавир 700 мг 2 раза в день (саквинавир/ритонавир 1000/100 мг 2 раза в день, 18 ВИЧ-инфицированных пациентов)	AUC саквинавира ↓ 15% $C_{\max}$ саквинавира ↓ 9% $C_{\min}$ саквинавира ↓ 24%, оставалась выше порога терапевтической эффективности	Коррекции дозы саквинавира/ритонавира не требуется.
Индинаvir 800 мг 3 раза в день (однократная доза саквинавира 600–1200 мг, 6 здоровых добровольцев)	Прием низких доз ритонавира приводит к увеличению концентрации индинавира.  Неусиленный режим: AUC саквинавира ↑ в 4.6–7.2 раза Концентрация индинавира в плазме ↔	Увеличение концентрации индинавира может привести к развитию нефролитиаза.  Данные по безопасности и эффективности такой комбинации препаратов отсутствуют.  Соответствующие дозы для данной комбинации лекарственных препаратов не установлены.  Одновременный прием только в случае, если потенциальная польза превышает риск.
Лопинавир (саквинавир/ритонавир 1000/100 мг 2 раза в день в комбинации с двумя или тремя нуклеозидными ингибиторами обратной транскриптазы у 32 ВИЧ-инфицированных пациентов) (саквинавир 1000 мг 2 раза в день и	Саквинавир ↔ Ритонавир ↓ (эффективность как усиливающего агента не изменилась) Лопинавир ↔ (по сравнению с данными предыдущих исследований комбинации лопинавир/ритонавир)	Возможно развитие аддитивного эффекта на удлинение интервалов QT и/или PR при применении лопинавира/Ритонавира.  Одновременный прием саквинавира в комбинации с ритонавиром и лопинавиром

фиксированная комбинация лопинавира/ритонавира 400/100 мг 2 раза в день у 45 ВИЧ-инфицированных пациентов)		<p>противопоказан в связи с возможным развитием жизнеугрожающих аритмий.</p> <p>У пациентов, уже принимающих ритонавир, как часть антиретровирусной терапии, дополнительный прием ритонавира не требуется.</p>
<i>Нелфинавир</i> 1250 мг 2 раза в день (саквинавир/ритонавир 1000/100 мг 2 раза в день)	<p>AUC саквинавира <math>\uparrow</math> 13% (90% ДИ: <math>\downarrow</math>27 - <math>\uparrow</math>74)  <math>C_{\max}</math> саквинавира <math>\uparrow</math> 9% (90% ДИ: <math>\downarrow</math>27 - <math>\uparrow</math>61)  AUC нелфинавира <math>\downarrow</math> 6% (90% ДИ: <math>\downarrow</math>28 - <math>\uparrow</math>22)  <math>C_{\max}</math> нелфинавира <math>\downarrow</math> 5% (90% ДИ: <math>\downarrow</math>23 - <math>\uparrow</math>16)</p>	Применение саквинавира в комбинации с ритонавиром и нелфинавиром не рекомендуется.
<i>Ритонавир</i> 100 мг 2 раза в день (саквинавир 1000 мг 2 раза в день)	<p>Саквинавир <math>\uparrow</math> Ритонавир <math>\leftrightarrow</math></p> <p>У ВИЧ-инфицированных пациентов применение саквинавира в комбинации с ритонавиром в дозах 1000/100 мг 2 раза в день приводило к суточной системной экспозиции саквинавира, сходной или большей, чем таковая при применении саквинавира в дозе 1200 мг 3 раза в день (мягкие капсулы).</p>	<p>Одобренный режим дозирования: саквинавир 1000 мг 2 раза в день и ритонавир 100 мг 2 раза в день.</p> <p>Применение более высоких доз ритонавира может приводить к увеличению частоты развития нежелательных явлений.</p> <p>В некоторых случаях одновременное применение саквинавира и ритонавира приводило к развитию тяжелых нежелательных явлений кетоацидоза и нарушений со стороны печени, особенно у пациентов с заболеванием печени в анамнезе.</p> <p>Коррекции дозы не требуется.</p>
<i>Типранавир</i> Двойная комбинированная терапия ингибитором протеазы у ВИЧ-положительных пациентов, получавших	$C_{\min}$ саквинавира $\downarrow$ 78%	Одновременное применение типранавира, усиленного небольшими дозами ритонавира, с саквинавиром/ритонавиром не рекомендуется, так как

ранее терапию		<p>клиническая значимость снижения Ст<sub>inf</sub> саквинавира не изучалась.</p> <p>Если, тем не менее, принято решение о необходимости назначения данной комбинации препаратов, настоятельно рекомендуется проводить мониторирование концентраций саквинавира в плазме.</p>
<b>Ингибиторы слияния</b>		
Энфувиртид (саквинавир/ритонавир 1000/100 мг 2 раза в день, 12 ВИЧ-инфицированных пациентов)	Саквинавир ↔ Энфувиртид ↔	<p>Клинически значимое взаимодействие отсутствует.</p> <p>Коррекции дозы не требуется.</p>
<b>Анtagонисты хемокиновых рецепторов CCR5</b>		
Маравирок 100 мг 2 раза в день (саквинавир/ритонавир 1000/100 мг 2 раза в сутки)	AUC <sub>12</sub> маравирока ↑ в 8.77 раз C <sub>max</sub> маравирока ↑ в 3.78 раз Влияние на концентрацию саквинавира и ритонавира не измерялось и не ожидается.	<p>Коррекции дозы саквинавира/ ритонавира не требуется.</p> <p>Доза маравирока должна быть снижена до 150 мг 2 раза в сутки, необходимо наблюдение за пациентом.</p>
<b>Антиаритмические средства</b>		
Бепридил, лидокаин, хинидин, амиодарон, флекаинид, пропафенон	При совместном применении саквинавира/ритонавир возможно увеличение концентрации бепридила, лидокаина (при системном применении), хинидина, амиодарона, флекаинида, пропафенона.	Данные антиаритмические средства противопоказаны для совместного применения с саквинавиром в комбинации с ритонавиром в связи с возможным развитием жизнеугрожающих аритмий.
Дофетилид (саквинавир/ритонавир)	Одновременное применение саквинавира/ритонавира с препаратами, преимущественно метаболизирующими изоферментом CYP3A4, может привести к повышению концентрации таких препаратов в плазме крови.	Дофетилид противопоказан для совместного применения с саквинавиром/ ритонавиром в связи с возможным развитием жизнеугрожающих аритмий.

<i>Ибупрофен, сомапол (саквинавир/ритонавир)</i>	Клинических исследований не проводилось, фармакокинетического взаимодействия не ожидается.	Совместное применение противопоказано в связи с возможным развитием жизнеугрожающих аритмий.
<b>Антикоагулянты</b>		
<i>Варфарин (саквинавир/ритонавир)</i>	Возможное изменение концентрации варфарина.	Необходимо контролировать международное нормализованное отношение (МНО).
<b>Противоэпилептические средства</b>		
<i>Карbamазепин, фенобарбитал, фенитоин</i>	<p>Взаимодействие с саквинавиром/ритонавиром не изучалось.</p> <p>Карbamазепин, фенобарбитал, фенитоин - индукторы микросомальных ферментов печени (изофермента CYP3A4) могут снижать концентрацию саквинавира в плазме при неусиленном режиме дозирования.</p>	<p>Применять с осторожностью.</p> <p>Рекомендуется мониторинг концентрации саквинавира в плазме крови.</p>
<b>Антидепрессанты</b>		
<i>Трициклические антидепрессанты (амитриптилин, имипри胺, кломипрамин)</i>	Саквинавир/ритонавир могут увеличивать концентрацию трициклических антидепрессантов.	Совместное применение с саквинавиром и ритонавиром противопоказано в связи с возможным развитием жизнеугрожающих аритмий.
<i>Мапротилин</i>	Метаболизм мапротилина осуществляется с вовлечением изоферментов CYP2D6 и CYP1A2. Ассоциируется с удлинением интервала QTc.	Совместное применение с саквинавиром и ритонавиром противопоказано в связи с возможным развитием жизнеугрожающих аритмий.
<i>Нефазодон (саквинавир/ритонавир)</i>	<p>Одновременный прием нефазодона и саквинавира в комбинации с ритонавиром не изучался.</p> <p>Нефазодон ингибирует изофермент CYP3A4 и может увеличивать концентрацию саквинавира.</p>	<p>Применение данной комбинации не рекомендуется в связи с возможным развитием аритмии.</p> <p>Рекомендуется мониторинг проявлений токсичности саквинавира.</p>

<i>Тразодон</i>	Одновременный прием тразодона и саквинавира в комбинации с ритонавиром может приводить к увеличению концентраций тразодона в плазме крови.	При одновременном применении тразодона и ритонавира наблюдались такие нежелательные реакции как тошнота, головокружение, артериальная гипотензия и обморок. Тразодон противопоказан для применения с саквинавиром в комбинации с ритонавиром в связи с возможным развитием жизнеугрожающих аритмий.
<b>Противоподагрические средства</b>		
<i>Колхицин</i>	Совместное применение колхицина и саквинавир/ритонавир может вызвать повышение концентрации колхицина в плазме крови вследствие ингибиции Р-гликопротеина и/или изофермента CYP3A4 за счет ингибиторов протеазы ВИЧ.	Совместное применение колхицина и саквинавира в комбинации с ритонавиром не рекомендуется в связи с возможным увеличением токсичности колхицина (нейромышечные нарушения, в частности рабдомиолиз), особенно у пациентов с нарушением функции печени и почек.
<b>Противомикробные средства</b>		
<i>Кларитромицин (саквинавир/ритонавир)</i>	Взаимодействие между саквинавиром в комбинации с ритонавиром и кларитромицином не изучалось.  Кларитромицин является субстратом изофермента CYP3A4, его применение ассоциируется с удлинением интервала QT.	Совместное применение с саквинавиром и ритонавиром противопоказано в связи с возможным развитием жизнеугрожающих аритмий.
<i>Кларитромицин 500 мг 2 раза в день (неусиленный режим, саквинавир 1200 мг 3 раза в день)</i>	AUC саквинавира $\uparrow$ 177% $C_{max}$ саквинавира $\uparrow$ 187% AUC кларитромицина $\uparrow$ 40% $C_{max}$ кларитромицина $\uparrow$ 40%	Совместное применение с саквинавиром и ритонавиром противопоказано в связи с возможным развитием жизнеугрожающих аритмий.
<i>Эритромицин (саквинавир/ритонавир)</i>	Взаимодействие между саквинавиром в комбинации с ритонавиром и эритромицином не	Возможно развитие аддитивного эффекта в отношении удлинения интервалов QT и/или PR

	изучалось.	при применении с саквинавиром в комбинации с ритонавиром.
	Эритромицин является субстратом изофермента CYP3A4, его применение ассоциируется с удлинением интервала QT.	Одновременное применение с саквинавиром в комбинации с ритонавиром противопоказано в связи с возможным развитием жизнеугрожающих аритмий.
Эритромицин 250 мг 4 раза в день (неусиленный режим, саквинавир 1200 мг 3 раза в день)	AUC саквинавира ↑ 99% $C_{max}$ саквинавира ↑ 106%	Одновременное применение с саквинавиром в комбинации с ритонавиром противопоказано в связи с возможным развитием жизнеугрожающих аритмий.
Фузидовая кислота	Взаимодействие между саквинавиром и фузидовой кислотой не изучалось.  Одновременное применение этих препаратов может вызвать увеличение плазменной концентрации фузидовой кислоты и саквинавира/ритонавира.	Одновременное использование фузидовой кислоты и саквинавира/ритонавира не рекомендуется из-за возможного увеличения токсичности обоих препаратов.
Стрептограмины (хинупристин/ далфопристин)	Одновременное применение с саквинавиром /ритонавиром не изучалось.  Стрептограмины (такие как хинупристин/ далфопристин) ингибируют изофермент CYP3A4, могут увеличивать концентрацию саквинавира в плазме крови.	При одновременном применении этих препаратов рекомендуется контролировать состояние пациента с целью выявления <i>токсичности</i> саквинавира.  Следует применять с осторожностью из-за возможного развития аритмий.
Галофантрин, пентамидин, спарфлоксацин	Одновременное применение с саквинавиром/ритонавиром не изучалось.	Одновременное применение с саквинавиром в комбинации с ритонавиром противопоказано в связи с возможным развитием жизнеугрожающих

<b>Противогрибковые средства</b>		
Кетоконазол 200 мг в сутки (саквинавир/ритонавир 1000/100 мг 2 раза в день)	AUC саквинавира ↔ $C_{max}$ саквинавира ↔ AUC ритонавира ↔ $C_{max}$ ритонавира ↔ AUC кетоконазола ↑ 168% (90% ДИ: 146–193) $C_{max}$ кетоконазола ↑ 45% (90% ДИ: 32–59)	При применении кетоконазола в дозе ≤200 мг коррекции дозы саквинавира/ритонавира не требуется.  Не рекомендуется назначение кетоконазола в дозах более 200 мг в день.
Итраконазол	Взаимодействие между саквинавиром /ритонавиром и итраконазолом не изучалось. Итраконазол является относительно мощным ингибитором изофермента CYP3A4, в связи с чем возможно потенциальное взаимодействие.	Рекомендуется контролировать состояние пациента с целью выявления <i>токсичности</i> саквинавира.
Флуконазол, миконазол	Специальные исследования данной комбинации препаратов не проводились.  Флуконазол и миконазол являются ингибиторами изофермента CYP3A4 и могут увеличивать плазменные концентрации саквинавира.	Рекомендуется контролировать состояние пациента с целью выявления <i>токсичности</i> саквинавира.
<b>Антимикобактериальные препараты</b>		
Рифабутин 150 мг один раз в 3 дня (саквинавир/ритонавир 1000/100 мг 2 раза в день) у здоровых добровольцев	AUC <sub>0-12</sub> саквинавира ↓ 13% (90% ДИ: ↓31 - ↑9) $C_{max}$ саквинавира ↓ 15% (90% ДИ: ↓32 - ↑7) AUC <sub>0-12</sub> ритонавира ↔ (90% ДИ: ↓10 - ↑9) $C_{max}$ ритонавира ↔ (90% ДИ: ↓8 - ↑7) Активное вещество рифабутина (рифабутин + 25-О-дезацетил-рифабутин): AUC <sub>0-72</sub> ↑ 134% (90% ДИ: 109–162) $C_{max}$ ↑ 130% (90% ДИ: 98–167) AUC <sub>0-72</sub> рифабутина ↑ 53% (90% ДИ: 36–73) $C_{max}$ рифабутина ↑ 86%	Рекомендованная доза рифабутина при применении в комбинации с саквинавиром и ритонавиром составляет 150 мг через день.  Рекомендуется мониторирование активности «печеночных» ферментов, а также числа нейтрофилов (для выявления нейтропении) в крови.  Информация по совместному применению саквинавира, ритонавира и рифабутина ограничена.

(90% ДИ: 57–119)		
<i>Рифампицин 600 мг ежедневно (саквинавир/ритонавир 1000/100 мг 2 раза в день)</i>	Через 1-5 дней после совместного применения у 11 из 17 здоровых добровольцев (65%) в ходе клинического исследования отмечалась тяжелая гепатоцеллюлярная токсичность с повышением «печеночных» трансаминаз более чем в 20 раз по сравнению с верхней границей нормы.	Применение рифамицина противопоказано пациентам, принимающим саквинавир в комбинации с ритонавиром в рамках антиретровирусной терапии, вследствие возможности развития тяжелой гепатоцеллюлярной токсичности.
<b>Бензодиазепины</b>		
<i>Мидазолам (парентерально)</i>	Данные по одновременному приему саквинавира в комбинации с ритонавиром и внутривенному введению мидазолама отсутствуют.  На основании данных исследований по совместному применению модуляторов изофермента CYP3A4 и мидазолама при внутривенном пути введения можно предположить возможное увеличение плазменных концентраций мидазолама в 3-4 раза.	Следует соблюдать осторожность при одновременном применении саквинавира и внутривенном введении мидазолама.  Одновременное применение саквинавира и внутривенное введение мидазолама следует проводить в палатах интенсивной терапии или в отделениях с возможностью своевременного проведения клинического мониторинга и адекватного лечения в случае угнетения дыхания и/или длительной седации.  Необходима коррекция дозы, особенно в случаях неоднократного введения мидазолама.
<i>Мидазолам Однократная доза 7.5 мг перорально (саквинавир/ритонавир 1000/100 мг 2 раза в день)</i>	AUC мидазолама ↑ в 12.4 раза $C_{max}$ мидазолама ↑ в 4.3 раза $t_{1/2}$ мидазолама ↑ с 4.7 до 14.9 часов	Пероральный прием мидазолама в комбинации с саквинавиром /ритонавиром противопоказан вследствие возможного развития длительной седации.
<i>Алпразолам, дикалия клоразепат, диазепам и флуразепам</i>	При одновременном применении с саквинавиром /ритонавиром возможно увеличение	Необходимо тщательно мониторировать пациентов на предмет усиления седативного эффекта

	концентрации бензодиазепинов.	бензодиазепинов.  При необходимости следует уменьшить дозу бензодиазепинов.
Триазолам	Возможно увеличение концентрации триазолама в плазме крови.	Одновременное применение с саквинавиром в комбинации с ритонавиром противопоказано в связи с риском развития более продолжительной/ чрезмерной седации и угнетения дыхания.
<b>Блокаторы «медленных» кальциевых каналов</b>		
Фелодиптин, нифедиптин, никардиптин, дилтиазем, нимодиптин, верапамил, амлодиптин, низолдиптин, исрадиптин	При одновременном применении с саквинавиром возможно увеличение концентрации этих препаратов.	Данные препараты следует применять с осторожностью, рекомендуется клиническое мониторирование состояния пациентов.
<b>Глюокортикоиды</b>		
Дексаметазон	Взаимодействие между саквинавиром/ритонавиром и дексаметазоном не изучалось.  Дексаметазон является индуктором изофермента CYP3A4 и может уменьшать концентрации саквинавира.	Препарат следует применять с осторожностью.  Эффективность саквинавира может быть снижена при одновременном применении.
Флутиказон 50 мкг 4 раза в день, интраназально (ритонавир 100 мг 2 раза в день) Будесонид	Флутиказон ↑ Собственный кортизол ↓ 86% (90% ДИ: 82–89)  Усиление эффекта ожидается при ингаляционном пути введения. Системная экспозиция флутиказона и будесонида наблюдалась в случае ингаляционного или интраназального пути введения одного из препаратов с низкими дозами ритонавира. Описаны несколько случаев	Одновременное применение саквинавира/ ритонавира и флутиказона (или других глюокортикоидов) не рекомендуется.  Одновременное применение данных препаратов возможно только в случае, если потенциальная польза терапии превосходит риск развития системных эффектов глюокортикоидов.  Следует уменьшить дозу

	<p>синдрома Иценко-Кушинга при одновременном применении этих глюкокортикоидов.</p> <p>При необходимости комбинированной терапии следует рассматривать возможность перевода пациентов на ингаляции беклометазона.</p>	<p>глюкокортикоидов, а также тщательно мониторировать местные и системные эффекты (в том числе и при переходе на терапию глюкокортикоидами, не являющихся субстратом изофермента CYP3A4 (например, беклометазон)).</p> <p>В случае прекращения терапии глюкокортикоидами необходимо постепенное уменьшение дозы в течение длительного времени.</p>
--	--	--

#### ***Неселективные антагонисты эндотелиновых рецепторов***

Бозентан	<p>Взаимодействие между саквинавиром и бозентаном не изучалось.</p> <p>При одновременном применении саквинавира в комбинации с ритонавиром и бозентана возможно увеличение концентрации бозентана и уменьшение концентрации саквинавира/ритонавира в плазме.</p>	<p>В некоторых случаях может потребоваться коррекция дозы бозентана.</p> <p>В случае одновременного применения саквинавира/ритонавира и бозентана необходимо контролировать переносимость пациентом бозентана.</p> <p>Рекомендуется контролировать концентрацию саквинавира и сопутствующей противовирусной терапии в плазме крови.</p>
----------	--	---

#### ***Алкалоиды спорыни и их производные***

Дигидроэрготамин, эргоновин, эрготамин, метилэргоновин	При одновременном применении саквинавиром/ритонавиром возможно увеличение экспозиции алкалоидов спорыни.	Одновременное применение этих препаратов с саквинавиром в комбинации с ритонавиром противопоказано, вследствие возможности развития острой токсичности.
--	--	---

#### ***Препараты, являющиеся субстратами Р-гликопротеина***

##### ***Сердечные гликозиды***

Дигоксин Однократная доза 0,5 мг	AUC <sub>0-72</sub> дигоксина ↑ 49% C <sub>max</sub> дигоксина ↑ 27%	Данные препараты рекомендуется применять с
-------------------------------------	---	--

после двух недель приема саквинавира в комбинации с ритонавиром (1000/100 мг 2 раза в день) у 16 здоровых добровольцев в перекрестном исследовании	Возможно изменение концентрации дигоксина со временем.	Необходимо уменьшить дозу дигоксина и проводить мониторирование его концентраций в плазме.
	Существенное повышение концентрации дигоксина возможно при одновременном применении саквинавира/ритонавира у пациентов, уже получающих терапию дигоксином.	

#### ***Блокаторы H2-гистаминовых рецепторов***

Ранитидин	<p>Взаимодействие между саквинавиром в комбинации с ритонавиром и ранитидином не изучалось.</p> <p>При одновременном приеме саквинавира (неусиленный режим), ранитидина и пищи увеличивалась экспозиция саквинавира (AUC на 67%) по сравнению с приемом только препарата Интерфаст и пищи.</p> <p>Данные изменения не являются клинически значимыми.</p>	Коррекции дозы не требуется.
-----------	--	------------------------------

#### ***Ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы***

Симвастатин, ловастатин	<p>Симвастатин ↑↑ Ловастатин ↑↑</p> <p>Применение симвастатина и ловастатина в комбинации с саквинавиром/ ритонавиром противопоказано.</p>	<p>Одновременное применение может привести к рабдомиолизу.</p> <p>Механизм взаимодействия неизвестен.</p>
Правастатин и флувастиatin	<p>Взаимодействие не изучалось.</p> <p>Правастатин и флувастиatin не метаболизируются изоферментом CYP3A4.</p> <p>Взаимодействия с</p>	<p>При невозможности альтернативной терапии необходимо наблюдать за состоянием пациента.</p>

	ингибиторами протеазы, включая ритонавир, не ожидается.  Нельзя исключить взаимодействия, влияющего на транспорт белков.	Если показано применение ингибиторов ГМГ-КоА-редуктазы, рекомендуется использовать правастатин или флувастиatin.
Аторвастатин и церивастатин	В меньшей степени зависит от активности изофермента CYP3A4.	В комбинации их следует использовать в меньших дозах, пациентов тщательно наблюдают на предмет развития миопатии (мышечная слабость, боль в мышцах, увеличение активности КФК).
<b>Иммунодепрессанты</b>		
Циклоспорин, сиролимус (рапамицин)	Возможно многократное увеличение концентрации иммунодепрессантов.	Рекомендуется мониторинг терапевтических концентраций данных иммунодепрессантов при одновременном приеме.
Такролимус		Одновременное применение с саквинавиром в комбинации с ритонавиром противопоказано в связи с возможным развитием жизнеугрожающих аритмий.
<b>Селективные бета2-адреномиметики продолжительного действия</b>		
Салметерол	При одновременном применении салметерола и саквинавира/ритонавира возможно увеличение концентрации салметерола в плазме.	Одновременное применение не рекомендуется из-за повышения риска развития сердечно-сосудистых осложнений, в частности удлинения интервала QT, сердцебиения, синусовой тахикардии.
<b>Наркотические анальгетики</b>		
Метадон 60–120 мг ежедневно 1 раз в день (саквинавир/ритонавир 1000/100 мг 2 раза в день) у 12 ВИЧ-негативных пациентов, получающих метадон	AUC метадона ↓ 19% (90% ДИ: 9–29)  Симптомов, приводящих к выбыванию из исследования, ни у кого из пациентов не наблюдалось.	Возможно развитие аддитивного эффекта на удлинение интервалов QT и/или PR.  Одновременное применение с саквинавиром в комбинации с ритонавиром противопоказано в связи с

		возможным развитием жизнеугрожающих аритмий.
<b>Пероральные контрацептивы</b>		
Этинилэстрадиол	Возможно снижение концентрации этинилэстрадиола.	Следует использовать другие или дополнительные методы контрацепции при одновременном применении с эстроген-содержащими контрацептивами.
<b>Ингибиторы фосфодиэстеразы 5-го типа (ИФДЭ-5)</b>		
Силденафил	<p>Одновременное применение с саквинавиром/ ритонавиром не изучалось.</p> <p>Одновременное применение саквинавира (1200 мг 3 раза в день) и силденафила (однократный прием 100 мг), являющегося субстратом изофермента CYP3A4, привело к увеличению: <math>C_{max}</math> силденафила <math>\uparrow 140\%</math> AUC силденафила <math>\uparrow 210\%</math> Саквинавир <math>\leftrightarrow</math> Силденафил не оказывал влияния на фармакокинетические параметры саквинавира.</p>	Совместное применение с саквинавиром и ритонавиром противопоказано в связи с возможным развитием жизнеугрожающих аритмий.
Тадалафил	<p>Одновременное применение с саквинавиром/ ритонавиром не изучалось.</p> <p>При одновременном приеме возможно увеличение концентраций тадалафила.</p>	Совместное применение с саквинавиром и ритонавиром противопоказано в связи с возможным развитием жизнеугрожающих аритмий.
Варденафил	<p>Одновременное применение с саквинавиром/ ритонавиром не изучалось.</p> <p>При одновременном приеме возможно увеличение концентраций варденафила.</p>	Совместное применение с саквинавиром и ритонавиром противопоказано в связи с возможным развитием жизнеугрожающих аритмий.
<b>Ингибиторы протонного насоса</b>		
Омепразол	AUC саквинавира $\uparrow 82\%$	Применение саквинавира в

<p>40 мг ежедневно (саквинавир/ритонавир 1000/100 мг у 8 здоровых добровольцев 2 раза в день)</p> <p><i>Другие ингибиторы протонного насоса</i></p>	<p>(90% ДИ: 44–131) <math>C_{max}</math> саквинавира <math>\uparrow</math> 75% (90% ДИ: 38–123) Ритонавир <math>\leftrightarrow</math></p> <p>Данные об одновременном применении саквинавира в комбинации с ритонавиром и другими ингибиторами протонного насоса отсутствуют.</p>	<p>комбинации с ритонавиром одновременно с омепразолом или другими ингибиторами протонного насоса не рекомендуется.</p>
---	---	---

#### *Другие взаимодействия*

<p><i>Грейпфрутовый сок (саквинавир/ритонавир)</i></p>	<p>Взаимодействие не изучалось.</p>	
<p><i>Грейпфрутовый сок (однократный прием) (неусиленный режим саквинавира)</i></p>	<p>Саквинавир <math>\uparrow</math> 50% (сок стандартной концентрации) Саквинавир <math>\uparrow</math> 100% (сок двойной концентрации)</p>	<p>Увеличение экспозиции не является клинически значимым.</p> <p>Коррекции дозы саквинавира не требуется.</p>
<p><i>Лекарственные препараты и биологически активные добавки (БАД), содержащие экстракт чеснока</i></p>	<p>Взаимодействие с саквинавиром/ритонавиром не изучалось.</p> <p>При неусиленном режиме: <math>AUC</math> саквинавира <math>\downarrow</math> 51% <math>C_{through} \downarrow</math> 49% (8 ч после принятия дозы) <math>C_{max}</math> саквинавира <math>\downarrow</math> 54%</p>	<p>Лекарственные препараты и БАД, содержащие экстракт чеснока, не следует применять у пациентов, принимающих саквинавир, так как это может привести к уменьшению концентрации саквинавира в плазме, потере вирусологического ответа и появлению резистентности к одному из компонентов антиретровирусной терапии.</p>
<p><i>Фитопрепараты, содержащие зверобой продырявленный (Hypericum perforatum)</i></p>	<p>Взаимодействие с саквинавиром/ритонавиром не изучалось.</p> <p>Применение фитопрепаратов, содержащих зверобой продырявленный (<i>Hypericum perforatum</i>), может привести к снижению концентрации в плазме крови вследствие наличия в них ингибиторов или индукторов изофермента CYP3A4 или Р-гликопroteина.</p>	<p>Фитопрепараты, содержащие зверобой продырявленный (<i>Hypericum perforatum</i>), не следует применять у пациентов, принимающих саквинавир, так как возможно уменьшение концентрации препарата в плазме, потеря вирусологического ответа и появление резистентности к одному из компонентов антиретровирусной терапии.</p>

		Индуцирующий эффект препаратов зверобоя продырявленного может сохраняться не менее 2-х недель после их отмены.
<b>Другие возможные взаимодействия</b>		
<b>Препараты, являющиеся субстратами изофермента CYP3A4</b>		
Дапсон, дизотирамид, хинин, фентанил, алфентанил	Хотя специальных исследований не проводилось, одновременный прием саквинавира/ритонавира и других препаратов, являющихся субстратами изофермента CYP3A4, может повысить концентрации в плазме этих препаратов.	Прием таких комбинаций противопоказан в связи с возможным развитием жизнеугрожающих аритмий.
<b>Препараты, повышающие моторику желудочно-кишечного тракта</b>		
Метоклопрамид	Нет данных об уменьшении плазменной концентрации саквинавира при одновременном применении препаратов, стимулирующих прохождение пищи по пищеварительному тракту.	
Цизаприд	Ожидается увеличение экспозиции цизаприда (AUC) и удлинение интервала QTc.	Цизаприд метаболизируется преимущественно изоферментом CYP3A4. Цизаприд противопоказан у пациентов, принимающих саквинавир в комбинации с ритонавиром, из-за возможного возникновения жизнеугрожающих аритмий.
Дифеманил	Одновременное применение не изучалось.	Совместное применение с саквинавиром и ритонавиром противопоказано в связи с возможным развитием жизнеугрожающих аритмий.
<b>Антисихотические средства (нейролептики)</b>		
Пимозид	Увеличение экспозиции пимозида.	Пимозид является субстратом изофермента

		<p>CYP3A4 и ассоциируется с удлинением интервала QT.</p> <p>Пимозид противопоказан у пациентов, принимающих саквинавир в комбинации с ритонавиром, в связи с возможным развитием жизнеугрожающих аритмий.</p>
Кветиапин	Возможно увеличение концентрации кветиапина при одновременном применении с саквинавиром/ ритонавиром.	Одновременное применение с саквинавиром противопоказано вследствие риска увеличения токсичности кветиапина и тяжести нежелательных реакций.
Клизапин, галоперидол, мезоридазин, фенотиазин, сертиндол, сультоприд, тиоридазин, зипрасидон, хлорпромазин	Одновременное применение саквинавира/ ритонавира с данными препаратами не изучалось.	Одновременное применение с саквинавиром в комбинации с ритонавиром противопоказано в связи с возможным развитием жизнеугрожающих аритмий.
<b>Вазодилататоры</b>		
Винкамин (для внутривенного введения)		Одновременное применение с саквинавиром в комбинации с ритонавиром противопоказано в связи с возможным развитием жизнеугрожающих аритмий.
<b>Альфа1-адреноблокаторы</b>		
Алфузозин	Возможно повышение концентрации алфузозина в плазме крови.	Совместное применение алфузозина и саквинавира в комбинации с ритонавиром противопоказано в связи с возможным развитием артериальной гипотензии.
<b>Антигистаминные средства</b>		
Терфенадин, астемизол	AUC терфенадина ↑ ассоциируется с удлинением интервала QTc.	Терфенадин противопоказан пациентам, принимающим саквинавир в комбинации с ритонавиром, в связи с возможным развитием жизнеугрожающих

		аритмий.
Мизоластин (саквинавир/ритонавир)		Из-за высокой вероятности аналогичного взаимодействия, саквинавир в комбинации с ритонавиром также не следует назначать вместе с астемизолом.

Условные обозначения: ↓ - уменьшение, ↑ - увеличение, ↔ - не изменяется, ↑↑ - значительное увеличение.

#### *Другие возможные взаимодействия*

Хотя специальных исследований не проводилось, одновременный прием саквинавира/ритонавира и других препаратов, являющихся субстратами изофермента CYP3A4 (дапсона, дизопирамида, хинина, фентанила, альфентанила) может повысить концентрации в плазме этих препаратов, поэтому применение таких комбинаций противопоказано в связи с возможным развитием жизнеугрожающих аритмий (см. раздел «Противопоказания»).

Одновременный прием препарата Интерфаст в комбинации с ритонавиром и препаратов, являющихся субстратами Р-гликопротеина (например, азитромицина) может привести к увеличению концентраций этих препаратов в плазме, поэтому при применении таких комбинаций следует наблюдать за состоянием пациента на предмет появления симптомов токсичности.

К увеличению концентраций саквинавира в плазме приводит также назначение комбинаций с ингибиторами изофермента CYP3A4. В ходе клинических исследований при одновременном применении кетоконазола (мощного ингибитора изофермента CYP3A4) и препарата Интерфаст в комбинации с ритонавиром, не отмечалось увеличение фармакокинетической экспозиции саквинавира. Предполагается, что применение второго ингибитора изофермента CYP3A4 в составе терапии препятствуют увеличению концентрации саквинавира в плазме. В таком случае рекомендуется наблюдать за состоянием пациентов, получающих препарат Интерфаст в комбинации с ингибиторами изофермента CYP3A4, на предмет появления симптомов токсичности.

Одновременный прием с препаратами, являющимися индукторами изофермента CYP3A4 или Р-гликопротеина, напротив, может снизить концентрации саквинавира в плазме. Информация об уменьшении концентрации препарата Интерфаст в плазме при совместном приеме с препаратами, уменьшающими время прохождения пищи по желудочно-кишечному тракту, отсутствует. Ритонавир может оказывать влияние на фармакокинетику других препаратов, так как сам является мощным ингибитором изофермента CYP3A4 и Р-гликопротеина, а также индуктором энзима некоторых изоферментов цитохрома P450.

### **Особые указания**

#### *Перед началом терапии*

Саквинавир применяется только в комбинации с ритонавиром.

Пациентов нужно информировать, что саквинавир не излечивает ВИЧ-инфекцию и что у них могут развиваться ассоциированные с ней заболевания, включая оппортунистические инфекции. Также необходимо сообщить о возможности развития нежелательных явлений при комбинированном применении нескольких препаратов. Несмотря на прием антиретровирусных препаратов, нельзя исключить риск передачи ВИЧ половым путем. Необходимо соблюдать меры предосторожности.

#### *Нарушения проводимости сердца и реполяризации*

Наблюдалось дозозависимое удлинение интервалов QT и PR у здоровых добровольцев, получавших саквинавир.

Саквинавир противопоказан пациентам с врожденным или документально подтвержденным приобретенным удлинением интервала QT, электролитными нарушениями, особенно с нескорректированной гипокалиемией. Наличие в семейном анамнезе пациента случаев внезапной смерти в молодом возрасте позволяет предположить наличие врожденного удлинения интервала QT.

Совместное применение саквинавира с препаратами, обладающими одновременно фармакокинетическим взаимодействием и способностью удлинять интервал QT и/или PR, противопоказано (см. разделы «Противопоказания» и «Взаимодействие с другими лекарственными средствами»).

Не рекомендуется применение саквинавира у пациентов, одновременно получающих другие лекарственные препараты, обладающие способностью к удлнению интервала QT. В случае необходимости совместного использования следует соблюдать осторожность и провести электрокардиографическое исследование (ЭКГ) при возникновении симптомов аритмии. Следует соблюдать осторожность при применении саквинавира у пациентов с сопутствующими структурными заболеваниями сердца, нарушениями проводимости

сердца, ишемической болезнью сердца или кардиомиопатией, поскольку такие пациенты имеют повышенный риск развития нарушений сердечной проводимости.

Следует прекратить терапию саквинавиром в случае возникновения значимых аритмий, удлинения интервала QT или PR. Чаще всего изменения интервала QT, связанные с приемом саквинавира, возможны у женщин и лиц пожилого возраста.

Не следует превышать рекомендованные дозы саквинавира, поскольку степень удлинения интервалов QT и PR может возрастать с увеличением концентрации препарата.

Применение саквинавира в дозе 2000 мг 1 раз в сутки и ритонавира в дозе 100 мг 1 раз в сутки не рекомендуется, поскольку влияние подобной комбинации на риск удлинения интервала QT не изучалось.

#### *Пациенты, начинаящие терапию саквинавиром*

До начала терапии следует провести ЭКГ. Не следует начинать терапию саквинавиром, если длительность интервала QT >450 мс. Пациентам с длительностью интервала QT <450 мс до начала лечения рекомендуется в ходе терапии проводить ЭКГ. Пациентам, ранее не получавшим терапию саквинавиром и начинающим терапию саквинавиром, рекомендуется назначать саквинавир в дозе 500 мг и ритонавир в дозе 100 мг 2 раза в сутки в течение первых 7 дней с последующим изменением дозы до 1000 мг и 100 мг 2 раза в сутки соответственно. При исходной длительности интервала QT <450 мс пациентам, ранее не получавшим терапию саквинавиром и начинающим терапию саквинавиром, рекомендуется провести повторное ЭКГ-исследование через 10 дней после начала терапии. Терапию саквинавиром следует прекратить, если интервал QT увеличен >480 мс или если интервал QT увеличился на более чем 20 мс по сравнению с исходным значением (см. раздел «Фармакодинамика», подраздел «Влияние на показатели электрокардиографии»).

#### *Пациенты, продолжающие терапию саквинавиром, при необходимости назначения сопутствующей терапии препаратами, способными удлинять интервал QT, или пациенты, получающие терапию препаратами, способными удлинять интервал QT, при необходимости назначения терапии саквинавиром и если альтернативная терапия отсутствует, а польза превышает риск*

До начала сопутствующей терапии необходимо провести ЭКГ. Не следует назначать сопутствующую терапию, если интервал QT ≥450 мс (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами»). Необходимо провести повторное ЭКГ-исследование, если исходно длительность интервала QT <450 мс. При увеличении длительности интервала QT >480 мс или более чем 20 мс после присоединения

сопутствующей терапии лечащий врач в зависимости от клинической ситуации должен принять решение об отмене саквинавира и/или сопутствующей терапии.

#### ***Пациенты с нарушениями функции печени легкой и средней степеней тяжести***

Терапия саквинавиром в комбинации с ритонавиром противопоказана пациентам с декомпенсированными заболеваниями печени (см. раздел «Противопоказания»). У пациентов с хроническим гепатитом В или С, получающих комбинированную антиретровирусную терапию, повышен риск развития нежелательных явлений (в том числе фатальных) со стороны печени. В случае одновременного применения у пациента антиретровирусной терапии гепатита В или С необходимо тщательно ознакомиться с медицинской информацией по используемым лекарственным препаратам.

При одновременном использовании комбинированной антиретровирусной терапии у пациентов с нарушением функции печени в анамнезе (включая хронический активный гепатит) повышается частота развития нарушения функций печени. Следует тщательно мониторировать симптомы и признаки нарушения функций печени. При появлении признаков ухудшения функции печени следует прервать или отменить терапию.

У ВИЧ-инфицированных пациентов с нарушениями функции печени легкой и средней степеней тяжести коррекции дозы не требуется (данные ограничены). Тем не менее, в силу различной экспозиции препарата в данной популяции рекомендуется тщательное мониторирование профиля безопасности (включая признаки аритмии) и вирусологического ответа (см. разделы «Способ применения и дозы» и «Фармакологические свойства»). После начала терапии саквинавиром у пациентов с гепатитом В или С, циррозом, хроническим алкоголизмом и/или другими заболеваниями печени наблюдались случаи ухудшения заболевания печени или развитие портальной гипертензии, сопровождавшейся желтухой, асцитом, отеками и варикозным расширением вен пищевода (у нескольких пациентов – с летальным исходом). Причинно-следственная связь между развитием портальной гипертензии и терапией саквинавиром не установлена. Следует тщательно мониторировать симптомы и признаки гепатотоксичности.

#### ***Пациенты с нарушением функции почек***

Через почки выводится незначительная часть препарата, поэтому первоначально корректировать дозу препарата у пациентов с нарушением функции почек не нужно. Однако исследований у пациентов с тяжелой почечной недостаточностью не проводилось, в связи с чем следует соблюдать осторожность при применении саквинавира такими пациентами.

#### ***Детский и пожилой возраст***

Для ВИЧ-инфицированных детей в возрасте от 2 до 16 лет эффективные дозы саквинавира, потенциально не вызывающие удлинение интервалов QT и PR, не установлены.

Опыт применения у пациентов старше 60 лет ограничен. Пациенты пожилого и старческого возраста могут быть более восприимчивы к влиянию препарата на интервал QT и/или PR.

### ***Сахарный диабет***

У пациентов, получающих ингибиторы протеазы ВИЧ, описаны случаи впервые выявленного сахарного диабета, гипергликемии или декомпенсации сопутствующего сахарного диабета. В некоторых случаях гипергликемия была резко выраженной, иногда сопровождалась кетоацидозом. При этом у многих пациентов имели место сопутствующие заболевания, иногда требовавшие назначения препаратов, обладающих способностью повышать концентрацию глюкозы в крови и вызывать развитие сахарного диабета или гипергликемии. Причинно-следственная связь между терапией ингибиторами протеазы ВИЧ и развитием гипергликемии и сахарного диабета не установлена.

### ***Гемофилия***

При лечении ингибиторами протеазы ВИЧ описаны случаи усиления кровотечений, в том числе спонтанное образование подкожных гематом и гемартрозов у больных гемофилией типа А и В. Некоторым пациентам приходилось увеличивать дозу фактора свертывания крови VIII. Более чем в половине случаев лечение ингибитором протеазы ВИЧ было продолжено или возобновлено. Можно предположить причинно-следственную связь этих нежелательных явлений с применением ингибиторов протеазы ВИЧ, хотя механизм подобного эффекта не изучен. Больных гемофилией необходимо предупредить о возможном усилении кровотечений.

### ***Перераспределение жировой ткани***

При проведении комбинированной антиретровирусной терапии отмечалось перераспределение или отложение жира, в том числе ожирение по центральному типу, отложение жира на дорзальной поверхности шеи и спины («бычий горб»), уменьшение подкожной жировой клетчатки на конечностях, увеличение молочных желез за счет жировых отложений, а также «кушингоид» (округлое, лунообразное лицо, гиперемия лица, туловищный тип ожирения, отложение жировой ткани в надключичных ямках). Перераспределение жировой ткани ассоциируется с такими метаболическими нарушениями, как гипертриглицеридемия, гиперхолестеринемия, инсулинерезистентность и гипергликемия. Тяжесть этих нарушений варьирует как внутри класса, так и между классами антиретровирусных препаратов (ингибиторы протеазы ВИЧ, ненуклеозидные

ингибиторы обратной транскриптазы, нуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы). К факторам, повышающим риск развития липодистрофии, относятся: пожилой возраст, длительность терапии, применение ставудина, гипертриглицеридемия, гиперлактатемия. Диагностика включает оценку физикальных признаков перераспределения жировой ткани, исследование гликемии и липидов крови. В случае обнаружения данных изменений следует рассмотреть вопрос об изменении антиретровирусной терапии и/или принять меры, направленные на коррекцию подобных отклонений (например, назначение гиполипидемических средств). В настоящее время механизм развития метаболических нарушений и отдаленные последствия, такие как повышение риска сердечно-сосудистых заболеваний, неизвестны.

Применение саквинавира в комбинации с ритонавиром в дозах больше 1000/100 мг 2 раза в день обычно сопровождается увеличением частоты нежелательных явлений, так как концентрации саквинавира в плазме в присутствии ритонавира увеличиваются. В некоторых случаях совместное применение саквинавира и ритонавира приводило к тяжелым нежелательным явлениям, в основном к развитию диабетического кетоацидоза и нарушению функций печени, особенно у пациентов, ранее страдавших заболеваниями печени.

#### ***Синдром иммунной реактивации (синдром воспалительного восстановления иммунитета)***

В ходе начальной фазы комбинированной антиретровирусной терапии, в том числе саквинавиром, у пациентов с тяжелым иммунодефицитом может возникнуть системная воспалительная реакция на ранее бессимптомно протекавшие или оппортунистические инфекции и аутоантигены или усиление симптоматики. Данная реакция может вызвать серьезные клинические состояния или обострение симптомов, которые, в свою очередь, могут потребовать дальнейшей оценки и лечения.

Синдром иммунной реактивации также может проявляться развитием аутоиммунных нарушений (например, болезнь Грейвса и аутоиммунного гепатита), которые развиваются в различные сроки терапии. Развитие аутоиммунных нарушений возможно спустя много месяцев после начала терапии. Характерными примерами являются цитомегаловирусный ретинит, генерализованная и/или очаговая микобактериальная инфекция и пневмония, вызванная *Pneumocystis carinii*. При возникновении любого симптома воспаления следует провести диагностику и назначить лечение.

#### ***Остеонекроз***

Несмотря на то, что этиология остеонекроза считается многофакторной (включая использование глюкокортикоидов, потребление алкоголя, тяжелую

иммуносупрессию, высокий индекс массы тела), зарегистрированы случаи остеонекроза, в частности, у пациентов с распространенной ВИЧ-инфекцией и/или при длительной комбинированной антиретровирусной терапии. Следует рекомендовать пациентам обратиться к врачу при возникновении боли в суставах, скованности в суставах или затруднении движения.

#### ***Хроническая диарея или мальабсорбция***

Информация о применении саквинавира в усиленном режиме у пациентов, страдающих хронической диареей или мальабсорбцией, отсутствует.

Данные об эффективности и безопасности применения саквинавира в неусиленном режиме у таких пациентов ограничены и не позволяют судить о возможности получения ими субтерапевтических концентраций саквинавира.

#### ***Взаимодействие с другими лекарственными препаратами и/или пищевыми продуктами***

Необходимо соблюдать осторожность при одновременном применении саквинавира и препаратов, являющихся субстратом изофермента CYP3A4 или P-gp, так как саквинавир может оказывать влияние и изменять фармакокинетику последних. Препараты, потенциально взаимодействующие с саквинавиром, представлены в разделе «Взаимодействие с другими лекарственными средствами».

#### ***Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами***

Специальных исследований не проводилось. Данные о возможности препарата Интерфаст оказывать влияние на способность управлять транспортными средствами и механизмами отсутствуют. Однако при работе с машинами и механизмами следует учитывать профиль безопасности препарата. Головокружение, усталость, нарушение зрения были зарегистрированы при приеме препарата Интерфаст, при появлении описанных нежелательных явлений от выполнения указанных видов деятельности следует воздержаться.

#### ***Форма выпуска***

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг

##### *Первичная упаковка лекарственного препарата.*

По 10 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой печатной лакированной.

По 60, 120, 240, 360 таблеток в банку полимерную из полиэтилена с крышкой натягиваемой с контролем первого вскрытия. На банки наклеивают этикетки из бумаги этикеточной или писчей, или из полимерных материалов, самоклеящиеся.

##### *Вторичная упаковка лекарственного препарата.*

По 6 или 10 контурных ячейковых упаковок вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона для потребительской тары подгрупп хромовый или хром-эрзац. На пачку может наклеиваться самоклеящаяся этикетка с маркировкой. Пачки помещают в групповую упаковку.

По 1 банке вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона для потребительской тары подгрупп хромовый или хром-эрзац. На пачку может наклеиваться самоклеящаяся этикетка с маркировкой. Дополнительно на пачку могут наклеивать один или два прозрачных фиксирующих стикера. Пачки помещают в групповую упаковку.

### **Срок годности**

4 года. Не применять по истечении срока годности.

### **Условия хранения**

Хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 25 °C.

Хранить в недоступном для детей месте.

### **Условия отпуска**

Отпускают по рецепту.

### **Владелец регистрационного удостоверения**

Российская Федерация

АО «Фармасинтез»

664007, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Красногвардейская, д.23, офис 3.

Тел.: +7 (3952) 55-03-55, факс: +7 (3952) 55-03-25

Адрес электронной почты: [info@pharmasyntez.com](mailto:info@pharmasyntez.com)

### **Производитель**

Российская Федерация

АО «Фармасинтез»

г. Иркутск, ул. Р. Люксембург, д. 184.

### **Организация, принимающая претензии потребителей:**

Российская Федерация

АО «Фармасинтез»

Адрес: 664040, г. Иркутск, ул. Р. Люксембург, д. 184

Тел.: 8-800-100-15-50

Адрес электронной почты: [info@pharmasyntez.com](mailto:info@pharmasyntez.com)