


МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНСТРУКЦИЯ



по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Пиперазин
таблетки, 500 мг

ОАО "Фармстандарт-Лексредства", Россия

Изменение № 5

Дата внесения Изменения «___» ³⁰⁰¹¹⁹ _____ 20__ г.

Старая редакция	Новая редакция
<p>ИНСТРУКЦИЯ</p> <p>по применению лекарственного препарата для медицинского применения</p> <p>Пиперазин</p> <p>Торговое название препарата: Пиперазин</p> <p>МНН: пиперазина адипинат</p> <p>Химическое название: гексагидропиразина адипинат</p> <p>Состав на одну таблетку</p> <p><i>Активное вещество:</i> пиперазина адипинат – 0,5 г;</p> <p><i>вспомогательные вещества:</i> крахмал картофельный – 0,077 г, тальк – 0,018 г,</p>	<p>ИНСТРУКЦИЯ</p> <p>ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА</p> <p>Пиперазин</p> <p>Торговое наименование: Пиперазин</p> <p>Международное непатентованное или группировочное наименование: Пиперазина адипинат</p> <p>Химическое наименование: гексагидропиразина адипинат</p> <p>Состав на одну таблетку</p> <p><i>Действующее вещество:</i> пиперазина адипинат – 500,0 мг;</p> <p><i>вспомогательные вещества:</i> крахмал картофельный – 77,0 мг, тальк – 18,0 мг,</p>

Старая редакция	Новая редакция
<p>желатин (желатин медицинский) – 0,005 г.</p> <p>Описание. Таблетки белого цвета, плоскоцилиндрической формы, с фаской и риской.</p> <p>Противопоказания Органические заболевания центральной нервной системы. Гиперчувствительность. Хроническая почечная недостаточность, беременность и период лактации. Детский возраст до 3 лет (для данной дозировки).</p> <p>Раздел отсутствует</p> <p>ФОРМА ВЫПУСКА Таблетки 0,5 г. По 10 или 20 таблеток в контурную ячейковую упаковку. По 10 таблеток в контурную безъячейковую упаковку. По 30, 50 или 100 таблеток в банке полимерной. 1, 2, 3 или 5 контурных упаковок или банку полимерную вместе с инструкцией по применению помещают в пачку.</p>	<p>желатин – 5,0 мг.</p> <p>Описание. Круглые, плоскоцилиндрические таблетки белого цвета, с фаской и риской.</p> <p>Противопоказания Органические заболевания центральной нервной системы. Гиперчувствительность. Хроническая почечная недостаточность, беременность и период грудного вскармливания. Детский возраст до 3 лет (для данной дозировки).</p> <p>Применение при беременности и в период грудного вскармливания Применение препарата Пиперазин противопоказано при беременности. При необходимости назначения препарата в период грудного вскармливания кормление грудью следует прекратить.</p> <p>Форма выпуска Таблетки, 0,5 г. По 10 или 20 таблеток в контурной ячейковой упаковке из пленки поливинилхлоридной или светозащитной и фольги алюминиевой печатной лакированной. По 30, 50 или 100 таблеток в банки полимерные для хранения лекарственных средств и витаминов с крышками из</p>

Старая редакция	Новая редакция
<p>Допускается контурные ячейковые или безъячейковые упаковки с равным количеством инструкций по применению помещать в групповую упаковку.</p> <p>Срок годности 5 лет. По истечении срока годности препарат применять не следует.</p> <p>Условия отпуска По рецепту.</p> <p>Наименование и адрес производителя/организация, принимающая претензии ОАО «Фармстандарт-Лексредства», 305022, Россия, г. Курск, ул. 2-я Агрегатная, 1а/18, тел./факс: (4712) 34-03-13 www.pharmstd.ru</p>	<p>полиэтилена высокого давления с контролем или без контроля вскрытия.</p> <p>1, 2, 3 или 5 контурных ячейковых упаковок или 1 банку вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.</p> <p>Допускается контурные ячейковые упаковки помещать в групповую упаковку с равным количеством инструкций по применению.</p> <p>Срок годности 5 лет. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.</p> <p>Условия отпуска Отпускают по рецепту.</p> <p>Наименование и адрес производителя/организация, принимающая претензии: ОАО "Фармстандарт-Лексредства", 305022, Россия, г. Курск, ул. 2-я Агрегатная, 1а/18, тел./факс: (4712) 34-03-13, www.pharmstd.ru</p>

Представитель
ОАО «Фармстандарт-Лексредства»



С.В. Барькин