

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ИНСТРУКЦИЯ

ЛП - 008227-030622

СОГЛАСОВАНО

по медицинскому применению лекарственного препарата

**Сорбо Плюс**

**Регистрационный номер:**

**Торговое наименование препарата:** Сорбо Плюс

**Группировочное наименование:** кремния диоксид коллоидный

**Лекарственная форма:** порошок для приготовления суспензии для приема  
внутри

**Состав:**

В 1 г препарата содержится:

*действующее вещество:* кремния диоксид коллоидный – 1,0 г

**Описание:** легкий белый или белый с голубоватым оттенком порошок, без запаха. При взбалтывании с водой образует суспензию от белого до почти белого цвета.

**Фармакотерапевтическая группа:** энтеросорбирующее средство

**Код АТХ:** А07В

**Фармакологические свойства**

Сорбо Плюс – неорганический, неселективный, полифункциональный энтеросорбент на основе высокодисперсного кремнезема с размером частиц до 0,09 мкм, с химической формулой  $\text{SiO}_2$ . Удельная площадь поверхности препарата порядка 300 м<sup>2</sup>/г. Емкость адсорбции препарата при употреблении внутри – не менее 220 мг/г.

**Фармакодинамика**

Сорбо Плюс обладает выраженными сорбционными и детоксикационными свойствами. В просвете желудочно-кишечного тракта препарат связывает и выводит из организма эндогенные и экзогенные токсические вещества различной природы, включая патогенные бактерии и бактериальные токсины, антигены, пищевые аллергены, лекарственные препараты и яды, соли тяжелых металлов, радионуклиды, алкоголь. Сорбо Плюс сорбирует также некоторые

продукты обмена веществ организма, в том числе избыток билирубина, мочевины, холестерина и липидных комплексов, а также метаболиты, ответственные за развитие эндогенного токсикоза.

### **Фармакокинетика**

Сорбо Плюс не расщепляется и не всасывается в желудочно-кишечном тракте и выделяется в неизменном виде.

### **Показания для применения**

- Острые и хронические интоксикации различного происхождения у взрослых и детей.
- Острые кишечные инфекции любого генеза, включая пищевые токсикоинфекции, а также диарейный синдром неинфекционного происхождения, дисбактериоз (в составе комплексной терапии).
- Гнойно-септические заболевания, сопровождающиеся выраженной интоксикацией.
- Острые отравления сильнодействующими и ядовитыми веществами, в том числе лекарственными препаратами и алкоголем, алкалоидами, солями тяжелых металлов и др.
- Пищевая и лекарственная аллергия.
- Гипербилирубинемия (вирусный гепатит и другие желтухи) и гиперазотемия (хроническая почечная недостаточность).
- Жителям экологически неблагоприятных регионов и работникам вредных производств с целью профилактики.

### **Противопоказания для применения**

- Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в фазе обострения.
- Кровотечения из желудочно-кишечного тракта.
- Атония кишечника.
- Индивидуальная непереносимость препарата.



## **Применение при беременности и в период грудного вскармливания**

Применение Сорбо Плюс при беременности и в период грудного вскармливания не противопоказано.

## **Способ применения и дозы**

Сорбо Плюс принимают внутрь только в виде водной суспензии!

Для получения суспензии необходимое количество препарата тщательно размешивают в  $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{2}$  стакана воды. Рекомендуется готовить свежую суспензию перед каждым приемом препарата и выпивать ее за 1 час до еды или приема других лекарств.

Средняя суточная доза у взрослых 0,1-0,2 г на 1 кг массы тела (6-12 г).

Препарат принимается в 3-4 приема в течение суток.

Максимальная суточная доза у взрослых 0,33 г на 1 кг массы тела (20 г).

Доза для детей рассчитывается в зависимости от массы тела (см. таблицу).

## **Таблица рекомендуемых доз препарата Сорбо Плюс**

Вес пациента	Дозировка	Объем воды
до 10 кг	0,5 – 1,5 чайные ложки в сутки	30-50 мл
11-20 кг	1 чайная ложка «без горки» на 1 прием	30-50 мл
21-30 кг	1 чайная ложка «с горкой» на 1 прием	50-70 мл
31-40 кг	2 чайные ложки «с горкой» на 1 прием	70-100 мл
41-60 кг	1 столовая ложка «с горкой» на 1 прием	100 мл
более 60 кг	1-2 столовые ложки «с горкой» на 1 прием	100-150 мл

1 чайная ложка «с горкой» - 1 г препарата,

1 столовая ложка «с горкой» - 2,5-3 г препарата.

Срок хранения суспензии не более 48 часов.

В случаях пищевой аллергии препарат принимается непосредственно перед приемом пищи, суточную дозу Сорбо Плюс разделяют в течение дня на три приема.

Длительность лечения зависит от диагноза и тяжести заболевания, курс лечения при острых интоксикациях 3-5 дней; при аллергических

заболеваниях, хронических интоксикациях продолжительность лечения до 10-14 дней. Повторные курсы спустя 2-3 недели, по рекомендации врача.

### **Особенности применения Сорбо Плюс при различных заболеваниях**

#### *1. Пищевая интоксикация и острые отравления*

Начинать терапию рекомендуется с промывания желудка 0,5-1 % суспензией Сорбо Плюс. При тяжелых отравлениях в первые сутки промывание желудка проводят через зонд каждые 4-5 часов, наряду с этим препарат дают внутрь. Разовая доза у взрослых может составлять 0,1-0,15 г/кг массы тела пациента по 2-3 раза в день.

#### *2. Острые кишечные инфекции*

Рекомендуется начать лечение Сорбо Плюсом в первые часы или сутки заболевания в комплексе с другими способами лечения. В первые сутки суточная доза дается в течение 5-ти часов с интервалами между приемами в 1 час. Во 2-е сутки суточная доза дается в 4 приема в течение суток. Продолжительность лечения – 3-5 дней.

#### *3. Лечение вирусного гепатита*

В комплексной терапии вирусного гепатита Сорбо Плюс применяют как детоксицирующее средство в обычных дозах в течение первых 7-10 дней болезни.

#### *4. Аллергические заболевания*

При острых аллергических реакциях лекарственного или пищевого генеза рекомендуется предварительное промывание желудка и кишечника 0,5-1 % суспензией Сорбо Плюс. Затем препарат дают в обычных дозах до наступления клинического эффекта. При хронических пищевых аллергиях рекомендуются курсы Сорбо Плюс по 7-10-15 дней, препарат принимают непосредственно перед едой. Аналогичные курсы показаны при острой рецидивирующей крапивнице и отеке Квинке, эозинофилии накануне на фоне обострения поллинозов и других атопий.



### *5. Хроническая почечная недостаточность*

Используют курсы лечения Сорбо Плюсом в суточной дозе 0,15-0,2 г/кг тела в течение 25-30 дней с перерывом 2-3 недели.

#### **Побочное действие**

Редко – аллергические реакции, диспепсия, запоры.

При длительном, более 14 дней, приеме Сорбо Плюса возможно нарушение всасывания витаминов, кальция в связи с чем рекомендуется профилактический прием поливитаминных препаратов, кальция.

#### **Передозировка**

Случаев передозировки при применении кремния диоксида коллоидного в рекомендуемых терапевтических дозах не выявлено.

#### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Возможно снижение лечебного эффекта одновременно принимаемых внутрь лекарств.

#### **Влияние на способность управлять транспортными средствами и механизмами**

Не отмечено влияния кремния диоксида коллоидного на способность управлять транспортными средствами или другими потенциально опасными механизмами.

#### **Форма выпуска**

Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь.

По 12/25/50 г в банки из полипропилена, укупоренные крышками из аналогичного материала с индукционными вкладышами.

На банку наклеивают этикетку из бумаги писчей или этикеточной, или этикетки самоклеящиеся.

По 1 банке вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона.

**Срок годности**

3 года.

Не применять по истечении срока годности.

**Условия хранения**

При температуре не выше 25 °С.

После вскрытия упаковки хранить в плотно закрывающейся емкости.

Хранить в недоступном для детей месте.

**Условия отпуска**

Без рецепта.

**Производитель**

ЗАО «ВИФИТЕХ», Россия

**Юридический адрес:** 142279, Московская обл., Серпуховский район, рабочий пос. Оболенск, ГНЦ ПМ.

**Адрес места производства лекарственного препарата:** Московская обл., Серпуховский муниципальный район, городское поселение Оболенск, район рабочего поселка Оболенск, шоссе Оболенское, стр. 20.

**Владелец регистрационного удостоверения/организация, принимающая претензии потребителей**

ООО «Б-ФАРМ», Россия

**Юридический адрес:**

143026, Московская область, г. о. Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков, стр. 2А, ком. 2.

**Почтовый адрес:**

143026, Московская область, г. о. Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков, д. 2, а/я 80/1039.

Тел.: +7 (499) 145-59-99, тел. Горячей линии: +7 (926) 601-20-45.

e-mail: [inbox@b-pharm.ru](mailto:inbox@b-pharm.ru)

Генеральный директор

«ООО Б-ФАРМ»



Кульчицкий П.С.