

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ
ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Метацин

(наименование лекарственного препарата)

таблетки 2 мг

(лекарственная форма, дозировка)

ООО «ФАРМАКОР ПРОДАКШН», Россия

(наименование производителя, страна)

Изменение № 1


Дата внесения Изменения с «04» 10 2019 г.

Старая редакция	Новая редакция
<p align="center">ИНСТРУКЦИЯ по медицинскому применению препарата Метацин</p> <p>Торговое название: Метацин</p> <p>Международное непатентованное название: метоциния йодид</p> <p>Фармакодинамика Метацин оказывает преимущественно блокирующее влияние на периферические м-холинорецепторы, снижает тонус гладкой мускулатуры внутренних органов, уменьшает секрецию желез желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), бронхиальных и потовых желез, повышает частоту сердечных сокращений (ЧСС), улучшает атриовентрикулярную проводимость (AV). По сравнению с атропином, в меньшей степени вызывает расширение зрачка, паралич аккомодации и повышение</p>	<p align="center">МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ</p> <p align="center">ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА Галакси</p> <p>Торговое наименование: Галакси</p> <p>Международное непатентованное или группировочное наименование: метоциния йодид</p> <p>Фармакодинамика Препарат Галакси оказывает преимущественно блокирующее влияние на периферические м-холинорецепторы, снижает тонус гладкой мускулатуры внутренних органов, уменьшает секрецию желез желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), бронхиальных и потовых желез, повышает частоту сердечных сокращений (ЧСС), улучшает атриовентрикулярную проводимость (AV). По сравнению с атропином, в меньшей степени вызывает расширение зрачка, паралич аккомодации и</p>

120561

Старая редакция	Новая редакция
<p>внутриглазного давления.</p> <p>Применение при беременности и в период лактации Назначать метацин в период беременности (кроме профилактики самопроизвольного аборта или преждевременных родов) не рекомендуется. При необходимости назначения препарата в период лактации следует прекратить грудное вскармливание.</p> <p>Формы выпуска Таблетки 2 мг. По 10 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой печатной лакированной. 1 контурная ячейковая упаковка с инструкцией по применению в картонной пачке.</p> <p>Претензии направлять в адрес предприятия-производителя: ООО «ФАРМАКОР ПРОДАКШН», Россия Адрес производства: 198216, г. Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 140, лит. Ж Адрес юридический: 194021, г. Санкт-Петербург, 2-й Муринский пр., д. 41, лит. А</p> <p>тел./факс: (812) 325-23-15</p>	<p>повышение внутриглазного давления.</p> <p>Применение при беременности и в период грудного вскармливания Назначать препарат Галакси в период беременности (кроме профилактики самопроизвольного аборта или преждевременных родов) не рекомендуется. При необходимости назначения препарата в период лактации следует прекратить грудное вскармливание.</p> <p>Форма выпуска Таблетки 2 мг. По 10 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой печатной лакированной. 1, 2, 3, 5, 6, 9 или 10 контурных ячейковых упаковок с инструкцией по применению в картонной пачке.</p> <p>Владелец регистрационного удостоверения ООО «ФАРМАКОР ПРОДАКШН», Россия 197375, г. Санкт-Петербург, ул. Репищева, д. 14, корп. 5, оф. 247</p> <p>Организация, принимающая претензии потребителей: ООО «ФАРМАКОР ПРОДАКШН», Россия Адрес производства: 198216, г. Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 140, лит. Ж Адрес юридический: 197375, г. Санкт-Петербург, ул. Репищева, д. 14, корп. 5, оф. 247</p> <p>тел.: (812) 677-89-82</p>

Зам. Генерального директора
ООО «ФАРМАКОР ПРОДАКШН»



И.В. Смородинов

120561