

## ИНСТРУКЦИЯ

## ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

## ТРЕВИКТА

суспензия для внутримышечного введения пролонгированного действия,

175 мг / 0,875 мл, 263 мг / 1,315 мл, 350 мг / 1,75 мл, 525 мг / 2,625 мл

Янссен Фармацевтика НВ, Бельгия

Изменение № 3

Дата внесения Изменения « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Старая редакция	Новая редакция
<p><b>Способ применения и дозы</b> <i>Способ применения</i></p> <p>...</p> <p><i>ранее по тексту без изменений</i></p> <p>Рекомендуемый размер игл для введения препарата ТРЕВИКТА в дельтовидную мышцу определяется массой тела пациента. У пациентов массой менее 90 кг рекомендуется использовать иглы длиной 25 мм. У пациентов массой <math>\geq 90</math> кг рекомендуется использовать иглы длиной 51 мм. Препарат следует вводить в центр дельтовидной мышцы. Необходимо чередовать инъекции между двумя дельтовидными мышцами.</p> <p>Для введения препарата ТРЕВИКТА в ягодичную мышцу рекомендуется использовать иглы длиной 51 мм независимо от массы тела. Препарат вводят в наружный верхний квадрант ягодичной мышцы. Необходимо чередовать инъекции между двумя ягодичными мышцами.</p>	<p><b>Способ применения и дозы</b> <i>Способ применения</i></p> <p>...</p> <p><i>ранее по тексту без изменений</i></p> <p>Рекомендуемый размер игл для введения препарата ТРЕВИКТА в дельтовидную мышцу определяется массой тела пациента. У пациентов массой менее 90 кг рекомендуется использовать короткие иглы с розовой канюлей. У пациентов массой <math>\geq 90</math> кг рекомендуется использовать длинные иглы с желтой канюлей. Препарат следует вводить в центр дельтовидной мышцы. Необходимо чередовать инъекции между двумя дельтовидными мышцами.</p> <p>Для введения препарата ТРЕВИКТА в ягодичную мышцу рекомендуется использовать длинные иглы с желтой канюлей независимо от массы тела. Препарат вводят в наружный верхний квадрант ягодичной мышцы. Необходимо</p>

15 20 22

Старая редакция	Новая редакция
<p><i>Далее по тексту без изменений</i></p>	<p>чередовать инъекции между двумя ягодичными мышцами. <i>Далее по тексту без изменений</i></p>
<p><b>Форма выпуска</b></p> <p>Суспензия для внутримышечного введения пролонгированного действия, 175 мг / 0,875 мл; 263 мг / 1,315 мл; 350 мг / 1,75 мл; 525 мг / 2,625 мл.</p> <p>По 0,875, 1,315, 1,75, 2,625 мл препарата в шприце из циклолефинового сополимера с наконечником из бромбутила и уплотнителем из бромбутила с покрытием Flurotec<sup>®</sup>, снабженном ограничителем обратного хода поршня. В комплект препарата входят 2 иглы для внутримышечных инъекций (в дельтовидную и ягодичную мышцы). Предварительно заполненный шприц с препаратом и 2 иглы в пластиковом поддоне, закрытом полиэтиленовой пленкой, помещают вместе с инструкцией по применению в картонную пачку.</p>	<p><b>Форма выпуска</b></p> <p>Суспензия для внутримышечного введения пролонгированного действия, 175 мг / 0,875 мл; 263 мг / 1,315 мл; 350 мг / 1,75 мл; 525 мг / 2,625 мл.</p> <p>По 0,875, 1,315, 1,75, 2,625 мл препарата в шприце из циклолефинового сополимера с наконечником из бромбутила и уплотнителем из бромбутила с покрытием Flurotec<sup>®</sup>, снабженном ограничителем обратного хода поршня. В комплект препарата входят 2 иглы для внутримышечных инъекций (в дельтовидную и ягодичную мышцы). Предварительно заполненный шприц с препаратом и 2 иглы в пластиковом поддоне, закрытом полиэтиленовой пленкой, помещают вместе с инструкцией по применению в картонную пачку. На картонных пачках может быть предусмотрен контроль вскрытия.</p>
<p><b>Инструкции по применению и обращению с препаратом</b></p> <p>...</p> <p><i>ранее по тексту без изменений</i></p> <p><b>Содержимое упаковки</b></p>	<p><b>Инструкции по применению и обращению с препаратом</b></p> <p>...</p> <p><i>ранее по тексту без изменений</i></p> <p><b>Содержимое упаковки</b></p>




Старая редакция

Новая редакция


Предзаполненный шприц

Тонкостенные безопасные иглы



Предзаполненный шприц


Тонкостенные безопасные иглы



1. Выбор иглы

Выбор иглы определяется местом инъекции и массой пациента


Инъекция в дельтовидную мышцу



Для пациента массой **менее 90 кг:**  
игла с розовой канюлей

25 мм

Инъекция в ягодичную мышцу




Независимо от массы пациента игла с желтой канюлей

51 мм

1. Выбор иглы

Выбор иглы определяется местом инъекции и массой пациента


Инъекция в дельтовидную мышцу



Для пациента массой **менее 90 кг:**  
игла с розовой канюлей

короткая игла

Инъекция в ягодичную мышцу



Независимо от массы пациента игла с желтой канюлей

длинная игла