

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Пиперазин
таблетки, 0,5 г

ОАО «Фармстандарт-Лексредства», Россия

Изменение № 3


Дата внесения Изменения « » 14 02 12 20 г.

Старая редакция	Новая редакция
<p>Состав. Каждая таблетка содержит пиперазина адипината 0,2 г или 0,5 г, а также вспомогательные вещества: тальк, крахмал картофельный, желатин медицинский.</p>	<p>Состав на одну таблетку</p> <p><i>Активное вещество:</i> пиперазина адипат (пиперазина адипинат) - 0,5 г;</p> <p><i>вспомогательные вещества:</i> тальк, крахмал картофельный, желатин медицинский.</p>
<p>Способ применения и дозы</p> <p>Внутрь. При лечении аскаридоза препарат назначают в течение двух дней подряд по 2 раза в день за 1 час до или 0,5-1 час после еды в следующих дозах:</p> <p>взрослым и детям от 15 лет – 1,5 г – 2,0 г; детям в возрасте до 1 года – 0,2 г (суточная доза 0,4 г), от 1 до 3 лет – по 0,3 г (суточная доза 0,6 г), от 3 до 5 лет – 0,5 г (суточная доза 1,0 г), от 5 до 8 лет – 0,75 г (суточная доза 1,5 г), от 8 до 12 лет – 1,0 г (суточная доза 2,0 г), от 13 до 15 лет – 1,5 г (суточная доза 3,0 г).</p>	<p>Способ применения и дозы</p> <p>Внутрь. При лечении аскаридоза препарат назначают в течение двух дней подряд по 2 раза в день за 1 час до или 0,5-1 час после еды в следующих дозах: взрослым и детям от 15 лет – 1,5 г – 2,0 г; детям в возрасте от 3 до 5 лет – 0,5 г (суточная доза 1,0 г), от 5 до 8 лет – 0,75 г (суточная доза 1,5 г), от 8 до 12 лет – 1,0 г (суточная доза 2,0 г), от 13 до 15 лет – 1,5 г (суточная доза 3,0 г). Возможно применение препарата в течение одного дня однократно в дозе от 0,5 г до 4,0 г в зависимости от возраста.</p>

Старая редакция	Новая редакция
<p>Возможно применение препарата в течение одного дня однократно в дозе от 0,4 до 4,0 г в зависимости от возраста.</p> <p>Максимальная суточная доза у взрослых 4 г.</p>	<p>Максимальная суточная доза у взрослых 4,0 г.</p>
<p>При энтеробиозе в тех же дозах препарат назначают в течение 5 дней подряд (проводят 1-3 курса терапии с 7-дневным перерывом между курсами) или в течение одного дня однократно в дозе от 0,4 до 4 г в зависимости от возраста. В перерывах между циклами назначается клизма на ночь для механического вымывания остиц (взрослым 4-5 стаканов воды, детям 1-2 стакана с добавлением 1/2 чайной ложки натрия бикарбоната на стакан воды).</p>	<p>При энтеробиозе в тех же дозах препарат назначают в течение 5 дней подряд (проводят 1-3 курса терапии с 7-дневным перерывом между курсами) или в течение одного дня однократно в дозе от 0,5 г до 4,0 г в зависимости от возраста. В перерывах между циклами назначается клизма на ночь для механического вымывания остиц (взрослым 4-5 стаканов воды, детям 1-2 стакана с добавлением 1/2 чайной ложки натрия бикарбоната на стакан воды).</p>
Противопоказания	Противопоказания
<p>Органические заболевания центральной нервной системы. Гиперчувствительность. Хроническая почечная недостаточность, беременность и период лактации.</p>	<p>Органические заболевания центральной нервной системы. Гиперчувствительность. Хроническая почечная недостаточность, беременность и период лактации. Детский возраст до 3 лет (для данной дозировки).</p>
Особые указания (далее по тексту)	Особые указания (далее по тексту)
Раздел отсутствует	Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами
	<p>Препарат не влияет на способность к управлению транспортными средствами и различными механизмами, а также на занятия другими потенциально опасными</p>

Старая редакция	Новая редакция
<p>Взаимодействие с другими лекарственными средствами (далее по тексту)</p>	<p>видами деятельности, требующими повышенного внимания и быстроты психических и двигательных реакций.</p> <p>Взаимодействие с другими лекарственными средствами (далее по тексту)</p>

Представитель
ОАО «Фармстандарт-Лексредства»



Е.В. Толстова