

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению лекарственного препарата
Цикомин-Альтфарм

Регистрационный номер:

Торговое название препарата: Цикомин-Альтфарм

Международное непатентованное название: цианокобаламин.

Лекарственная форма: суппозитории ректальные.

Состав:

Активное вещество: цианокобаламин 0,5 мг;

Вспомогательные вещества: глицерол (глицерин), ланолин безводный, жирных кислот глицериды (витепсол Н 15).

Описание: Суппозитории розового цвета торпедообразной формы.

Фармакотерапевтическая группа: витамин.

Код АТХ: B03BA01

Фармакологические свойства

Цианокобаламин (витамин В₁₂) оказывает метаболическое, гемopoэтическое действие. Участвует в синтезе лабильных метильных групп и в образовании холина, метионина, креатина, нуклеиновых кислот; способствует накоплению в эритроцитах соединений, содержащих сульфгидрильные группы. В высоких дозах вызывает повышение тромбопластической активности и активности протромбина. Активирует обмен углеводов и липидов.

Показания к применению:

Лечение и профилактика дефицита витамина В₁₂.

Комплексная терапия полиневрита, радикулита, невралгии (в том числе невралгии тройничного нерва), гипотрофии, фуникулярного миелоза, при травме периферических нервов, боковом амиотрофическом склерозе.

Противопоказания:

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата, тромбоэмболия, эритремия, эритроцитоз, беременность, период лактации.

С осторожностью: препарат назначают пациентам со стенокардией; доброкачественными и злокачественными новообразованиями, сопровождающимися мегалобластной анемией и дефицитом витамина В₁₂, при склонности к образованию тромбов.

Применение препарата в период беременности и грудного вскармливания:

Препарат не рекомендуется принимать в период беременности и грудного вскармливания.



Способ применения и дозы:

Взрослым для устранения дефицита витамина В12 - по 1 мг (2 суппозитория) ежедневно в течение 1-2 недель, для профилактики дефицита витамина В12 - по 1 мг (2 суппозитория) 1 раз в месяц. При заболеваниях периферической нервной системы - по 500 мкг (1 суппозиторий) через день в течение 2-х недель.

Побочное действие:

Аллергические реакции к компонентам препарата, кардиалгия, тахикардия, диарея, головная боль, головокружение, психическое возбуждение. При применении в высоких дозах – гиперкоагуляция, нарушение пуринового обмена.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами:

Нельзя сочетать с препаратами, повышающими свертываемость крови.

Хлорамфеникол снижает гемопозитический ответ при одновременном применении с цианкобаламином. Тиамин повышает риск развития аллергических реакций.

Особые указания:

Дефицит витамина В12 должен быть подтвержден. В период лечения необходимо контролировать показатели крови: на 5-8 день лечения определяется содержание ретикулоцитов, концентрация железа. Количество эритроцитов, Hb и цветной показатель необходимо контролировать в течение 1 месяца 1-2 раза в неделю, а далее – 2-4 раза в месяц. Ремиссия достигается при повышении количества эритроцитов до 4-4,5 млн/мкл, при достижении нормальных размеров эритроцитов, исчезновении анизо- и пойкилоцитоза, нормализации содержания ретикулоцитов после ретикулоцитарного криза. После достижения гематологической ремиссии контроль периферической крови проводится не реже 1 раза в 4-6 месяцев.

Форма выпуска:

Суппозитории ректальные 0,5 мг.

По 5 суппозитория в контурной ячейковой упаковке. 2 контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по применению в пачке картонной.

Условия хранения:

Хранить в сухом защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности: 2 года. Не использовать после срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска из аптек:

По рецепту.

Производитель:

ООО "Альтфарм"

142073, Россия, Московская обл., Домодедовский р-н, д.Судаково, д/о «Лесное»

Тел./факс:(495)234-46-40

Генеральный директор

ООО «Альтфарм»



И.о. директора ИДКЭЛС,

А.Н.Васильев

