

**ИНСТРУКЦИЯ  
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА  
Виру-Мерц Серол  
(Viru-Merz Serol)**

**Регистрационный номер:**

**Торговое название:** Виру-Мерц Серол

**МНН:** тромантадин

**Лекарственная форма:** гель для наружного применения

**Состав на 100 г препарата:**

**Активное вещество:**

Тромантадина гидрохлорид 1,000 г

**Вспомогательные вещества:** метилпарагидроксибензоат; сорбиновая кислота; гиэтеллоза; сорбит (сорбитол), 70% раствор; лактозы моногидрат; вода очищенная.

**Описание**

Прозрачный гель от бесцветного до светло-желтого и светло-коричневого цвета.

**Фармакотерапевтическая группа:**

Противовирусное средство для местного применения.

Код ATX: D06BB02

**Фармакологические свойства**

Обладает противовирусными свойствами. Активен в отношении вирусов простого герпеса 1 и 2 типа, опоясывающего герпеса. Ингибитирует прикрепление вируса к поверхности мембранны клеток, препятствует проникновению вирусов внутрь клетки. Препятствует слиянию клеток и затрудняет распространение вируса, изменяя синтез гликопротеинов.

**Фармакокинетика**

При нанесении геля на кожу всасывание минимальное, активное вещество не определяется в крови и моче.

**Показания к применению**

Воспалительные заболевания кожных покровов, вызванные вирусом простого герпеса, опоясывающего герпеса.

**Противопоказания**

Повышенная чувствительность к тромантадину, метилпарагидроксибензоату, сорбиновой кислоте или другим компонентам препарата. Препарат противопоказан у детей, при беременности и в период кормления грудью в связи с отсутствием клинических данных.

**Применение в период беременности и лактации**

Препарат противопоказан при беременности и в период кормления грудью в связи с отсутствием клинических данных.

**Способ применения и дозы**

Наружно. Гель наносят на пораженные участки кожи 3-5 раз в сутки (при необходимости, чаще), слегка втирая. Курс лечения составляет, как правило, 2-3 дня. Лечение препаратом необходимо прекратить, если во время применения не наблюдается улучшение состояния.

**Побочное действие**

Не часто (более 1/1000 и менее 1/100): аллергические реакции; очень редко (менее 1/10000): контактный дерматит.

**Взаимодействие с другими лекарственными препаратами**  
Не установлено.**Особые указания**

Эффективность лечения будет тем выше, чем раньше оно начато (при первых признаках инфекции в течение первых 2-3 часов от начала заболевания). На стадии образования пузырьков применение наружных противовирусных средств не рекомендуется. Не предупреждает передачу герпеса половым путем, поэтому в период лечения необходимо воздерживаться от половых контактов, даже при отсутствии клинических проявлений у полового партнера. Гель не следует наносить в области глаз.

**Форма выпуска**

Гель для наружного применения 1%, по 5 г в алюминиевую тубу с полиэтиленовым колпачком. По 1 тубе в картонную коробку с инструкцией по применению.

**Срок годности**

3 года.

После первого вскрытия использовать в течение 6 месяцев.

Не использовать по истечении срока годности.

**Условия хранения**

При температуре не выше 25 °C.

Хранить в недоступном для детей месте.

**Условия отпуска из аптек**

Без рецепта.

**Предприятие-производитель**

«Мерц Фарма ГмбХ и Ко. КГаА» D-60318, Германия, Франкфурт-на-Майне

Претензии направлять по адресу:

ООО «Мерц Фарма»

123242, г. Москва, пер. Капранова, д.3, стр.2

телефон: (495) 660-7695

[www.merz.ru](http://www.merz.ru)



Генеральный директор  
ООО «Мерц Фарма»  
профессор



ФГБУ	М З С Р Р Ф	
	ЭКСПЕРТНЫЙ ОТЧЕТ	
ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДЛЯ ДАННОЙ		
ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА		
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
5	5	5

55677

2