

## Батарея тестов для оценки лобной дисфункции (Frontal Assessment Battery, FAB)

Субтест	Процедура	Оценка в баллах
<b>1. Концептуализация</b>	Пациента просят назвать общую категорию для пар слов (яблоко/груша, стол/стул, пальто/куртка).	- 1 балл за каждое правильное категориальное обобщение (фрукты, мебель, одежду). - Максимум: 3 балла.
<b>2. Беглость речи</b>	В течение минуты пациент должен называть слова на букву "с" (кроме имен собственных).	- 3 балла: 10 или более слов. - 2 балла: 6-9 слов. - 1 балл: 3-5 слов. - 0 баллов: менее 3 слов.
<b>3. Динамический праксис</b>	Пациент повторяет за врачом серию движений "кулак-реброладонь". Сначала наблюдает, затем повторяет вместе с врачом, а потом выполняет самостоятельно.	- 3 балла: правильное самостоятельное выполнение 6 серий движений. - 2 балла: правильное самостоятельное выполнение 3 серий. - 1 балл: выполнение 3 серий только совместно с врачом. - 0 баллов: Пациент не может выполнить три правильные серии даже с помощью врача
<b>4. Простая реакция выбора</b>	Инструкция: на 1 удар врача ответить двумя, на 2 удара — одним. Серия: 1-1-2-1-2-2-2-1-1-2.	- 3 балла: правильное выполнение (без ошибок) - 2 балла: не более 2 ошибок. - 1 балл: много ошибок. - 0 баллов: персеверативное повторение ритма за врачом не менее 4 раз
<b>5. Усложненная реакция выбора</b>	Инструкция: на 1 удар врача ответить одним, на 2 удара — ничего не делать. Серия: 1-1-2-1-2-2-2-1-1-2.	- 3 балла: правильное выполнение (без ошибок) - 2 балла: не более 2 ошибок. - 1 балл: много ошибок. - 0 баллов: персеверативное повторение ритма за врачом не менее 4 раз
<b>6. Исследование хватательных рефлексов</b>	Проверяется хватательный рефлекс при стимуляции ладони пациента. При наличии рефлексадается инструкция не хватать и тест повторяется.	- 3 балла: рефлекс отсутствует. - 2 балла: пациент спрашивает, нужно ли хватать. - 1 балл: сначала хватает без колебаний, но после указаний, что этого делать не нужно, подавляет хватательный рефлекс. - 0 баллов: рефлекс сохраняется даже после указания не хватать.

### Интерпретация результатов

Суммарный балл рассчитывается по всем шести субтестам.

Максимально возможный результат - 18 баллов.

- 16-18 баллов: нормальная функция лобных долей.
- 12-15 баллов: умеренная лобная дисфункция.
- 11 баллов и менее: признаки деменции.